

RECHERCHES SUR LE POULS,

PAR RAPPORT AUX CRISES

Par M. THEOPHILE DE BORDEU,
Docteur en Médecine des Facultés de Paris
& de Montpellier.

SECONDE ÉDITION;

Augmentée des RECHERCHES SUR LES CRISES,
du même Auteur, & des JUGEMENS portés sur
la Doctrine du Pouls, depuis la publication des
Recherches en 1756.

30551

In vitium ducit culpa fuga si caret arte.
HORAT. de Arte poet.

TOME PREMIER.



A PARIS;

CHEZ PIERRE-FR. DIDOT LE JEUNE,
Quai des Augustins, à Saint Augustin.

M. DCC. LXVIII.

Avec Approbation, & Privilège du Roi.



TABLE

DES CHAPITRES

Du premier Volume,

CHAPITRE I. <i>I</i> <i>DÉE générale du pouls,</i> <i>& de ses différentes espèces,</i>	page 1
CHAP. II. <i>De la manière particulière dont</i> <i>les différentes espèces de pouls seront distin-</i> <i>gués dans cet ouvrage,</i>	9
CHAP. III. <i>Division générale du pouls,</i>	16
CHAP. IV. <i>Division du pouls développé</i> <i>ou critique,</i>	21
CHAP. V. <i>Du pouls supérieur, & de ses</i> <i>différentes espèces;</i>	25
CHAP. VI. <i>Du pouls des excrétiions cri-</i> <i>tiques de la poitrine, ou pectoral simple;</i>	29
CHAP VII. <i>Du pouls des excrétiions cri-</i> <i>tiques de la gorge, ou guttural simple;</i>	42
CHAP. VIII. <i>Du pouls des excrétiions dia-</i> <i>nés, ou nasal simple,</i>	49
CHAP. IX. <i>Du pouls inférieur, & de ses</i> <i>différentes especes,</i>	74
CHAP. X. <i>Du pouls qui annonce le</i>	79
Tome I.	79

T A B L E

<i>misement, ou stomachal simple ;</i>	77
CHAP. XI. <i>Du pouls qui annonce les évacuations critiques du ventre, ou intestinal simple,</i>	86
CHAP. XII. <i>Du pouls des règles, ou du pouls simple de la matrice,</i>	100
CHAP. XIII. <i>Du pouls simple du foie,</i>	112
CHAP. XIV. <i>Du pouls simple des hémorrhôides,</i>	121
CHAP. XV. <i>Du pouls simple de l'excrétion critique des urines,</i>	134
CHAP. XVI. <i>Du pouls qui annonce la sueur critique,</i>	143
CHAP. XVII. <i>Des pouls critiques, combinés entre-eux ou composés,</i>	159
CHAP. XVIII. <i>De la combinaison des pouls supérieurs,</i>	162
CHAP. XIX. <i>De la combinaison des pouls supérieurs, avec le pouls intestinal,</i>	170
CHAP. XX. <i>De la combinaison des différentes espèces de pouls inférieurs, avec diverses espèces de pouls supérieurs,</i>	180
CHAP. XXI. <i>Du pouls des règles, & des hémorrhôides combinés avec celui des autres hémorrhagies, & principalement avec le nasal,</i>	191
CHAP. XXII. <i>Du pouls de la sueur combiné, avec les autres espèces de pouls critiques,</i>	207
CHAP. XXIII. <i>Du pouls d'irritation, ou non critique,</i>	215
CHAP. XXIV. <i>Du Pouls d'irritation</i>	

DES CHAPITRES: 3

compliqué, avec les pouls critiques, 222

CHAP. XXV. Du pouls d'irritation compliqué, avec les pouls critiques, dans les maladies aiguës, qui ont une heureuse terminaison, 233

CHAP. XXVI. Du pouls d'irritation compliqué avec les pouls critiques, dans les maladies chroniques, 243

CHAP. XXVII. De la complication du pouls d'irritation avec les pouls critiques, dans les maladies aiguës, qui ont une mauvaise terminaison, 260

CHAP. XXVIII. De la complication du pouls dans les maladies convulsives; nerveuses (ou nervales) ou plus nerveuses qu'humorales, 275

CHAP. XXIX. De la complication du pouls dans les suppurations, à la suite des maladies aiguës, 288

CHAP. XXX. De la complication du pouls dans la fièvre maligne, 320

CHAP. XXXI. Des différences qui se trouvent quelquefois dans le pouls des deux côtés, & dans celui des différentes parties du corps, 337

Fin de la Table du premier Volume.



DISCOURS

PRELIMINAIRE.

CET Ouvrage n'est qu'un enchaînement d'Observations faites avec la plus scrupuleuse attention , la matiere en est nouvelle , & n'est pas moins intéressante pour la théorie que pour la pratique de la Médecine.

Pour bien juger de ces Recherches , il est essentiel de mettre absolument à part les préjugés contraires ; & si on entreprend de les vérifier , il faut souvent réitérer les épreuves , & ne croire aucun article décidé qu'autant qu'on sera fondé

sur des résultats confirmés par plusieurs examens.

En attendant que de bons Observateurs se soient ainsi assurés de la vérité de tous ces faits, n'en doit-on pas au moins présumer favorablement par les observations rapportées dans ce Traité ? Ce sera une opinion d'autant moins hasardée, que plusieurs de ces observations ont été faites sur des personnes dont le témoignage ne sauroit souffrir de contradiction ; & qu'il seroit difficile de faire intervenir des soupçons assez vraisemblables d'illusion, ou de prévention, pour affoiblir un pareil témoignage.

Il faut pourtant convenir que ces raisons, quoique très-plausibles, ne peuvent d'abord donner que bien peu de sécurité sur les obstacles que les

PRELIMINAIRE. v

vérités naissantes ne manquent jamais de trouver.

M. Fagon soutint le premier à Paris l'*existence* de la circulation du sang: ce fut avec toute la force des preuves qu'on sçait qu'il y a à alléguer pour l'appui de cette vérité ; les vieux Docteurs donnerent des éloges au Récipiendaire , & convinrent que pour un aussi étrange paradoxe il ne s'en étoit pas mal tiré (1) «. Or connoissons-nous quelque vérité , en Médecine , qui puisse se produire avec des preuves aussi invincibles ?

Ce seul exemple nous eût peut-être fait renoncer à notre entreprise si nous n'avions pensé que , grace à l'esprit Philosophique qui depuis quelque tems paroît se répandre de plus en

(*) M. Fontenelle, éloge de M. Fagon;

plus , on est à présent plus adroit à saisir le vrai qu'on ne l'étoit dans les siècles précédens.

Les Pyrrhoniens de toutes les especes sont aujourd'hui renfermés dans de justes bornes ; on ne les écoute point dès qu'on les en voit sortir : le défaut d'autorités ; un bon mot ne peuvent plus ternir une vérité au point de l'empêcher de se montrer : les Jugemens prématurés sont donc d'autant moins à craindre que ces changemens se sont réellement faits dans la disposition des esprits.

Mais il est dit-on , démontré par ce qu'il a de plus clair dans les principes de l'art , qu'il est impossible de déterminer & de classer assez distinctement les différentes modifications du poulx, pour établir sur ces différences les signes propres à chaque évacuation critique : on

PRÉLIMINAIRE. vij

ajoute qu'à peine la vie d'un homme suffiroit à s'instruire & s'exercer comme il faut l'être pour faire usage de ces règles.

Nous pouvons d'abord avancer après un Critique célèbre (1) que » la raison est un instrument vague , voltigeant , » qu'on tourne de toutes manieres comme une girouette » : Montagne , dit aussi que » la raison est une règle de plomb & de » cire allongeable , ployable & » accommodable à tous biais » & à toutes mesures «. D'ailleurs le seul raisonnement peut-il être de quelque poids dans une matiere qui est principalement du ressort de l'observation ? à plus forte raison s'il n'est fondé que sur des principes contredits par des faits ?

Or, de cette contradiction ;

(1) Bayle.

vij DISCOURS

ainfi que de la facilité de concevoir & d'appliquer les règles dont il s'agit ici , nous en pouvons alléguer une preuve fans réplique ; c'est qu'en moins de quatre mois , on est parvenu dans un Hôpital à former fi bien à l'usage de ces règles un jeune Médecin , qui n'en avoit aucune connoiffance , que depuis ce tems-là , il ne s'y méprenoit que rarement. (*)

Au furplus , qui eft-ce qui ignore qu'il eft une *maniere* propre à tout Peintre , à tout Écrivain , qui les décèle bientôt aux yeux des connoiffeurs ? Qui eft - ce qui ne fçait que dans tous les arts . il y a un coup d'œil qui fait d'abord appercevoir aux maîtres , ce qu'à peine les apprentifs peuvent re-

(*) M. Michel, Docteur de la Faculté de Montpellier.

PRELIMINAIRE *ix*

marquer avec le secours de la plus grande attention ? Il en est de même des différentes modifications critiques du pouls ; à peine sensibles pour ceux qui ne sont pas habitués à cet examen , elles deviennent frappantes pour ceux qui y sont exercés.

Solano de Luques , Médecin Espagnol , qui vivoit à *Antequera* , au commencement de ce siècle , & dont il sera souvent question dans la suite de ces Recherches , a fait des observations neuves sur le pouls ; il en a rendu compte dans un ouvrage , qui a pour titre , *Lapis Lydius Apollinis* ; cet ouvrage tomba entre les mains de M. Nihell , Médecin Irlandois , établi alors à Cadix (1) ;

(1) En 1743.

il le trouva si obscur qu'il prit le parti d'aller à *Antequera*, pour demander à l'Auteur les éclaircissemens dont il avoit besoin : Solano le rendit plusieurs fois témoin de la justesse des prédictions faites suivant ses principes ; depuis ce tems-là il est souvent arrivé à M. Nihell de faire d'heureuses applications de ces règles ; c'est ce dont il rend compte dans un recueil d'observations qu'il a publié sur ce sujet, & qu'il a dédié au Docteur Mead ; célèbre Médecin de Londres.

Ce recueil contient les principales observations de Solano ; celles de douze Médecins Espagnols faites d'après les principes de cet Observateur ; ensuite les observations propres à l'Auteur, auxquelles il a joint beaucoup d'excellentes remar-

1748

PRELIMINAIRE. *xj*

ques sur le parti qu'on peut tirer de cette découverte.

M. Lavirotte , Médecin des Facultés de Paris & de Montpellier, a donné en 1748 une traduction de l'ouvrage de M. Nihell, avec une Préface dans laquelle il fait très-bien sentir l'importance de la matiere traitée dans cet ouvrage (1).

M. Sénac , premier Médecin du Roi, dont les lumieres ainsi que son zèle pour les progrès de l'art font généralement connus par ses succès & par ses excellens ouvrages, fut bientôt frappé de l'utilité des observations de Solano ; & pour les vérifier, » il fit mettre, étant à

(1) Observations nouvelles & extraordinaires sur la prédiction des crises, &c. par D. Francisco Solano de Luques, enrichies de plusieurs cas nouveaux par M. Nihell M. D. à Paris chez de Bure l'aîné, 1748.

Bruxelles , plusieurs soldats
malades dans une Sale parti-
culiere de l'Hôpital , il ob-
serva toujours le pouls rebon-
dissant annoncer les hémor-
rhagies ; il vit aussi que le flux
de ventre étoit prévu très-sou-
vent par le pouls intermittent ;
il a trouvé qu'il étoit beau-
coup plus difficile de distin-
guer le pouls *incidius* , &
par là de prédire la sueur (1).

M. Van-Swieten dit en par-
lant des observations de Solano
& de M. Nihell , que ce
sujet est si important , qu'il
mérite l'attention de tous ceux
qui s'appliquent à la Méde-
cine.

Enfin M. Noortwyk a cru
devoir traduire en latin l'ou-

(1) Dissertation sur les Crises , à Paris ,
chez Prault fils , 1752.

PRELIMINAIRE. xiiij
vrage de M. Nihell (1) ; il y a
ajouté une Préface dans la-
quelle il se déclare en faveur
des règles de Solano , & il
rapporte une observation sin-
gulière au sujet du pouls qui
annonce la sueur. (2)

L'Auteur de ces Recherches
ne doit ses premières idées sur
ce sujet qu'à la manière dont
il fut plusieurs fois frappé de
quelques modifications du pouls
qui lui paroissoient singulières ;
cependant, il n'osoit encore les
regarder que comme des mou-
vemens bizarres & presque de
nulle conséquence ; ce ne fut
qu'après avoir vu la traduction
de M. Lavirotte, qu'il comprit
l'importance de ses premières
observations , & qu'il s'attacha
sérieusement à les suivre , soit

(1) En 1746.

(2) V. le Chapitre 18 du Pouls de la sueur.

dans des Hôpitaux, soit dans le cours de sa pratique journaliere.

20 Dans l'année 1707, lorsqu'
20 que Solano alors étudiant en
20 Médecine, suivoit en pratique
20 que Joseph Pablo, Professeur
20 & Vice-Doyen de l'Université de Grenade, dans l'Hôpital
20 Royal, celui de saint Jean
20 de Dieu, & du Refuge, il
20 observa souvent le pouls rebondissant; il demanda la
20 raison de ce qu'il signifioit à
20 Pablo; celui-ci qui étoit un
20 homme d'un tempérament
20 très-violent, lui dit de ne pas
20 faire attention à de telles bagatelles qui ne provenoient
20 que des vapeurs fuligineuses;
20 heureusement Solano ne se rebuta point (1) ^{cc}

Si Pablo avoit répondu,

(1) Observ. nouvelles & extraord. &c.

PRELIMINAIRE. xv

comme pourroient faire les Modernes, que ces variations bizarres du pouls n'étoient que des irrégularités de peu d'importance, fort communes à de certains états d'irritation ou de spasme, il eût donné une explication moins ridicule : mais il n'en auroit pas moins substitué des idées vagues, aux nouvelles observations qu'il s'agissoit de faire sur un fait qui méritoit d'être approfondi : cet exemple peut être présenté en maniere d'apologue à ceux qui seroient tentés d'être aussi prompts dans leurs décisions sur cette matiere, que le fut Joseph Pablo.

Tous les Médecins sçavent que Galien a donné un système très-étendu sur le pouls : il en est peu qui ne regardent ce système comme entièrement détruit par les idées des Mo-

dernes : il est en effet tombé dans l'oubli.

Une chose néanmoins fort importante à remarquer , c'est que parmi toutes les espèces de pouls décrites par Galien , on trouve la description d'une espèce particulière qui annonce la sueur ; cette espèce a résisté à toutes les critiques ; elle a été depuis Galien , admise par tous les Praticiens : n'auroit-on pas dû présumer que puisque la sueur est annoncée par une espèce particulière de pouls , toutes les excréations peuvent & doivent de même être précédées d'un pouls qui leur est propre ?

Galien en faisant son Traité du pouls , raisonna beaucoup plus qu'il n'avoit observé : il comprit pourtant que les différentes espèces de pouls devoient être distribuées en plusieurs classes : mais il y avoit de la diffi-

PRELIMINAIRE. *xviij*
culté à les caractériser , à les
rendre reconnoissables , & en-
core à les exprimer d'une ma-
niere assez intelligible ; il prit le
parti de désigner ces diverses
especes de pouls par leurs rap-
ports avec des choses qu'il re-
garda comme bien connues ; il
prétendit avoir trouvé des pouls
qui ressembloient à la marche
des fourmis , il les appella *for-*
micans ; d'autres qui alloient en
diminuant comme la queue d'un
rat , il les nomma *miures* ; & il
appella , d'après Herophile ,
pouls *caprizans* , ceux qu'il
crut représenter les sauts d'une
chevre.

Les Chinois qui passent pour
être fort experts dans la con-
noissance du pouls , & qui se
font de tout tems fort occupés
de cette partie de la Médecine ,
ont pris le même parti que

Galien à l'égard de cette *nomenclature* ; il se peut même que les anciens Médecins Egyptiens , avoient jetté les premiers fondemens des idées communes à Galien & aux Chinois : quoi qu'il en soit , ces derniers ont parlé d'un pouls *roulant* , de celui qui va comme une *grenouille* , de celui qui ressemble au *frétillement d'un poisson* , d'un autre qui a du rapport au *bouillonnement d'une marmite* , & d'un autre qui ressemble au *bec d'une poule* (1)

C'est contre la *nomenclature* de Galien adoptée par les vieilles Ecoles , que les Modernes ont principalement écrit ; il n'étoit pas difficile de jeter un ridi-

(1) Vid. Joh. Conr. Barchusen de *Medicinæ origin. & progress. dissert. de Chirrens. Medicinâ. Vid. etiam Cloier Medulla. Medicin. &c.*

PRELIMINAIRE. ~~Fin~~

cule sur tous les points de comparaison adoptés par Galien : aussi les pouls *formicans* , les *miures* , les *caprizans* , & tous les autres de cette espèce , ont-ils été entièrement bannis.

Les Modernes s'en sont tenus à des divisions & à des dénominations plus simples , même en apparence plus significatives : on a divisé les pouls en *forts* & *foibles* , *fréquens* & *lents* , *grands* & *petits* , *durs* & *mols* , &c. Ces dénominations étoient aussi employées par Galien.

Mais il est facile d'appercevoir que cette *nomenclature* adoptée par les Modernes , a presque autant de défauts que celle qu'ils ont rejetée , parce que dans le fait ces dénominations n'expriment rien d'assez précis ; il n'est pas possible de déterminer à quel signe on doit juger dans les maladies que le pouls est par

exemple *dur* ou *mol*, *grand* ou *petit*; sa *petitesse* & sa *grandeur*, sa *moleſſe* & sa *dureté*, étant dans l'état de ſanté, a des degrés fort différens ſuivant les diverſes conſtitutions des corps; ce jugement ſuppoſe donc une comparaifon à faire entre le pouls qui par ſa nature eſt cenſé être *dur* ou *mol*, *grand* ou *petit*, & celui qui au moment qu'on l'examine ſe trouve avoir quelqueune de ces qualités: la premiere eſpece, ſçavoir le pouls naturel, manque à l'obſervateur, au moment dans lequel il tâte le pouls qu'il doit juger: d'ailleurs il n'arrive que trop ſouvent qu'un pouls qui eſt trouvé *grand* ou *dur* par un Médecin, paroîtra *petit* ou *mol* à un autre: ainſi ces définitions ou ces dénominations ne peuvent rien exprimer d'aſſez poſitif.

Pour éviter de tomber dans

PRELIMINAIRE. xxxj

l'écueil auquel Galien & les Modernes ont échoué par rapport à la *nomenclature* des diverses modifications du pouls ; on n'a ici employé pour en déterminer les especes principales que des divisions & des dénominations claires & simples.

On a observé qu'un pouls d'une espece particuliere annonçoit une évacuation du côté de la tête ; on a nommé ce pouls *capital* ; lorsque l'évacuation devoit se faire par les organes excrétoires de la poitrine , on l'a nommé *pectoral* ; & on l'a appelé *intestinal* ou *ventral* lorsqu'elle se préparoit par les viscères du bas-ventre.

Quant aux caractères distinctifs de chaque espece de pouls , on les a déterminés de maniere qu'un observateur peut distinguer le pouls *pectoral* , le

capital, l'*intestinal*, &c. sans être obligé de faire aucune comparaison avec des choses inconnues ou éloignées.

L'égalité & l'inégalité des pulsations, l'*égalité & l'inégalité des espaces qui se trouvent entre elles*, modifications fort aisées à reconnoître, sont les sources de la plûpart des caractères & des dénominations des principales especes de pouls décrites dans cet ouvrage; cette maniere de caractériser les especes de pouls a donc plusieurs avantages sensibles sur celle de Galien & des Modernes.

Les dénominations, ou les mots de *pectoral*, *capital* & *intestinal*, sont tirés de l'Anatomie, ce sont des expressions reçues & employées journellement en Médecine: on dit l'*artere capitale*, *gutturale*, na-

PRELIMINAIRE. *xxiiij*

zale, *intestinale* ; on distingue des remèdes *pectoraux*, *stomachiques*, *céphaliques* ; ainsi ces dénominations appliquées aux modifications du pouls n'ont rien qui doive surprendre ; elles doivent même paroître d'autant plus appropriées , qu'elles indiquent la marche de la Nature dans chaque espece de pouls.

On ne se portera peut-être pas jusqu'à dire , ou penser que cette *nomenclature* ait été employée pour déguiser ou rapporter en des termes & sous d'autres dénominations particulieres , ce qui dans le fonds se trouve dans d'autres ouvrages ; quoi qu'il en arrive , nous assurons d'avance qu'entre le systême de Galien , des Chinois , & des Modernes , & celui de ces Recherches , il n'y a d'autre rapport que celui qui

doit nécessairement se trouver entre des ouvrages faits sur la même matière ; mais l'objet , les vues , les preuves tout y est différent ; & ces différences sont si marquées qu'on ne sauroit trouver aucun moyen , non seulement de soutenir , mais même de soupçonner le contraire.

Ceux qui voudront s'en mieux assurer , n'ont qu'à consulter l'histoire de la Médecine par le Clerc ; on y trouve un extrait exact du Traité de Galien sur le pouls ; ce qu'on sçait de plus positif du système des Chinois , est rapporté dans un ouvrage connu (1). Enfin le Dictionnaire de Médecine contient une ex-

(1) Histoire des Chinois & des Japonais, &c.

PRELIMINAIRE. *xxxv*

position très-détaillée du système des Modernes.

On dira qu'aumoins cet ouvrage n'est qu'une exposition & une répétition des observations de Solano ; il est certain qu'on ne peut disputer à ce grand Observateur d'avoir eu des idées neuves sur le pouls ; il a jeté les fondemens d'un système qui doit renverser tout ce qu'on a publié jusqu'ici sur cette matière ; & quoique M. Nihell ait beaucoup ajouté aux observations de Solano , il ne sçauroit pourtant de ce côté-là , entrer en concurrence avec lui ; mais il n'y a qu'à comparer ces Recherches avec l'ouvrage de Solano , & même avec les additions de M. Nihell , pour en appercevoir les différences qui sont en grand nombre.

Solano n'a parlé ni de pouls

critique, ni de pouls *non-critique* : il n'a pas observé le pouls qui annonce les crachats critiques ; il n'a pas dit un mot du pouls des règles non plus que de celui des hémoroïdes ; il n'a pas connu les pouls *compliqués*, qu'il est cependant très-important de bien distinguer : Solano n'a rien dit de l'action des remèdes sur le pouls ; il a omis de faire des remarques sur le pouls dans l'état de santé, remarques sans lesquelles on ne peut presque rien statuer sur les pouls dans l'état de maladie.

Solano n'a presque rien observé sur les exceptions qu'il y a à faire aux règles qu'il a établies, (à quoi M. Nihell a néanmoins un peu suppléé, ainsi qu'à d'autres articles.) Solano n'a parlé que fort légèrement du pouls du vomissement

PRELIMINAIRE. xxvij

ment , & de celui des urines ; ce qu'il a avancé sur le pouls du dévoyement , est aussi très-incomplet ; il a beaucoup trop généralisé ses observations ou ses règles sur le saignement de nez ; sa méthode pour annoncer , d'après les changemens du pouls , le jour d'une évacuation critique est obscure & très - imparfaite ; il n'a presque rien dit des pouls *composés* , ou des pouls *simples* combinés entre eux , ce qui est une partie assez considérable de l'histoire des diverses modifications du pouls.

Enfin , & c'est ici une différence bien importante entre cet ouvrage & celui de Solano , c'est que tout ce qu'il a publié sur cette matière , se réduit à quelques observations fort détachées ; il ne paroît seulement pas s'être douté qu'on

pût les pousser beaucoup plus loin , & les ramener par - là à des principes généraux propres à répandre sur la théorie de l'art , autant de lumière que sur la pratique : au lieu que ce sont là les vues qui forment l'objet principal de ces Recherches : partout on s'y attache à comparer d'après une scrupuleuse observation , la marche , les phénomènes , & les événemens des maladies livrées à elles-mêmes , ou traitées suivant les préceptes de l'art , avec toutes les diverses modifications critiques ou non - critiques du pouls , observées pendant les différens tems , les divers degrés , & les diverses tournures de ces maladies.

Il est vrai que dans le commencement de cet ouvrage , on trouvera beaucoup moins de cet

PRELIMINAIRE. *xxix*
esprit de comparaïson, d'analyse,
de discussion , qu'il n'y en a
dans la suite , c'est qu'en effet
le sujet ne le permet pas : il
falloit nécessairement commen-
cer par l'exposition des caractè-
res des pouls qu'on a nommés
pouls *simples* , avant que de
venir à celle des pouls *composés*
& des pouls *compliqués*.

Les maladies dont les crises
sont précédées & annoncées par
des pouls *simples* , ne sont jamais
des maladies de mauvaise es-
pérance ; celles au contraire
dans lesquelles se trouvent les
pouls *compliqués* , sont ordinai-
rement des maladies graves : or,
comme il s'en faut de beaucoup
que les différens ressorts du jeu
de l'œconomie animale se ren-
dent aussi sensibles , aussi re-
connoissables dans de médio-
cres lésions des fonctions que

xxx DISCOURS, &c.

dans un état de grande maladie ; ce n'est donc que dans l'exposition des pouls *compliqués* qu'on a dû placer les examens & les discussions qui ont conduit aux principes féconds & aux importantes règles qu'on a cherché à établir.

Au reste, qu'il nous soit permis de remarquer que les matieres contenues dans toutes les parties de cet ouvrage, sont liées entre elles & par conséquent traitées de maniere à se prêter réciproquement des forces : ce n'est donc qu'après avoir bien examiné leurs rapports, qu'on en pourra solidement juger.





RECHERCHES SUR LE POULS.

CHAPITRE PREMIER:

Idee générale du Pouls & de ses différentes especes.

IL ne faut pas s'attendre à trouver ici les définitions élémentaires sur la nature du Pouls & sur ses différences : ces questions qui n'ont été que trop multipliées, sont de pure spéculation, & n'appartiennent point à cet ouvrage uniquement fondé sur la pratique.

Le pouls ne peut se connoître que par le tact; il n'y a qu'à le tâter pour en avoir une idée, & pour s'en former une image, c'est ainsi qu'on acquiert par l'expérience, & non par le raisonnement, l'idée des couleurs, celle du mouvement, celle du son & de la chaleur.

Il est pourtant vrai que l'Anatomie des parties dont les oscillations constituent le pouls, peut, ainsi que le remarquent des Médecins Théoriciens sur l'usage de toutes ces parties, devenir utile pour avoir des notions claires de la nature du pouls: mais ces connoissances sont supposées dans cet ouvrage.

Lorsqu'on tâte un pouls, on le trouve *dur* ou *mol*, *foible* ou *vigoureux*, *lent* ou *fréquent*, *grand* ou *petit*, &c. mais les difficultés arrêtent au premier pas, comment faut-il qu'un pouls se trouve pour être appelé *dur* ou *mol*, *foible* ou *vigoureux*, *lent* ou *fréquent*, *grand* ou *petit*? Par quels signes connoît-on qu'il est tel qu'on l'annonce? La *dureté*, la *moleſſe*, la *grandeur*, la *fréquence*, &c. ne sont

que *des états* , *des modes relatifs* qui ne peuvent être évalués que par une mesure commune & fixe, à laquelle on puisse rapporter toutes ces variations.

Cette mesure manque (1) ; & de là naît la difficulté qu'il y a de bien connoître le pouls ; c'est à ce défaut de mesure fixe qu'il faut attribuer une bonne partie des jugemens divers apportés quelquefois sur le même pouls. On verra dans le Chapitre suivant qu'un des avantages de la méthode proposée dans cet ouvrage est de se trouver moins assujettie, que les méthodes ordinaires, à la nécessité ou au besoin de cette mesure.

D'ailleurs , l'usage , les épreuves réitérées, l'expérience, suppléent ici au défaut des règles & des mesures exactes. Il n'y a qu'à tâter souvent le pouls à des personnes de tout âge de tout sexe, de toute constitution , à des malades à des gens qui se portent bien : cette opération réitérée, à plusieurs re-

(1) La fréquence & la lenteur font une exception dont il sera parlé dans le Chap. suivant.

prises, forme insensiblement la finesse du *tact* qui distingue le Praticien de l'homme peu expérimenté.

On acquiert, par ce moyen, l'habitude de juger de l'état d'un poulx, pour ainsi dire, sans y penser, & quelquefois sans pouvoir bien exprimer les différences qu'on apperçoit. Cette difficulté caractérise même, en quelque manière, le tact exquis du Praticien; il ne consiste que dans la faculté de juger plus sainement & plus sûrement qu'on ne le fait ordinairement.

La disposition naturelle des organes, leur finesse, leur aptitude, contribuent infiniment à faire bien saisir les nuances qui différencient les poulx : mais il n'est pas impossible d'appercevoir ces nuances, sans cette finesse du tact; ainsi les connoissances particulieres que les Médecins peuvent acquérir sur le poulx, doivent moins être attribuées à une délicatesse particulière de leur tact, qu'à leur expérience.

On n'est pas long-tems à apper-

cevoir des différences bien marquées, entre le pouls naturel des enfans & celui des vieillards. Ce sont là les deux premiers points fixes auxquels on peut rapporter toutes les especes de pouls dont il est bon de se former dans la mémoire, une liste, pour ainsi-dire, graduée.

Le pouls naturel des vieillards est beaucoup plus *fort*, beaucoup plus *dilaté*, beaucoup plus *dur* que celui des enfans. Celui-ci est beaucoup plus *fréquent* que celui des vieillards; c'est un fait connu, & même susceptible de cacul; c'est-à-dire qu'on peut mesurer, au moins à peu de chose près, l'excès de la fréquence du pouls des enfans, sur celui des vieillards; on ne sçauroit enfin confondre ces deux especes de pouls.

Le pouls naturel des adultes bien constitués & qui jouissent d'une très-bonne santé, fait une autre sorte de point fixe, qui sert à juger toutes les autres especes: on y sent une *souplesse*, une *plénitude* médiocres: les pulsations sont *faciles*, *libres*, bien *distinctes*, bien *égales*; elles sont *fortes*

sans être *brusques*, *sensibles* sans trop de *plénitude*, & sans trop de *mollese*.

Ce pouls paroît *composé* de celui des enfans & de celui des vieillards : il a *l'aisance* & la *souplesse* du premier sans en avoir la *précipitation* ; il a la *force* & la *plénitude* du pouls des vieillards, sans en avoir la *lenteur*, la *roideur*, la *sécheresse* : c'est l'état parfait du pouls : celui des enfans ne demande qu'à *s'étendre*, il est *vis*, il est *pressé* ; celui des vieillards se *durcit*, & se *resserre*, il *s'embarrasse*, il *s'éteint*.

Les pouls naturels des âges qui se trouvent entre ces trois points fixes, se ressemblent plus ou moins, à proportion qu'ils s'éloignent ou qu'ils s'approchent des deux termes entre lesquels ils se trouvent : on monte par degrés, du pouls des enfans à celui des adultes en passant par tous les âges intermédiaires : le pouls des enfans se *dilate*, se *ralentit*, acquiert du *corps* & de *l'aisance*, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'état de *maturité*, ou de *consistance* du pouls de l'âge adulte ; celui-ci perd de sa *sou-*

plèssè, de sa *vigueur*, de sa *liberté* ; il se *durcit*, à proportion qu'on approche de la *vieillesse*.

Le pouls naturel des femmes est ; en général plus *vis*, & plus approchant de celui des enfans & de la jeunesse que le pouls des hommes ; il a ses degrés particuliers, *sa jeunesse*, *son âge moyen*, *sa vieillesse*.

En partant donc de quelques points fixes aisés à vérifier, sur la nature & les différences du pouls, on étend & on arrange ses connoissances ; on apprend à mettre toutes les espèces de pouls sous un point de vue où l'on peut les considérer, les classer, suivant l'ordre de la nature, dans la *table*, ou la *liste* générale que l'esprit en fait pour son usage.

Les Médecins les plus clairvoyans & les plus assurés sur ce genre de connoissances, sont ceux dont la tête est la mieux fournie de toutes les images des différentes espèces de pouls ; ceux dans lesquels ces images sont si bien placées, si bien arrangées, qu'il ne puisse presque pas y avoir de confusion, & que la mé-

moire leur présente distinctement l'idée de l'espèce de pouls ressemblant à celui qu'ils tâtent.

C'est au moyen de cette provision de faits , que les Médecins s'entendent entr'eux , & que lorsqu'ils avancent qu'un pouls est *dur, mol, fréquent, foible, &c.* ils sous-entendent toujours l'état auquel ces dénominations doivent être comparées, sans quoi elles n'auroient aucune signification.

C'est aussi pour la même raison , & par l'effet de la netteté de ces idées que les Médecins, dont le *tâct* est bien exercé, se décident quelquefois, sur l'état du pouls, par une première sensation presque machinale & souvent précieuse : heureuse sorte d'enthousiasme dont les génies froids & paresseux ne sont pas capables, & dont les connoisseurs sentent seuls le prix !



CHAPITRE II.

De la maniere particuliere dont les différentes especes de pouls seront distinguées dans cet ouvrage.

DE tous les moyens propres à bien caractériser les différentes especes de pouls , le moins sujet à tromper est celui par lequel on peut peindre chaque pouls , de maniere qu'un observateur n'ait pas besoin de se rappeler un pouls qu'il a tâté autrefois pour mettre celui qu'il tâte actuellement, dans la classe qui lui appartient.

Un exemple va servir à éclaircir cette proposition : il est dit dans le Chapitre précédent , que les dénominations du pouls *grand* , *foible* , *mol* , *dur* , *plein* , *vuide* , n'ayant qu'un sens vague & indéterminé , il faut que celui qui veut juger le pouls connoisse une mesure commune à laquelle il puisse comparer la *grandeur* , la *foiblesse* , la *dureté* ; il doit donc

avoir dans l'esprit la pièce ou le pouls de comparaison, auquel il puisse rapporter celui qu'il veut juger.

Il est aisé de comprendre que l'attention se partage entre ces deux objets, & que l'opération par laquelle l'aine met en parallele le pouls *présent* avec un pouls *absent*, suppose un effort considérable : il peut arriver que la mémoire représentera faiblement l'image du pouls tâté autrefois, ou bien que le *tact* sera distrait de son objet actuel ; de-là doit naître, aisément, une très-grande confusion.

Au lieu que si les especes de pouls sont déterminées de façon que pour en juger, un observateur puisse ne s'occuper que du pouls qu'il tâte actuellement, & qu'il soit assuré d'en découvrir les caractères distinctifs, sans être obligé de se rappeler les especes de pouls auxquelles il faille les comparer, le *tact* & le jugement du pouls deviennent bien plus aisés & plus certains.

Or quelques-uns des principaux caractères donnés au pouls, dans

cet ouvrage , font précisément de nature à pouvoir être apperçus , sans s'occuper d'aucun autre pouls que de celui qu'on tâte.

En effet , *l'égalité & l'inégalité* des pulsations sont deux principales sources d'où l'on tirera les différences des pouls : *l'égalité* des pulsations est une chose fort aisée à vérifier , ainsi que leur *inégalité* : les pulsations qu'il faut comparer se suivent immédiatement ; à peine a-t-on senti l'une qu'on sent l'autre ; l'impression de la première est à peine détruite dans le doigt , qu'il sent la seconde , qui produit un même effet , ou un effet différent ; d'où résultent *l'égalité & l'inégalité*.

Elles doivent être encore considérées d'une autre manière ; car les distances ou les intervalles qui sont entre les pulsations peuvent être *égaux* , ou *inégaux* , ce qu'il n'est pas difficile de sentir , à peu de chose près ; ces distances , ou ces intervalles fournissent un nouveau moyen de juger de l'état du pouls , & ce moyen est aussi simple que le précédent.

On peut déjà juger de l'avantage de cette méthode particulière sur la méthode générale, dont il est parlé dans le Chapitre précédent, à laquelle il sera nécessaire d'avoir quelquefois recours.

Il y a, par exemple, des poulx qui seront appelés *petits*, *serrés*, *durs*, *pleins*, *dilatés*, *développés*; c'est comme si on disoit qu'ils sont plus *petits*, plus *pleins*, plus *mols*, plus *développés*, que dans l'état ordinaire ou naturel au sujet qu'on examine: il faudra donc être muni d'observations antérieures, qui donnent une idée de ces qualités naturelles du poulx; c'est-à-dire, qu'on doit s'être exercé à tâter beaucoup de poulx, & sur-tout avoir été conduit dans ses essais, par un bon Praticien.

La *fréquence* du poulx, la *célérité*, la *vitesse*, peuvent être prises pour la même modification, pour ne pas entrer dans bien des disputes qui ont partagé quelques Auteurs sur la différence qu'il faut mettre entre la *célérité*, la *fréquence* & la *vitesse*.

Quoi qu'il en soit, la *fréquence* du

pouls peut-être mesurée exactement ; & il est fort aisé de comparer la *fréquence* naturelle avec la *fréquence* contre nature , comme quelques Médecins l'ont déjà entrepris.

Le nombre des pulsations s'estime par le tems qu'on peut mesurer en tâtant le pouls : on voit exactement , combien de fois un pouls bat pendant une minute , pendant un quart-d'heure , au moyen d'une montre , ou d'une sorte de pendule. Ce pendule n'est qu'une balle de plomb suspendue à un fil qu'on met en mouvement & dont les oscillations ou les vibrations sont plus ou moins lentes suivant la longueur du fil , ou suivant la distance de la balle , au point où le fil est arrêté.

Chaque sujet , dit peut-être trop scrupuleusement un Auteur moderne , pourroit , dans un besoin avoir son pendule à pouls , apprendre au Médecin combien de fois son pouls bat ordinairement dans une minute : le Médecin auroit donc le moyen de juger bien exactement de la *fréquence* du pouls contre nature ; mais cette

méthode a des inconvéniens qui ne font pas médiocres; le principal est de ne pouvoir indiquer *l'égalité & l'inégalité* des pulsations & de leurs intervalles.

D'ailleurs, il sera souvent question, dans cet ouvrage, de la *fréquence*, sans qu'elle soit prise pour un caractère distinctif des différentes especes de pouls: elle sera jugée & évaluée à la maniere des Praticiens ordinaires; c'est-à-dire, en comparant la *fréquence* naturelle avec la *fréquence* contre nature, d'après les observations précédentes, & les notions acquises par l'expérience, sans montre, sans pendule à pouls.

Il est à propos de remarquer, que *l'égalité & l'inégalité* des pulsations sont des phénomènes auxquels presque tous les Médecins ont toujours fait attention depuis Galien; mais ces deux modifications du pouls n'ont pas été considérées comme elles le seront dans cet ouvrage.

Au reste quel que soit l'usage qu'on peut faire du pouls pour juger de la nature & des événemens des ma-

ladies, il ne faut pas penser qu'on doive s'en tenir uniquement au pouls, pour porter ces jugemens ; il faut, à l'exemple de tous les Médecins, rassembler, lorsqu'on juge de l'état d'une maladie, tous les symptômes, & peser toutes les circonstances : dans combien d'écueils ne tomberoit-on pas sans cette précaution ?

On peut trouver, par exemple, des personnes qui se portent bien & dont le pouls paroît *fort mauvais en soi*, & il y a des malades prêts à entrer dans l'agonie dans lesquels le pouls paroît *bon en soi* : ces cas, qui sont assez rares, seront détaillés & mis à leur place.



CHAPITRE III.

Division générale du Pouls.

LE pouls *naturel & parfait des adultes* indiqué & décrit dans le Chapitre I. est le point dont il faut partir pour se former une idée exacte de la division la plus générale du pouls.

Ce pouls est *égal* ; ses pulsations se ressemblent parfaitement , elles sont à des distances parfaitement égales ; il est *molet* , *souple* , *libre* , *point fréquent* , *point lent* , *vigoureux* , *sans paroître faire aucune sorte d'effort*.

Il semble que l'harmonie qui résulte de l'action de toutes les parties, forme & entretienne l'existence & la durée de ce pouls parfait : quelle que soit la manière dont les organes concourent aux mouvemens du cœur & des artères , il paroît certain que l'aisance de leurs fonctions , & les compressions ou les efforts gradués & ménagés qui en sont la suite , sont

la vraie cause de l'aisance, & de la liberté du pouls, les vaisseaux éclateroient s'ils n'étoient pas contenus : s'ils sont trop comprimés, les mouvemens du sang en souffrent : la dilatation & la constriction des artères ne sont peut-être que l'effet du contrebalancement perpétuel de toutes les parties *sensibles*.

Mais si quelque partie se déränge par quelque cause que ce puisse être, l'harmonie des mouvemens du corps est troublée ; le pouls se ressent de ce trouble : semblable au mouvement d'un vaisseau qui fend la mer à pleines voiles, par un vent favorable, & qui est aisément dérangé dans sa *course* par les changemens que le vent & les cordages peuvent faire dans l'effet des voiles ; le pouls est de même troublé dans sa marche dès que quelque organe du corps fait un effort, une compression, un tiraillement extraordinaire.

Il est enfin démontré par mille expériences trop aisées à faire, que le pouls se déränge jusqu'à un certain point par la plus petite douleur.

par le moindre effort, par une passion un peu vive.

Or le pouls naturel des adultes, duquel il est question, se déränge de deux manieres principales, sur-tout dans les maladies : le pouls de *libre*, *dilaté*, *souple*, *molet*, & *d'assez plein* qu'il étoit, se *resserre*, il devient *fréquent*, *vis*, *dur*, *sec*, *pressé* ; il acquiert des modifications semblables à celles du pouls des enfans, quelquefois sans perdre son égalité ; ou bien il se *dilate*, il devient plus *saillant*, *plein*, *fort*, *fréquent* & *souvent inégal* ; voila donc deux changemens considérables & presque directement opposés : l'un apprend à se former une idée de l'autre.

La premiere espece de pouls sera appelée *pouls avec trop de sensibilité*, *pouls d'irritation*, *nerveux*, *convulsif*, *non critique* ; ce pouls n'annonce pas d'excrétion critique, ce qui est démontré par l'expérience ; il est très-ordinaire dans le commencement des maladies, & sur-tout dans les maladies *nerveuses* ; il mérite d'être étudié avec beaucoup de soin : un Médecin prudent devient très-cir-

conspect lorsqu'il le trouve , sçachant bien , par son expérience , que ce pouls exclut toute crise favorable. (1)

La deuxieme espece de pouls sera appelée pouls *dilaté* , *développé* , *ramolli* , *étendu* , *critique* , parce qu'il précède les évacuations critiques surtout lorsqu'il se montre avec des *inégalités*.

Ce pouls *développé* est connu des Médecins ; il est toujours d'assez bon augure , pourvu qu'il se soutienne pendant un certain tems : si ses pulsations sont égales en tout , & par leurs distances & par la force de l'artere , alors il n'annonce qu'une disposition aux évacuations en général , & non point à quelque évacuation particuliere ; la révolution qu'on appelle *coction* , ou la préparation des humeurs qui seront la matiere de l'excrétion critique , se fait dans ce tems-là ; mais l'organe par lequel l'excrétion va se faire n'est pas déterminé.

Ce pouls ne demeure pas long-tems dans cette indécision , sur-tout dans

(1) Voyez le Chapitre 24.

les maladies qui parcourent promptement leurs tems; à peine se montre-t'il dans quelques-unes de ces maladies; c'est dans leur milieu, ou dans leur *état* qu'on l'appërçoit ordinairement.

Il faut le regarder comme une condition nécessaire pour que la crise soit complète & heureuse, s'il arrive que les excretions qui semblent critiques, ne soient pas précédées du pouls *développé*, & ce qui est pire encore, qu'elles se fassent avec le pouls *d'irritation*, alors il y a tout à craindre; c'est le cas des *complications* qui seront examinées plus loin. (1)

Toutes ces vérités seront étendues & éclaircies dans la suite: l'histoire du pouls *développé & critique*, ou qui annonce des excretions critiques, va précéder celle du pouls *d'irritation* ou *non critique*.

(1) Voyez les Chapitres 27, 28, &c.



CHAPITRE IV.

Division du pouls développé ou critique.

HIPPOCRATE a indiqué dans ses Aphorismes (1), une division générale des maladies dont les Commentateurs ne paroissent point avoir senti l'importance & l'étendue : elles sont, dit-il, *au-dessus, ou au-dessous du diaphragme.*

Hippocrate n'avoit d'autre modele que la nature ; il ne la perdoit jamais de vue, & il savoit la suivre exactement ; il se trouve en effet que le diaphragme divise le corps en deux parties, & qu'il résulte de cette division plusieurs effets très-remarquables ; les maladies de même genre ont dans leur marche, des différences essentielles selon qu'elles sont au-dessus ou au-dessous du diaphragme.

On trouvera en son lieu, dans la

1) Aphor. 12. sect. 4.

suite de cet ouvrage, les remarques qu'il y a à faire, au sujet d'une autre division du corps par son axe, qui le partage en deux moitiés latérales.

Il est à propos de jeter un coup d'œil sur la maniere dont la premiere de ces divisions peut être justifiée aux yeux des Anatomistes, relativement aux loix générales de la circulation.

Les troncs des gros vaisseaux sanguins percent le diaphragme : les orifices sont disposés de maniere que le cours du sang ne sçauroit être entièrement suspendu, & intercepté par les mouvemens de ce muscle singulier ; mais est-il possible de démontrer à la rigueur, vù la maniere dont l'aorte passe derriere le diaphragme, & dont elle est contenue entre ce muscle & l'épine du dos, qu'aucun effort du diaphragme ne puisse influer sur les mouvemens du sang ?

Il seroit trop long de rapporter & de discuter ici tout ce qui regarde cette question, qui est bien digne de l'attention des Anatomistes, ainsi que l'examen du passage de la veine cave à travers le diaphragme, & son

union, de même que celle de l'aorte, avec la plevre & le péritoine.

Quoi qu'il en soit, si, comme on l'a avancé dans le Chapitre II^e, toutes les parties influent sur l'action du cœur & des vaisseaux sanguins, & par conséquent sur les mouvemens du pouls, les parties qui sont dans des régions différentes, doivent produire des changemens différens; ces changemens doivent avoir quelque ressemblance entr'eux, lorsqu'ils sont l'effet de l'action des parties qui se trouvent dans la même région, sous la direction & dans le *département* des nerfs qui viennent des mêmes plexus.

Il suit de cette remarque, que l'action des organes du bas-ventre doit opérer sur le pouls une modification particulière; celle des organes de la poitrine une autre; ainsi que celle des organes de la tête.

On ne s'attend pas à trouver ici des expositions Anatomiques, non plus que des discussions de Théorie; d'autant plus que tout ce qui peut résulter des différences de l'action des

nerfs sur le mouvement du cœur & sur celui des vaisseaux sanguins, est assez connu en général, pour qu'il soit aisé d'en faire quelque application aux efforts respectifs des parties organiques.

Mais l'observation qui est la principale boussole à consulter, démontre qu'il y a une différence marquée entre les pouls des maladies dans lesquelles les évacuations critiques se font par les organes situés au-dessus du diaphragme, & celui des maladies dont les excrétiens se font par les organes situés au-dessous du diaphragme; il n'y a qu'à voir des malades pour vérifier ce fait que les observations rapportées dans cet ouvrage mettront dans tout son jour.

On peut, ce semble, appeller l'un de ces pouls *supérieur*, puisqu'il paroît principalement déterminé ou régi, par l'action des parties supérieures au diaphragme; & l'autre *inférieur*, puisqu'il paroît dépendre des efforts des parties inférieures: ils ont chacun leur caractère particulier & très-reconnoissable, comme on va le voir dans les Chapitres suivans.

CHAPITRE V.

Du Pouls supérieur & de ses différentes especes.

LE pouls *supérieur* indique l'embaras des organes situés au-dessus du diaphragme ; il précède l'excrétion critique de ces organes ; cette especes de pouls a les caractères particuliers très-distinctifs , du moins lorsqu'il est bien décidé *supérieur*.

Il est toujours remarquable par une *réduplication précipitée dans les pulsations des arteres* ; cette *réduplication* qui le constitue essentiellement , ne paroît être que le fonds d'une seule pulsation partagée en deux tems ou en deux pulsations ; elle est sujette à laisser de tems en tems des intervalles ; ces intervalles sont plus ou moins longs , ou plus ou moins frequens selon la nature , ou le degré de la maladie.

Cette dilatation qui se fait en deux tems ou par un double effort , paroît assez comparable à l'effet d'un piston

qui pousseroit une liqueur dans un cylindre élastique, de maniere que le second jet de la liqueur n'attendît pas que le premier se fût répandu dans le vaisseau

Ce qui caractérise donc le pouls *supérieur*, n'est que la dilatation qui *devroit se faire naturellement en un tems*, qui cependant se fait en deux tems ou par deux efforts sensibles, & qui succède à une contraction naturelle de l'artere.

On peut compter trois especes de pouls *supérieur-critique*; la première est celle qui annonce, qui suit, ou qui accompagne les excretions de la poitrine; & par cette raison il ne paroît gueres possible de la mieux désigner que par la dénomination de *pouls pectoral*.

La deuxième espece est le pouls *guttural*; celui qu'on trouve, par exemple, à la fin de la plupart des maux de gorge ordinaires & simples, & qui est suivi de crachats qui viennent des glandes de la gorge.

La troisième espece de pouls *supérieur* est le *nasal* qui précède les

excrétions qui se font par le nez ; cette troisième espece est sujette à des variations qui sembleroient former une quatrième espece , lorsque toutes les parties de la tête participent à l'effort excrétoire , comme on le verra dans son lieu.

Il s'agit à présent de bien décrire le pouls *pectoral* , le *guttural* & le *capital* ; ces différentes especes de pouls sont quelquefois seules , c'est lorsque l'excrétion se fait par une organe seulement : dans ces cas là le pouls sera nommé *simple* : le pouls *composé* , sera celui qui se rencontre lorsque l'excrétion critique se fait assez librement , par deux ou plusieurs organes : on pourroit appeller cette espece de pouls *composé* , & nommer *complicqué* celui qu'on observe dans les cas où l'effort critique se trouve interrompu ou contrarié , par un état d'*irritation* qui s'oppose au progrès de la crise (1).

Dans quelque état que se trouvent ces différentes especes de pouls *supé-*

(1) Voyez les Chapitres 17 & 24.

rieur , elles conservent toujours un caractère général qui les fixe dans leur classe. Tout cela sera établi & décrit exactement dans les observations détaillées aux Chapitres suivans.

Il fera d'abord question des *pouls simples* pour passer ensuite aux *composés* & aux *compliqués* ; c'est l'ordre le plus facile & le plus naturel ; mais tel est l'enchaînement de ces matieres que l'intelligence complete de l'une dépend toujours de celle de l'autre ; il faut donc les examiner toutes avec le même scrupule & la même attention , & sur-tout ne pas trop s'arrêter à des difficultés qu'on croiroit d'abord pouvoir se faire.



CHAPITRE VI.

Du Pouls des excrétiens critiques de la poitrine , ou pectoral simple.

C E pouls est important à connoître & fort commun , parce que les excrétiens de la poitrine font très-fréquentes & que ces excrétiens doivent être ménagées avec plus de précaution que toutes les autres.

Le pouls *pectoral simple* annonce l'excrétion critique de la poitrine ; il accompagne toujours cette excréction lorsqu'elle est complète & bien critique , c'est-à-dire , qu'elle n'est dérangée par aucune autre excréction qui fasse plus d'impression sur le pouls , ou par quelque autre modification dont il peut être susceptible : le pouls *pectoral* ne cesse pas toujours, quoique l'excrétion soit déjà faite ; & c'est alors , ordinairement , une marque que cette excréction n'est pas complète ; c'est ce qu'il a de com-

mun avec les autres pouls critiques.

Ces diverses circonstances du pouls *pectoral*, paroissent former trois états particuliers , qui dans le fonds ne diffèrent entr'eux que par le plus ou le moins de facilité de l'effort critique ; ces différences sont assez aisées à comprendre & à observer , pour qu'il soit nécessaire d'en faire un examen plus particulier. Le point principal est de bien différencier le pouls *pectoral* d'avec les autres especes de pouls *critiques*.

S'il en est quelqu'un avec lequel on puisse le confondre , c'est le pouls *guttural* , & ensuite le *nasal* ; mais cette méprise ne seroit pas d'une grande conséquence , elle pourroit être plus dangereuse si elle se faisoit avec les pouls *inférieurs* ; ce qui ne peut , ordinairement , arriver que par un défaut d'attention de la part de l'observateur.

Les caracteres distinctifs & invariables du pouls *pectoral simple* & bien déclaré , sont les suivans ; il est *mol* , *plein* , *dilaté* , *ses pulsations sont égales* ; on sent dans chacune une espece

d'ondulation ; c'est-à-dire que la dilatation de l'artere se fait en deux fois ; mais avec une aisance , une mollesse & une douce force d'oscillations qui ne permettent pas de confondre cette espece de pouls avec les autres.

Il s'agit à présent de constater ces caracteres par les observations qui les ont fait connoître ; on se contentera dans les observations où l'on n'aura pour objet que d'exposer les caracteres distinctifs des pouls *simples* , de rapporter seulement les détails qui prouveront l'existence de ces pouls *simples* ; & ce ne fera qu'après avoir parlé des pouls *compliqués* qu'on placera des observations propres à faire juger des avantages ou des inconvéniens des différentes méthodes de traitement

OBSERVATION I.

Une jeune fille naturellement bien constituée , qui étoit vers le onzieme jour d'une fièvre continue avec des redoublemens , étoit dans l'usage du quinquina à petite doze , & on avoit

fait précéder les remèdes convenables à la maladie ; c'est dans ce tems-là que je fus appelé pour la première fois ; ayant trouvé le pouls *pectoral* assez déclaré , je fus d'avis de supprimer l'usage du quinquina.

On m'objecta qu'il n'y avoit ni toux , ni point de côté , ni difficulté de respirer : le pouls tâté à plusieurs reprises , m'ayant toujours paru décidément *pectoral* , c'est-à-dire , *mol* , *plein* , *fréquent* , *redoublé* , *se soutenant dans cet état* , je persistai dans mon avis & j'annonçai que bientôt (1) la malade cracheroit des matieres *cuites* & comme purulentes , ce qui termineroit la maladie.

Deux jours après , c'étoit vers le quatorzième jour de la maladie , la malade eut une extinction de voix qui dura trois jours , elle toussa beaucoup & cracha fort abondamment ; la maladie fut terminée vers le vingt.

(1) On trouvera dans la suite de cet ouvrage , des remarques au sujet du tems auquel doivent arriver les excrétiions annoncées par le pouls.

OBSERVATION II.

Fièvre continue avec des redoublemens dans un jeune homme assez bien constitué ; plusieurs saignées & purgations qui paroïssent avoir été placées à propos , n'avoient apporté aucun changement notable ; le pouls avoit été *convulsif* & *non critique* pendant les treize premiers jours ; il se développa vers le quatorzième , & devint *pectoral* ; le ventre se bouffit un peu ; des évacuations produites par des apozemes purgatifs se supprimerent.

J'annonçai que la maladie se termineroit par des crachats peut-être purulens : trois jeunes Médecins témoins de ce pronostic , déclarerent qu'ils en doutoient beaucoup parce qu'il n'y avoit point de toux , & que rien n'indiquoit que la poitrine fût engagée , trois jours se passerent sans presque aucune évacuation du ventre , & avec peu d'urines ; le pouls demeura *pectoral* quoiqu'avec de fréquentes interruptions , mais légères ; vers le

dix-huitieme jour de la maladie, il survint une toux violente, les crachats furent très-abondans & un peu suspects pendant plusieurs jours: la maladie fut terminée quoiqu'imparfaitement.

OBSERVATION III.

Le pouls étant *plein, mol, redoublé, point trop fréquent*, & par conséquent *pẽtoral* dès le quatrieme jour d'une fièvre légère dans un sujet de moyen âge: je jugeai que la crise ne tarderoit pas à se faire par les crachats; ils viennent en assez grande quantité dès le sixieme jour; ils sont cuits quoiqu'un peu sanguinolens; le pouls se soutient *pẽtoral* quoique souvent *compliqué* avec le pouls *inférieur* jusqu'au dixieme jour; alors il devient *inférieur* décidé; la bile coule abondamment, & le malade entre en convalescence.

OBSERVATION IV.

Fluxion cathareuse avec fièvre;

& toux assez vive dans un vieillard : le pouls est *convulsif* & *non critique* pendant les quatre premiers jours ; alors il se *développe* , il *s'étend* , il se *ramolit* , il devient *redoublé avec une égalité* & *une plénitude marquées* , il est *pectoral* : j'annonçai les crachats qui furent très-abondans , *muqueux* & presque puriformes , à commencer du cinquième & sixième jour jusques vers le onzième ; le ventre fut resserré pendant ce tems là ; le pouls cessa d'être *pectoral* , le ventre devint libre , & la maladie fut terminée.

OBSERVATION V.

Fluxion de poitrine avec crachement de sang au cinquième jour , dans un homme de moyen âge ; des symptômes effrayans dans le sixième ; du septième au huitième le pouls devient *pectoral* ; les crachats viennent ensuite fort épais , abondans , & ils sont rendus avec aisance ; le pouls cesse d'être *pectoral* , le ventre s'ouvre , les évacuations sont abondantes , les crachats semblent épuisés ; mais le

pouls se relevant de nouveau , se *développant* davantage , & redevenant *pectoral* , ce qui arrive dans l'intervalle du quatorzième jour au vingtième , les crachats reparoissent & la maladie se termine par là.

On pourroit rapporter beaucoup d'observations pareilles à celles-ci , & faites dans des sujets de différens âges & de différentes complexions , par lesquelles on verroit que de pareils changemens du pouls ont été le symptôme le plus fixe : Il est même essentiel de remarquer , que cette marche du pouls s'est non-seulement soutenue dans des sujets différens d'âge & de complexion , mais même avec de différentes méthodes de traitement , lorsque ces méthodes n'ont pas été trop actives.

OBSERVATION VI.

Le pouls est bien évidemment *pectoral* , *plein* , *redoublé* , *mol* , *égal* & *ondulant avec liberté* du dixième au onzième jour d'une fièvre continue ; les crachats qu'on avoit jugé devoir

arriver vers le quatorzième, arrivent en effet; ils sont épais, cuits, abondans, & ils terminent la maladie.

OBSERVATION VII.

Une femme dont les vuidanges alloient très-bien, trois jours après ses couches, avoit le pouls *inférieur*, comme cela est assez ordinaire (1); les vuidanges s'arrêterent, le pouls devint, quelque tems après, *redoublé dans chaque pulsation; souple, plein, égal*, c'est-à-dire *pectoral*; la malade cracha du onzième au quatorzième jour une prodigieuse quantité d'humours glaireux, comme purulentes, & sa poitrine resta longtems affectée: le pouls eut quelque chose de *pectoral* jusqu'à ce que les règles s'étant bien décidées, il redevint *inférieur*, & la maladie fut terminée.

OBSERVATION VIII.

Deux malades qui ont craché des vomiques ont eu constamment pen-

(1) Voyez Chapitre 12.

dant le cours de leurs maladies, le pouls *redoublé*, *plein*, *pectoral*, mais avec une *dureté* considérable ; on voit bien que cette dureté a dû être la suite de l'état *d'irritation* essentielle à de pareilles maladies. (Voyez les Chapitres des pouls *compliqués*.)

OBSERVATION IX.

Le pouls *pectoral* pendant plusieurs jours dans des maladies graves & dans des complexions & des âges différens ; il arrive vers le onzième ou vers le quatorzième jour, que ce pouls se *complique* avec le pouls *d'irritation* ; les crachats mal conditionnés viennent quelquefois abondamment du vingt au vingt-cinq ou environ, mais les malades sont morts après cette expectoration : ces exemples malheureusement ne sont pas rares, & sont allégués ici pour prouver que les crachats sont presque toujours précédés du pouls *pectoral*.



OBSERVATION X.

Un enfant auquel on avoit fait l'opération de la taille & dont le pouls fut d'abord *convulsif*, comme cela est ordinaire, eut vers le sixieme jour de l'opération, le pouls *dilaté*, *redoublé*, *pectoral*; il cracha les jours suivans beaucoup de matieres épaisses & il guérit: au lieu qu'un adulte, qui avoit aussi souffert l'opération de la taille, & dont le pouls devint *pectoral*, mais *compliqué* avec un pouls très-*convulsif*, mourut en crachant des matieres purulentes.

OBSERVATION XI.

Un Soldat reçut un coup d'épée qui lui blessa le poumon droit; le pouls fut, pendant quelque tems, dans l'état d'*irritation*; il se *ramolit*, ensuite il devint *plein*, *redoublé*, *comme ondulant*, il fut *pectoral* décidé, & les crachats qui avoient été sanguinolens pendant les premiers tems, furent bien liés & bien cuits;

le pouls redevint *convulsif*, les crachats furent purulens, & le malade mourut vers le trentième jour.

OBSERVATION XII.

Un hydropique dans lequel tout le tissu cellulaire étoit engorgé, sans qu'il y eut des signes d'épanchement dans aucune des cavités, avoit le pouls *vis*, *petit*, *fréquent*, *peu régulier*, c'est-à-dire *convulsif*; le malade eut un point de côté & cracha du sang; le pouls se développa, devint *pectoral* & fut suivi de l'expectoration d'une grande quantité de matières muqueuses, puriformes; le malade mourut longtems après, hydropique de poitrine.

OBSERVATION XIII.

Le pouls est tâté à différentes reprises à plus de trente malades, devant des personnes curieuses de vérifier l'existence du pouls *pectoral*; ces malades sont la plupart vers la fin de la maladie, du quatorze au

vingt-cinq ; leur pouls est bien *pectoral* , *plein* , *moëux* , *redoublé avec souplesse* , *aisé ou libre* dans ses mouvemens , *constant* , *égal dans toutes ses pulsations* ; leurs crachoirs sont pleins de matiere *grasse* , *cuite* , *comme purulente* ; la plupart de ces malades ont le ventre ferré.

Les observations qu'on vient de lire , suffisent pour établir l'existence & le caractère distinctif du pouls *pectoral* ; on voit comment ce pouls , lorsqu'il est bien déclaré , est constamment suivi de l'excrétion des crachats ; mais il est bon de remarquer qu'il ne faut pas s'attendre à trouver ces especes d'observations les mêmes dans toutes leurs circonstances que celles qu'on vient de rapporter.

D'ailleurs on ne scauroit espérer de saisir exactement toutes ces circonstances dans les premières tentatives qu'on fera de cette maniere d'observer ; ce n'est qu'après s'en être formé l'habitude qu'on parvient à distinguer heureusement les cas *simples* & les *compliqués* , ainsi que toutes les nuances ou les différences qui seront exposées dans cet ouvrage.

CHAPITRE VII.

Du Pouls des excrétions critiques de la gorge, ou guttural simple.

LE pouls *guttural simple* ou qui n'annonce simplement que les excrétions des glandes de la gorge est assez rare ; il est fort ordinaire de trouver ce pouls *compliqué* avec le pouls *d'irritation*, ou combiné avec le *pectoral* ou le *nasal* ; examinons d'abord le pouls *guttural simple*.

Ce pouls est *développé*, comme le *pectoral*, qualité essentielle, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, à toute sorte de pouls bien critique ; il tient évidemment de la disposition qui caractérise le pouls supérieur, c'est-à-dire qu'il est fort, avec un redoublement dans chaque battement, il est moins mol, moins plein, souvent plus fréquent que le pouls *pectoral* ; il paroît être intermédiaire entre le pouls *pectoral* décrit dans le Chapitre précédent, & le *nasal* qui sera décrit dans le Chapitre suivant ;

il faut donc pour connoître ce pouls avoir une idée exacte du pouls *pectoral* & du *nazal* ; il tient de l'un & de l'autre de ces deux pouls ; & il se trouve souvent si confondu avec eux, qu'il est difficile de le distinguer d'abord ; mais on verra dans la suite, que cette méprise seroit de petite conséquence.

Au reste les qualités moyennes du pouls *guttural* entre celles du *pectoral* & du *nazal* peuvent être, naturellement, déduites de la position de la gorge, entre le nez & les poumons.

OBSERVATION XIV.

Un homme qui avoit la mâchoire inférieure tres-petite & très-reculée, étoit sujet à des maux de gorge & en avoit déjà eu, à l'âge de trente ans, neuf attaques avec fièvre, gonflement des amigdales &c. Son pouls étoit au commencement d'une de ces attaques très-vif, très-petit-, serré, dur ; il se ramolit & se développa un peu vers le quatrième jour ; les glandes de la gorge devinrent alors pro-

digieusement gonflées , & vers le fixieme le pouls devint redoublé , à peu-près comme le pectoral , mais il étoit moins souple , moins libre ; les redoublemens de l'artere étoient moins égaux , plus durs , plus secs , & les battemens plus fréquens qu'ils ne le sont ordinairement dans le pouls pectoral ; le malade cracha du neuf au douze une quantité prodigieuse de mucosité un peu puriforme qui paroissoit évidemment sortir des glandes de la gorge ; la maladie se termina par cette évacuation.

OBSERVATION XV.

Une personne qui avoit un gouëtre assez considérable avec un gonflement habituel de toutes les glandes de la gorge , étoit fort sujette , dans tous les changemens de tems , à des maux de gorge violens , le pouls étoit tendu , sec , & assez dur dans les commencemens de la fièvre qui accompagnoit toujours ces sortes de paroxismes avec une inflammation de tous les corps glanduleux de l'arriere-bouche.

Lorsque

Lorsque la fièvre étoit dans ses derniers tems , le malade rendoit une grande quantité de matière *muqueuse, glaireuse & presque purulente* , & les glandes de la gorge se dégorgeoient considérablement; le pouls étoit constamment , pendant le tems de cette excrétion & deux ou trois jours avant, *dilaté, vif, redoublé, avec quelque chose d'aigu dans les pulsations*; le malade avoit lui-même remarqué que lorsque les évacuations des glaires ne se faisoient pas avec aisance , la chaleur & la fièvre augmentoient , & il y avoit un saignement de nez plus ou moins abondant ; on en trouvera la raison dans le Chapitre suivant.

OBSERVATION XVI.

Une fille âgée de quarante ans qui étoit au point de perdre ses règles , eut un mal de gorge dans lequel les amigdales furent extrêmement prises; il en sortit dans les derniers tems de la maladie beaucoup de petits paquets de matières comme purulentes; le pouls étoit *vif, concentré & fréquent*

dans le commencement de la maladie , il se *dilata* beaucoup vers le sixieme jour , il devint redoublé avec une vivacité remarquable , & depuis ce jour jusqu'au onze , les excrétiions de la gorge furent très-abondantes ; il ne sortit que quelques gouttes de sang du nez , & un peu de mucosité ou de matieres cuites , vers la terminaison de la maladie.

OBSERVATION XVII.

Une angine se termine par la supuration dans les glandes amigdales ; le pouls est sur la fin de la maladie *dilaté* , fréquent , redoublé , & le second coup de l'artere dans chacune des pulsations doubles est notablement plus aigu que le précédent.

Un malade auquel on a percé un dépôt dans une des amigdales depuis deux jours , a le pouls *vif & convulsif* ; il y a des redoublemens évidens dans les pulsations ; il sort beaucoup de matieres de l'ouverture qui a été faite dans le corps de l'amigdale ; ce pouls continue jusqu'au déclin de la

suppuration. On fera voir en traitant du pouls propre à la suppuration quelles sont les qualités qui le caractérisent.

OBSERVATION XVIII.

Gonflement considérable d'une des glandes maxillaires & de l'amigdale du même côté, accompagné de fièvre avec un pouls qui est d'abord *convulsif*, & qui vers le septieme jour de la maladie devient *dur*, *plein*, *légerement redoublé*; à proportion qu'il se fait une évacuation considérable de mucoité par la gorge, & que les glandes affectées reviennent dans leur état naturel.

OBSERVATION XIX.

Fièvre putride maligne sur la fin de laquelle le pouls devient *plein*, *assez dur*, *redoublé avec une vitesse remarquable*, & faisant sur le doigt l'impression d'une sorte de *pulsation aiguë*; ce pouls fut suivi d'une ex-

érétion abondante de crachats qui paroissent venir de la gorge.

On l'a déjà dit au commencement de ce Chapitre ; le pouls *guttural simple* est assez rare ; il est pour l'ordinaire combiné avec le pouls *pectoral* & le *nasal* ; ce pouls de la gorge est aussi souvent *compliqué* avec le pouls *d'irritation*. Voyez les Chapitres 23. 24. &c.



CHAPITRE VIII.

*Du Pouls des excrétiions du nez ou
nazal simple.*

LE pouls *nazal simple* est celui qui indique que les humeurs sont portées à la tête , principalement vers les émonctoires & les vaisseaux du nez , qui sont les voies ordinaires des excrétiions de la tête.

Or, comme les évacuatiions du nez sont communément aussi pituiteuses ou *muqueuses* que fanguinolentes , il arrive souvent que le pouls *nazal* indique une évacuatiion pituiteuse : d'ailleurs l'excrétiion du nez étant la plus commune de toutes celles de la tête , il suit que le pouls du nez ou *nazal* , pourroit être pris pour le pouls qui indique d'abord des humeurs du côté de la tête.

Ce pouls a , vraisemblablement , ses especes particulieres , & chaque espece ses signes caractéristiques ; mais il n'est question ici , que du

pouls *nasal simple* comme le plus ordinaire.

Il est bon de remarquer d'avance, par rapport au pouls *nasal*, que quoiqu'il soit appelé *simple*, il est néanmoins presque toujours *compliqué* avec le pouls *d'irritation*; aussi est-il rare que l'excrétion du sang par les narines soit bien critique & termine une maladie; elle est, le plus souvent, symptomatique, & ne juge qu'imparfaitement.

Cependant Hippocrate dit, » que
 » ceux qui ayant des fièvres aiguës
 » ont eu un flux abondant & copieux
 » de sang par le nez, sont tous échappés,
 » & il n'en est mort aucun en
 » cette constitution. La fille de Larissea
 » qui avoit une fièvre ardente
 » fut parfaitement jugée au sixième
 » jour (quoique ce jour soit mauvais
 » en soi) par une abondante hémorrhagie
 » du nez, & resta sans fièvre.
 » Methon fut jugé à la santé, le
 » cinquième jour par un flux de sang
 » de la narine gauche.

Quoi qu'il en soit, voici les caractères du pouls *nasal*: il est redou-

blé ainsi que le pouls guttural , mais il est plus plein , plus dur ; il a beaucoup plus de force & de célérité.

Solano appelle ce pouls *dicrotus* , après les Anciens ; (terme qui a été rendu en françois par celui de *rebondissant*) il regarde ce pouls *dicrotus* , comme un signe certain d'une hémorrhagie critique par le nez ; mais des observations faites avec plus de soin démontrent que ce pouls n'est pas toujours suivi d'hémorrhagie , & que cette hémorrhagie lorsqu'elle survient , n'est pas toujours critique : voici les principales remarques qu'il y ait à faire sur cette espèce de pouls.

Premièrement si le pouls est dur , plein , rebondissant avec vivacité , & qu'il se soutienne un certain tems dans cet état , il sera presque toujours suivi du saignement de nez , sur-tout si on ne fait point des remèdes qui soient quelquefois capables d'interrompre ou de détourner cet effort : cette espèce de pouls , presque toujours accompagné d'un degré considérable d'irritation , ne sauroit , par

cette raison , être aussi souvent *critique* que Solano l'a prétendu.

En second lieu, le pouls *moins dur, moins plein, & rebondissant avec beaucoup moins de véhémence & de constance* , est une deuxième espèce de pouls *nasal* qui paroît être plus *critique* , plus *excréteur* que le précédent ; il annonce une excrétion comme purulente, *muqueuse*, ou *pituiteuse* par les narines ; cette excrétion est plus naturelle & paroît être plus sûrement *critique* que le saignement de nez : les observations suivantes feront voir que l'excrétion *muqueuse* des narines arrive plus souvent vers la fin des maladies , au lieu que le saignement de nez arrive souvent au commencement ; ce qui prouve que la première évacuation est *critique* & que l'autre n'est en partie que *symptomatique*.

Troisièmement, lorsque les évacuations critiques ou symptomatiques annoncées par le pouls *nasal* ne peuvent point s'exécuter , par un défaut de disposition dans l'organe , ou d'une détermination convenable de la part de l'effort critique ; il

arrive des délires, des affections soporeuses, des érépèles au visage, des saignemens d'oreilles, des ophthalmies : ces événemens sont déterminés par une si prompte révolution dans la marche de l'effort critique, qu'à peine peut-on saisir les changemens que cette révolution doit produire dans les caracteres du pouls *naçal*.

On a pourtant remarqué que les évacuations indiquées par le pouls *naçal* étant interrompues par des causes propres à produire l'érépèle du visage, ou à déterminer le saignement des oreilles, le pouls *naçal*, pendant ce tems-là, ne perd presque point son caractère ordinaire ; au lieu que dans les affections soporeuses qui y succèdent, il cesse tout d'un coup d'être *naçal* & devient *convulsif* & *non-critique*, comme dans les commencemens des maladies graves, surtout d'espece *nerveuse*, & dans leurs funestes terminaisons. (1)

(1) On trouvera dans les Chapitres 14 & 21 beaucoup de choses qui ont du rapport au Chapitre présent.

Venons aux observations qui démontrent l'existence de ces trois principales espèces de pouls *nazal*.

Le pouls nazal simple suivi pour l'ordinaire du saignement de nez.

OBSERVATION XX.

Un jeune homme d'une constitution robuste paroissant être à peu près dans son état ordinaire de santé, me demanda de lui tâter le pouls ; l'ayant trouvé *nazal* bien déclaré, je dis que s'il étoit dans un état de maladie, je le croirois au moment d'avoir un saignement de nez, il me répondit avec un air d'étonnement, qu'il avoit saigné du nez la veille, & ce jour la même.

OBSERVATION XXI.

Un jeune homme de forte complexion est sujet presque tous les mois à des saignemens de nez très-abondans : il sent cette évacuation se préparer deux ou trois jours avant

qu'elle n'arrive ; la tête devient lourde , le visage rougit considérablement : je lui ai tâté plusieurs fois le pouls dans ces circonstances & en différens tems ; je l'ai trouvé *plein , dur , vigoureux , rebondissant avec effort presque à chaque pulsation ;* bien clairement *naçal* ; l'hémorrhagie du nez annoncée n'a jamais manqué d'arriver ; lorsqu'elle cesse , le pouls devient *égal , souple* , conservant cependant une sorte de pente au *rebondissement*.

OBSERVATION XXII.

Une fille âgée de dix-neuf ans qui paroît très-bien constituée , n'a jamais eu ses règles ; elle est sujette presque chaque mois à un saignement de nez abondant ; il est précédé d'un abattement général, à quoi se joint un *violent rebondissement* du pouls qui devient toujours *dur , plein , fréquent* , plus ou moins *redoublé* dans les différentes pulsations : ayant trouvé le pouls dans cet état , j'annonçai que vraisemblablement dans trois

quatre jours il y auroit un saignement de nez, ce dont la fille ne fut point étonnée, parce qu'elle y étoit sujette; ce saignement arriva en effet au troisieme jour. Cette fille a désiré d'apprendre à connoître l'état du pouls qui annonce l'hémorrhagie, & elle y a très-bien réussi.

OBSERVATION XXIII.

Fievre continue sans redoublemens bien marqués: le pouls est *fréquent, serré, égal*, pendant les quatre premiers jours: du quatrieme au sixieme le pouls se *dilate*, il devient *plein & souple*; il est vers le septieme *dur, fréquent, vigoureux, rebondissant à peu près de trois en trois pulsations*; j'annonçai le saignement de nez pour le neuvieme ou le onzieme jour de la maladie, le pouls est *rebondissant* jusqu'au neuf; depuis ce jour là jusques vers le quatorzieme il y a un saignement de nez qui a paru à plusieurs reprises: vers le vingt le pouls redevient à peu près naturel, & le malade entre en convalescence.

OBSERVATION XXIV.

Fièvre continue avec des redoublemens , sans frisson : le pouls est resté , malgré les remèdes ordinaires , *indécis , serré , convulsif , fréquent* , jusques vers le onzième jour de la maladie ; alors le pouls devient *rebondissant* à peu près à chaque septième ou huitième pulsation : j'annonçai le saignement de nez , sans oser m'hazarder à déterminer le jour. Le *rebondissement* fut plus manifeste & presque à chaque pulsation au treizième ; il sortit quelques gouttes de sang du nez au quatorzième : le *rebondissement* fut encore plus marqué au quinzième ; au seizième l'hémorrhagie du nez fut plus considérable ; au dix-huitième le *rebondissement* devint continuel , & le sang se mit à couler par petites gouttes sans discontinuer jusqu'au vingtième ; du vingt au vingt-cinq le *rebondissement* du pouls reparut & fut suivi à peu près de la même espece de saignement de nez ; du vingt-cinq au trente le pouls revint

dans son état naturel , & le malade put entrer en convalescence.

OBSERVATION XXV.

Un jeune homme âgé de vingt-cinq ans ou environ , qui n'a point de luete & dont le voile du palais est très-repoussé vers les orifices de l'arrière-narine , est fort sujet à l'enchiffrement , & aux excréctions muqueuses du nez ; le sang paroît souvent se porter à la tête : le pouls est naturellement *fréquent , plein , assez fort , tendant au rebondissement* : la fièvre le prit , le pouls devint bientôt *très-redoublé presque à chaque pulsation* ; vers le cinquième jour il devint *très-dur & très-fort* , j'annonçai que le saignement de nez viendrait incessamment ; il arriva en effet du six au sept , & très-abondamment.

OBSERVATION XXVI.

Érécipèle au visage dans une fille : le pouls est *dur , fréquent , vigoureux* ,

rebondissant, presque à chaque pulsation, au quatrième jour de la maladie: le pouls étant dans cet état, je présumai que malgré l'érysipèle il falloit s'attendre à un saignement de nez; il arriva en effet fort abondamment & à plusieurs reprises du neuf au onze; la malade entra en convalescence dès le treizième jour, l'érysipèle ayant parcouru tous ses tems..

OBSERVATION XXVII.

Un homme tomba d'un lieu élevé: il eut une contusion considérable à la tête & un côté du visage fort meurtri: le pouls devint trois jours après la chute, *dur, tendu, redoublé presque à chaque pulsation*; il se soutint dans cet état malgré trois saignées, deux du bras, une du pied; il survint vers le septième jour de la chute un saignement de nez qui dura plusieurs jours à diverses reprises; les accidens diminuerent à proportion, & le pouls redevint dans son état naturel. Voy. les Chapitres 18, 21..

*Le pouls nasal simple qui n'est suivi ni
d'hémorrhagie ni d'aucune excrétion
par le nez.*

OBSERVATION XXVI.

Une fille âgée de vingt-ans étoit vers le seizième jour d'une fièvre continue avec des redoublemens ; le pouls devint tout d'un coup assez plein & rebondissant presque à chaque pulsation ; il étoit cependant moins dur que lorsqu'il est certainement suivi du saignement de nez ; différence qui ne m'empêcha point d'annoncer ce saignement : au lieu de l'hémorrhagie il survint du dix-septième au dix-huitième sur tout le visage , une érysipele considérable qui dura plusieurs jours.

OBSERVATION XXIX.

Douleur sourde qui subsiste depuis quatre jours, dans un homme très-bien constitué ; elle occupoit les gencives supérieures & inférieures du

côté droit : le pouls fut au quatrième jour *vif*, *fréquent*, mais médiocrement *rebondissant* & seulement par intervalles : j'attendois un saignement de nez qui ne vint point ; il survint du six aux sept, une grosseur considérable à la parotide qui vint à suppuration ; le pouls resta *rebondissant* pendant les premiers jours de l'engorgement de cette glande.

OBSERVATION XXX.

Une fille âgée de trente-cinq ans, très-bien constituée ou du moins qui le paroïsoit, n'avoit jamais eu ses règles qu'une fois ; elle avoit chaque mois à la place de cette évacuation une espece de tumeur générale du visage qui avoit l'air d'une érysipele, & qui restoit dans cet état pendant deux ou trois jours : elle avoit habituellement le pouls *développé*, *fort*, *un peu redoublé*, & pendant l'accident il devenoit décidivement *rebondissant*, *naçal*, avec une certaine *moleſſe* qui ne m'empêchoit pas de soupçonner qu'il arriveroit un sai-

gnement de nez ; ce saignement ne paroissoit pourtant que très - rarement : le pouls revenoit dans son état ordinaire après chaque paroxisme , & souvent l'épiderme du visage tomboit par écailles dans les endroits où il avoit été fort affecté.

OBSERVATION XXXI.

Un jeune homme très-vigoureux, ayant cependant la peau d'un jaune rembruni, eut une fièvre continue dans laquelle le pouls se montra un peu *rebondissant* vers le quatrième jour, il sortoit en même tems quelques gouttes de sang de la narine droite : le *rebondissement* augmenta vers le quatorzième jour ; il annonçoit par conséquent un saignement de nez plus considérable ; mais il en arriva tout autrement ; la tête s'embarassa avec un léger délire vers le dix-huitième ; deux jours après il survint un assoupissement létargique, auquel succéda une hémiplegie du côté droit.

Il faut observer que ce malade

fut saigné plusieurs fois du bras & du pied , & qu'il avoit eu l'année précédente une maladie à peu-près du même genre , mais beaucoup moins considérable , qui s'étoit heureusement terminé par un saignement de nez fort abondant.

OBSERVATION XXXII.

Une fille âgée de vingt ans , bien constituée & bien réglée, se plaignoit d'un peu de mal à la tête , & eut un peu de fièvre le jour avant d'avoir ses règles ; elle se fit saigner du bras , & elle tomba dix heures après la saignée en une sorte d'apoplexie. Je fus appelé ; je trouvai le pouls un peu *rebondissant*, mais *petit*, *fréquent*, *fort convulsif* ; je fis faire plusieurs saignées du pied , avec peu de succès ; il sortit quelques gouttes de sang du nez , mais la malade mourut bientôt après. On trouva la base du crâne & les ventricules du cerveau pleins de sang : les tégumens de la tête étoient *échimosés*, comme meurtris.

OBSERVATION XXXIII.

Un homme de forte constitution eut un accès de colere si violent, que quatre personnes pouvoient à peine le retenir, & il paroïssoit être en phrénésie; après s'être fort tourmenté il tomba dans une espece d'assoupissement; il avoit le visage fort rouge ainsi que les oreilles & toute la peau de la tête; le pouls étoit extrêmement *vis*, *fréquent*, *concentré*, *rebondissant presque à chaque pulsation*; cet homme eut quelques heures de sommeil, il se releva se portant mieux & n'eut point de saignement de nez. On trouvera l'explication de cet événement dans le Chapitre qui regarde le tems pour lequel le pouls annonce les évacuations.

OBSERVATION XXXIV.

Une femme âgée de trente ans qui n'avoit point eu ses regles depuis trois mois, devint sujette à un mal de tête presque habituel; elle

saigna très-peu du nez ; on la saigna du pied , & deux jours après elle eut une attaque de convulsion fort approchante de l'épilepsie , à laquelle succéda une legere attaque d'apoplexie ; la malade revint de cette attaque & resta dans un état d'étonnement & d'égarement pendant lequel elle avoit le pouls *rebondissant* presque à *chaque pulsation*, mais très-convulsif ; elle fut saignée du pied , & quelque tems après elle eut une autre attaque dont elle mourut sans avoir eu de saignement de nez.

On trouve souvent le pouls *rebondissant* à la suite des coups violens à la tête, & des fractures du crâne ; mais il n'y a pas toujours de saignement de nez : ce pouls *redoublé* se trouve aussi quelquefois dans les apoplexies sans saignement de nez.

Ces observations prouvent que le pouls *rebondissant* n'est pas toujours suivi du saignement de nez : mais elles prouvent aussi que ce pouls est certainement l'effet d'un abord extraordinaire d'humeurs vers la tête. C'est ce que M. Nihell a bien remar-

que dans l'ouvrage cité dans la Préface.

Au reste il paroît qu'il y a si peu de différence entre le saignement de nez , & celui des oreilles , qu'on ne rappelle ce dernier qu'en passant ; on l'a quelquefois vu se joindre au saignement de nez , & j'en ai trouvé deux fois précédé du pouls *rebondissant* ; sans qu'il y eût de saignement de nez ; avec ceci de singulier que le pouls du côté de l'oreille par laquelle se faisoit l'hémorrhagie étoit beaucoup plus fort & plus *redoublé* que l'autre. (1)

Le pouls nasal simple suiv d'excrétions muqueuses.

Cette espèce de pouls *nasal simple* n'est pas moins rare que celle qui précède les saignemens de nez : on la trouve ainsi que l'autre , presque toujours *compliquée* avec le pouls *d'irritation* (2).

(1) Voy. Chap. 31.

(2) Voy. Chap. 17 , 18 , &c.

OBSERVATION XXV.

Une fille âgée de quinze ans qui n'a pas encore été réglée, est fort sujette à l'enchifrenement; il y a même quelque chose de périodique dans cette incommodité; elle revient à peu près tous les mois, & elle finit constamment par une excrétion abondante de fucs *muqueux* par les narines: le pouls est toujours *naçal* pendant le tems qui précède & qui accompagne cette excrétion; il est sur-tout plus *redoublé* vers la fin du jour: les pulsations sont bien moins dures que pour le saignement de nez; elles le sont plus que dans les excrétions *critiques* de la poitrine.

OBSERVATION XXXVI.

Le pouls devient *redoublé* & bien *naçal* vers le quatorzième jour d'une fièvre continue: j'annonçai un prochain saignement de nez: le surlendemain le pouls fut moins *dur*, le *rebondissement* moins vif; il survint

vers le vingtième une sorte de fluxion catharreufe qui se jetta également sur le nez & sur les yeux, avec une excrétion fort abondante de pituite ou de *mucosité purulente* par le nez ; cette *mucosité* n'étoit que jaune & point teinte de sang, comme cela arrive souvent ; c'est par-là que la maladie fut terminée.

OBSERVATION XXXVII.

Erésipele au visage : le poulx est *naçal* vers le quatrième jour : il sort au sixième trois ou quatre gouttes de sang de la narine du côté le plus affecté, qui étoit le droit ; vers le douzième & le seizième il sort du nez beaucoup de *mucosités purulentes*, & beaucoup de glaires ou de sucspituiteux, & la maladie fut heureusement terminée par cette excrétion.

OBSERVATION XXXVIII.

Fièvre maligne avec une sécheresse considérable de la bouche, noirceur de la langue, tension & gonflement du ventre,

ventre , *rebondissement* évident du pouls , qui étoit d'ailleurs *petit , vif , fréquent , très-convulsif* : cette maladie paroît jugée vers le vingt-cinquième jour par une copieuse excrétion de *mucofité* purulente qui sort du nez : le pouls reste néanmoins dans le même état : le malade meurt vers le trentième ; il sort du nez , pendant l'agonie & même après la mort , une quantité prodigieuse de la même *mucofité*.

Il est assez ordinaire de voir finir les fièvres putrides par une excrétion des narines ; tout le monde sçait que lorsqu'elles sont sèches , c'est un mauvais signe , & que lorsqu'elles commencent à s'humecter , ainsi que la langue , la maladie entre dans ses derniers tems.

On a souvent trouvé dans ces sortes de maladies , quelle qu'en ait été la terminaison , que le pouls avoit été *rebondissant* vers le commencement sans être suivi de saignement de nez ; lorsqu'à la fin de la maladie , le pouls ayant perdu de sa force & de sa *pureté* , il se faisoit par les narines des excré-

tions *muqueuses* ou purulentes , le pouls *nasal* demeueroit plus ou moins *rebondissant* , plus ou moins *dilaté & souple* , selon qu'il y avoit plus ou moins d'obstacle à la crise.

OBSERVATION XXXIX.

Un jeune homme a l'intérieur des narines plein de croutes ou de gales qui augmentent en de certains tems ; il survient alors des maux de tête violens ; le pouls est évidemment *redoublé* ; le mal de tête cesse lorsqu'il coule par les deux narines une grande quantité de sérosité & de mucosité : ce flux *muqueux* est pour ainsi dire périodique ; il n'est pas rare d'en trouver de cette espece.

OBSERVATION XL.

Un jeune homme âgé de dix-neuf ans a un polype au nez ; ce polype devient douloureux périodiquement ; le pouls est *rebondissant* pendant la fin de ces accès de douleur & quelquefois vers les commencemens ; ces

fortes d'accès finissent par une abondante évacuation muqueuse, & quelquefois légèrement teinte de sang.

OBSERVATION XLI.

Un homme âgé de quarante ans est sujet à des rhumatismes passagers, mais fort douloureux; il a de tems en tems pendant l'accès, des douleurs vives au fondement: il survient ensuite un enchifrenement qui est suivi d'une abondante évacuation de pituite par le nez; ce qui termine le paroxisme; cet homme paroît avoir habituellement le pouls tendant au *rebondissement* qui devient évident lorsque l'évacuation du nez se décide.

OBSERVATION XLII.

Une femme qui s'exposa trop tôt à l'air à la suite de sa troisième couche ne fut point réglée, comme elle avoit accoutumé de l'être le deuxième mois; elle fut attaquée d'une violente douleur, comme rhumatismale vers les parties supérieures des épaules,

& celles du sternum; la douleur s'étendit peu-à-peu jusqu'aux oreilles & jusqu'à la tête, sur-tout vers les sinus frontaux; la fièvre étoit vive avec des redoublemens tous les soirs; le pouls parut *rebondissant* en quelques *pulsations* vers le quatorzième jour; les redoublemens de la fièvre diminuèrent; le pouls fut presque continuellement *rebondissant*, & un peu *mol* vers le vingtième; du vingt-cinquième au trentième il sortit par le nez à différentes reprises, une grande quantité de matiere *muqueuse*, *purulente*, mêlée de beaucoup de matiere séreuse; la malade demeura pourtant avec un enchifrènement considérable; ses yeux étoient très-chargés; le derriere des oreilles étoit fort humide; l'évacuation des narines se soutenoit toujours: le pouls étoit continuellement *rebondissant*; il changea enfin, il devint *inférieur*, & les règles parurent, qui terminerent la maladie.



OBSERVATION XLIII.

Un malade qui avoit les os propres du nez cariés, ainsi que l'Ethmoïde, & une portion des os du palais, évacuoit de tems en tems beaucoup de pus & de matieres ichoreuses par la nez; il avoit souvent le pouls *rebondissant*.

La même chose arrivoit à un homme qui s'étoit fracturé les os du nez; mais quoique l'écoulement des matieres fût presque constant, le pouls n'étoit pas toujours *rebondissant*.

Un homme qui a reçu un coup violent sur la tête gauche, rend souvent par la narine de ce côté beaucoup de matiere puriforme & quelquefois du sang; il a très-souvent & presque habituellement le pouls *redoublé & nasal*.

On voit au reste par toutes ces observations la comparaison qu'il y a à faire dans le pouls *nasal*, comme dans toutes les autres especes de pouls critiques, entre les mouvemens qui les caractérisent & la nature de la maladie;

il paroît que dans les maladies graves ou dans celles qui arrivent à des corps mal constitués , il ne faut pas toujours absolument compter sur les événemens qui semblent être annoncés par les divers pouls critiques.

CHAPITRE IX.

Du Pouls inférieur , & de ses différentes espèces.

LE pouls *inférieur* est celui qui précède , & qui annonce par conséquent , les évacuations *critiques* qui se font par les organes situés au-dessous du diaphragme ; ce pouls est très-marqué & très-reconnoissable ; il n'est pas même difficile d'apprendre à le bien distinguer.

Son caractère principal est d'être *irrégulier* , c'est-à-dire , que les *pulsations* sont *inégaux entr'elles* , & ont des *intervalles inégaux* ; ces intervalles sont quelquefois si considérables , qu'ils forment de véritables *intermittences* , selon l'espèce de pouls inférieur , & selon que

cette espèce se trouve plus ou moins déclarée ; on trouve aussi assez souvent une sorte de sautellement de l'artere ; ce sautellement sert beaucoup à caractériser le pouls inférieur. Ce pouls n'est jamais aussi développé, aussi souple, aussi égal, que le pouls supérieur.

C'est ce qui fait que par le défaut d'habitude d'en juger, on pourroit quelquefois le confondre avec le pouls *convulsif* ou le pouls d'irritation, quoiqu'ils ayent cependant entr'eux des différences bien évidentes, ainsi qu'on le fera voir dans l'examen du pouls *convulsif*.

Mais comme il se trouve dans le bas-ventre beaucoup d'organes *excrétoires*, aussi le pouls inférieur qu'on peut appeller *ventral* ou *abdominal*, a-t-il beaucoup de différences, qu'on n'a pu parvenir à réduire en des classes bien distinctes qu'au moyen d'une infinité d'observations ; la difficulté a même été d'autant plus grande, qu'il n'est pas rare de trouver que les excréctions se font en même tems par plusieurs organes du bas-ventre.

Il y a une espèce particulière de

pouls à la fonction excrétoire ou à l'effort critique de chacun des viscères du bas-ventre ; ces espèces particulières ont encore leurs variations propres selon les obstacles que l'effort critique trouve à son progrès ; ainsi comme toutes les excrétions qui se font par les viscères du bas-ventre ont chacune leur mécanisme propre, elles sont de même précédées & accompagnées chacune de leur espèce particulière de pouls.

Il est important de se rappeler dans l'examen de ces espèces de pouls, que le pouls *développé*, *dilaté*, qui précède toujours, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, toutes les espèces de pouls *critique*, reste quelquefois un certain tems dans une sorte d'indétermination ; c'est ce qui doit rendre fort circonspect sur le jugement qu'il faut porter dans la transition du pouls *développé* à quelque espèce particulière de pouls *critique*.

Au reste tous les pouls *inférieurs* ainsi que les *supérieurs*, sont *simples* ou *compliqués* : le détail des observations qui constatent les espèces par-

ticulieres du pouls *inférieur* va donner à tout ce qui est énoncé dans ce Chapitre , l'appui & la lucidité convenables ; les mêmes observations qui détermineront les différentes espèces de ce pouls , prouveront aussi qu'il y a un caractère particulier & général qui les range nécessairement dans la classe du pouls *inférieur* ; par ce moyen l'existence de ce pouls *inférieur* ou *ventral* sera démontrée , ainsi que l'importance dont il est de le bien connoître en tous ses détails.

CHAPITRE X.

*Du Pouls qui annonce le vomissement
ou stomachal simple.*

DE tous les pouls *inférieurs simples* , celui qui est le moins développé & qui approche par conséquent le plus du pouls d'*irritation* , c'est le pouls qui annonce ou qui accompagne le vomissement ; aussi ne doit-on pas toujours regarder le vomissement comme une véritable crise.

En effet le vomissement naturel & critique qui termine une maladie est très-rare , sur-tout dans l'usage où l'on est d'employer des vomitifs aux commencemens de la plûpart des maladies : l'effort naturel qui détermine cette évacuation , a toujours dans le fonds , quelque chose de symptomatique, lors même qu'on peut juger par la diminution des accidens qu'elle a pris sur la cause de la maladie.

Solano remarque *qu'il n'a jamais observé une simple crise par le vomissement , sans une diarrhée* ; cependant on ne sçauroit nier qu'il n'y ait quelquefois des vomissemens naturels, ou excités par quelque remede , qui soulagent au point de paroître emporter une maladie.

Le pouls *stomachal* est, comme nous l'avons déjà dit , le moins développé de tous les pouls critiques ; il est moins inégal que tous les autres espèces de pouls inférieurs ; l'artere semble se roidir & frémir sous le doigt ; elle est souvent assez saillante ; les pulsations sont fréquentes & avec des intervalles assez égaux.

La tension de l'artere jointe à l'intermission étoit pour Solano un signe certain du vomissement ; mais l'intermission annonce , en ce cas-là , un pouls qui n'est pas simple ; c'est ce qui sera suffisamment éclairci dans son lieu.

Il est néanmoins à propos de remarquer ici que le pouls *stomachal* décrit par Solano est réellement un pouls *critique compliqué* avec le pouls *convulsif* ; & on peut avancer que le pouls *critique* de l'estomac ou véritablement *stomachal* est celui qui se rencontreroit, s'il étoit possible de le saisir , lorsque l'action de l'estomac se trouve déterminé vers les voies inférieures , c'est-à-dire , vers le pilore.

S'il est vrai que chaque viscere employe à peu près un tems fixe & déterminé à s'acquitter de ses fonctions , & que le tems que l'estomac met à faire la digestion , puisse être apperçu & mesuré par les signes qui accompagnent les divers tems de la digestion ; si les signes de ces différens tems peuvent être distingués , peut-être trouvera-t-on le moyen

de fixer ou de peindre les variations que l'action naturelle de l'estomac opere vraisemblablement sur le pouls: l'effet des émétiques, celui des purgatifs & des poisons pourroit servir à constater exactement les signes qui rendroient ces variations reconnoissables.

Tout ceci s'éclaircira par l'examen des mouvemens critiques désignés par les autres espèces de pouls *inférieurs critiques*: on n'examine ici que le pouls du vomissement.

OBSERVATION XLIV.

Une fille âgée de vingt ans & mal réglée, vomit depuis trois mois tout ce qu'elle prend, excepté le café, excepté encore les eaux minérales savonneuses appelées eaux *Bonnes*; on a essayé inutilement toute sorte d'alimens & de boisson. L'intervalle qui précède le vomissement, est accompagné d'angoisses, de pâleur au visage, d'une sorte de tremblement général; le pouls qui est naturellement

assez souple & assez égal devient dur & fréquent ; l'artere paroît en quelque maniere s'arrondir , elle devient plus saillante , les pulsations sont presque égales , on sent les parois de l'artere s'agiter par une espèce de tremblement ; alors le vomissement ne tarde point à se déterminer ; & lorsque l'estomac est débarrassé , le pouls revient dans son état ordinaire ; il est même plus plein quelquefois & plus développé pendant quelques heures.

OBSERVATION XLV.

Un vieux soldat qui est dans le marasme vomit tout ce qu'il prend depuis cinq mois , il a la fièvre lente ; le pouls est , comme il se trouve ordinairement dans ces cas-là , plus net le matin que pendant le reste de la journée ; il est fréquent & petit ; il devient très-convulsif dans des accès irréguliers de douleur dont le siège est dans la région épigastrique ; quelques heures après que le malade a pris de la nourriture , son pouls s'élève sensiblement , l'artere est tremblo-

iante, dure, brusque & comme arrondie; les pulsations sont inégales à peu-près dans cet ordre; à trois ou quatre pulsations égales il en succède deux ou trois un peu moins fortes, & puis les pulsations plus fortes reparoissent; le vomissement survient, & ensuite le pouls reprend son état d'irritation & de fièvre: le malade meurt dans le dernier degré de maigreur; on trouve le pilore ossifié, & les environs de cette ossification en suppuration.

OBSERVATION XLVI.

Un malade qui depuis quelque tems se sent fort accablé, éprouve constamment vers la région épigastrique une pesanteur singulière; il vomit tout ce qu'il prend; le pouls & la disposition au vomissement demeurent toujours dans le même état, malgré plusieurs saignées & l'usage des émétiques & des purgatifs, le pouls est concentré, petit, fréquent; deux ou trois heures après que le malade a pris quelque boisson un peu abondante, le pouls se développe, il se

durcit , l'artere est très tendue & elle semble se mouvoir comme en serpentant sous le doigt ; les pulsations sont très-fréquentes & peu inégales ; alors le malade vomit ce qu'il a pris , & le pouls se rétablit dans son état ordinaire. Vers le dix-huitieme jour le pouls se développe , il devient plein, vigoureux , sensiblement inégal, il y a quelques intermittences , il est assez souple ; le dévoyement survient , & de légers purgatifs suivis d'abondantes évacuations terminent la maladie vers le vingt cinquieme jour depuis la premiere saignée.

OBSERVATION XLVII.

Fièvre continue avec des redoublemens ; le malade n'appelle du secours que vers le sixième jour ; la poitrine est prise , les crachats sont sanguinolens & un peu cuits au septieme ; trois saignées & des purgations douces ne dérangent pas l'excrétion établie des crachats jusques vers le onzième ; dans ce tems là , le pouls au lieu de se développer de plus en plus , se resserre , on y sent l'ondulation & le

redoublement instantané qui caractérise le pouls *pectoral* ; mais il y a de tems en tems des pulsations *vives avec un tremblement & une roideur considérables de l'artere* ; on en compte à différentes reprises jusqu'à dix ou douze de suite de cette espèce. Du quatorzième au seizième le malade vomit naturellement & en plusieurs fois une grande quantité de matieres glaireuses & bilieuses.

Le pouls est , depuis cette évacuation , exactement *pectoral* ; on n'y sent plus rien de *brusque* ni de *géné* vers le dix-huitième ; & la maladie se termine par l'expectoration. Il paroît que le *serrement* , la *petitesse* & la *roideur du pouls* étoient produits par la plénitude de l'estomac , & n'étoient que les avant-coureurs du vomissement.

Il n'est pas rare de trouver dans les maladies tant aiguës que chroniques , un *serrement particulier du pouls* , avec une *roideur considérable de l'artere* , de la *fréquence* & de l'*irrégularité* ; le pouls se développe ensuite ; & c'est ordinairement d'un bon

augure; ce *serrement* est très-souvent accompagné, sinon d'un vomissement, du moins de nausées, d'anxiétés, d'une sorte d'oppression incommode vers la région épigastrique; oppression qui n'échappe jamais à l'attention des malades dont les plaintes expriment à merveille au Médecin ce que le pouls lui indique déjà, c'est-à-dire, l'embarras de l'estomac, les efforts de ce viscere & l'état violent dans lequel il se trouve, sous le poids des matieres *glaireuses, bilieuses, indigestes*.

Ce *développement* du pouls que les Médecins souhaitent tant, se montre souvent après les saignées, & après l'action des émétiques & des purgatifs; ce qui ne prouve pas moins que le pouls, *dur, serré, irrégulier fréquent*, indique un degré considérable d'embarras de l'estomac, & doit être pris pour le pouls *stomachal* avant-coureur du vomissement.

Mais les observations rapportées dans ce Chapitre prouvent évidemment que le pouls *stomachal* est presque toujours *compliqué*. Ce qu'il y a à dire pour finir l'histoire de ce pouls,

regarde donc celle des pouls *compliqués* qu'il faut consulter, ainsi que celle des pouls qui succèdent à l'usage des remèdes.

CHAPITRE XI.

Du Pouls qui annonce les évacuations critiques du ventre , ou intestinal simple.

LE pouls *intestinal simple* est celui qui annonce & qui accompagne ordinairement les évacuations critiques qui se font par le canal intestinal ; ce pouls subsiste aussi quelquesfois , ainsi que les autres pouls *critiques*, après que les évacuations sont faites ; ce qui n'arrive que parce que la crise n'a pas été complète pendant les premiers jours.

Les raisons de cette définition ne peuvent être bien entendues que par la comparaison de tout ce qu'il reste à éclaircir dans les suites de cet ouvrage ; il s'agit simplement ici de

constater l'espèce de pouls qui précède les excrétions *critiques* intestinales qui terminent les incommodités & les maladies. On examinera ailleurs ce qui a rapport aux excrétions *symptomatiques*.

Voici en quoi consiste la nature ou l'état du pouls *intestinal critique*; il est beaucoup plus développé que le pouls du vomissement; ses dix pulsations sont assez fortes, comme arrondies, & surtout inégales, tant dans leur force que dans leurs intervalles, ce qui est très-aisé à distinguer, puisqu'il arrive presque toujours qu'après deux ou trois pulsations assez égales & assez élevées, il en paroît deux ou trois qui sont moins développées, plus promptes, plus rapprochées, & comme subintrantes; de-là résulte une sorte de sautellement ou d'explosion de l'artère plus ou moins régulier; aux irrégularités de ce pouls se joignent souvent des intermittences très-remarquables. Il n'est jamais aussi plein, aussi développé que le pouls supérieur: il n'a point nécessairement d'ordre marqué dans ses intermittences; c'est au contraire par son désordre qu'il se rend reconnoissable.

Solano a avancé que *le pouls qui annonce le dévoyement est le pouls intermittent* ; cet Auteur n'a fait attention qu'aux *intermittences* , & c'est avec d'autant moins de raison , qu'il n'est pas rare d'observer des dévoiemens critiques bien décidés , qui ne sont précédés & accompagnés que du pouls *intestinal* tel qu'il vient d'être décrit ; sans qu'il y ait presque d'*intermittences*.

Il est vrai que *l'intermittence* du pouls est souvent suivie du dévoyement , mais cela n'arrive pas toujours ; & *l'intermittence* jointe aux *irrégularités* annonce plus certainement cette crise ; c'est donc à ces *irrégularités* qu'il faut d'abord faire attention lorsqu'il s'agit de juger du pouls du dévoyement critique : au reste on fera voir en son lieu combien il est important de distinguer ces *irrégularités* d'avec celles qui se trouvent dans les pouls *compliqués* avec le pouls d'*irritation* , car celles-ci ne sont pas toujours bien critiques (*). Il ne faut jamais perdre

(*) Voy. Chap. 23 & les suivans.

de vue que les pouls *excréteurs critiques*, dont il est actuellement question, sont toujours précédés d'un pouls bien *développé*.

OBSERVATION XLVIII.

Un jeune homme d'une forte constitution, qui se trouvoit un peu incommodé, me demanda de lui tâter le pouls; je le trouvai *fréquent, fort, très-inégal, sautillant à peu-près à chaque troisieme pulsation, il y avoit de tems en tems quelque pulsation à peine sensible & tout près de former une vraie intermittence*, ce qui me fit dire qu'il se passoit quelque révolution extraordinaire dans les entrailles; il se trouva en effet qu'il avoit depuis la veille un léger dévoyement accompagné de quelques douleurs de colique; ce dévoyement dura près de trois jours & se termina naturellement.

Un jeune homme d'une constitution délicate, m'ayant demandé de lui tâter le pouls, je le trouvai *fort irrégulier, inégal, sautillant, inter-*

mittent, tantôt de quatre en quatre ; tantôt de sept en sept pulsations : je parlai d'une disposition prochaine au dévoyement & d'un embarras d'entrailles ; à quoi le jeune homme me répondit qu'il étoit vrai qu'il avoit eue le dévoyement, mais qu'il ne l'avoit plus depuis deux jours, étant dans l'usage de la rhubarbe prise à petites doses ; je répondis que le dévoyement reviendrait, ce qui arriva en effet dès le lendemain ; cette évacuation qui fut fort abondante & qui dura plusieurs jours, ne pouvoit être attribuée à la rhubarbe, puisqu'on en avoit pris très-peu : quoi qu'il en soit, le pouls annonçoit l'évacuation du ventre.

OBSERVATION XLIX.

Une fille âgée de dix-neuf à vingt ans, qui se trouve incommodée, a le pouls *plein, inégal, vif, avec quelques intermittences fréquentes qui viennent irrégulièrement ;* j'annonçai un dévoyement prochain ; cette fille assura que cela ne sauroit être, parce

qu'elle étoit naturellement très-confipée ; le ventre s'ouvrit pourtant la nuit suivante, & il y eut onze évacuations.

OBSERVATION L.

Un malade attaqué d'une fièvre continue avoit eu pendant les neuf premiers jours le pouls très-*serré* & de tems en tems un peu *variable*, surtout a la suite des remèdes ordinaires ; vers le onzième le pouls devint *plus développé*, *plus élevé*, *inégal*, *sautillant avec quelques intermit- tences qui paroïssent tantôt après six, tantôt après neuf, tantôt après dix pul- tions* ; il fut suivi, vers le quatorzième de la maladie, d'abondantes évacuations bilieuses, qui jusques-là, n'avoient point été de cette qualité dans l'effet des émétiques & des purgatifs qui avoient précédé.

Cette crise dura trois ou quatre jours ; je tâtai souvent le pouls dans cet espace de tems ; il gardoit à peu près le même ordre ; mais de tems en tems il *s'élevoit promptement*, il

sautilloit plus qu'à l'ordinaire cette *élévation* ou ce *sautillement* étoit constamment suivi d'une évacuation ; ce qui dura jusques vers le vingtième qui fut le terme de la maladie.

Cette observation sur le *sautillement* extraordinaire du pouls qui annonce une évacuation très prochaine, dans l'état du dévoyement critique, a été souvent répétée.

OBSERVATION LI.

Un jeune homme très-vigoureux, fut attaqué d'une fièvre sans redoublemens bien marqués & avec un violent mal à la tête , le pouls fut serré & non critique, jusques vers le quatrième jour ; alors il devint inégal, les pulsations étoient tantôt dures, tantôt molles ; on auroit dit qu'il y avoit dans l'artere une sorte de nœud qui la rendoit plus saillante dans de certaines pulsations que dans d'autres ; il y avoit sur-tout quelques intervalles très-considérables ; je jugeai qu'il y auroit des évacuations bilieuses ; elles arriverent en effet , du sixieme au neuvième ,

neuvième , & elles dégagerent la tête ; ce que deux saignées du pied & l'émétique n'avoient point opéré ; le pouls redevint souple & *à peu-près égal* vers le dixième jour ; le malade entra en convalescence vers le quatorzième , après avoir pris un léger purgatif placé dans un tems où le pouls étoit redevenu *intestinal*.

OBSERVATION LII.

Un malade au cinquième jour d'une fièvre putride , pour laquelle on a fait trois saignées & donné l'émétique , a le pouls *intestinal* : il y a deux ou trois pulsations *fortes & assez égales* , l'artere s'élève ensuite comme en sursaut & paroît , dans cet instant , rouler pour ainsi-dire , sous le doigt : le malade prit au septième jour , deux onces de manne & deux gros de sel d'Epſom , qui produisirent vingt-trois évacuations très bilieuses , & la maladie se termina bientôt après.

Un vieillard qui se sentoît depuis deux ou trois jours très abbattu , fut

attaqué d'une fièvre qui commença par un violent frisson , le pouls qui étoit très *concentré* les premiers jours se développa vers le sixième ; le lendemain il devint *inégal*, comme *tremblotant avec quelques intermittences irrégulières* ; le ventre grouilloit beaucoup , le malade avoit d'inutiles & fréquentes envies d'aller ; pour déterminer les évacuations que le pouls annonçoit , on donna deux onces de manne qui purgerent abondamment ; le pouls se *releva* ensuite , il devint *pectoral* vers le onzième ; & la crise s'acheva par l'expectoration.

OBSERVATION LIII.

Le pouls devient *intestinal* , c'est-à-dire , *irrégulier , arrondi , intermittent à peu près à chaque quatrième pulsation* , vers le sixième jour d'une fièvre continue ; le malade qui étoit jeune & bien constitué , eut un dévoyement critique qui dura pendant trois jours ; cette crise vint à la suite d'un très-léger purgatif qu'il avoit pris le septième ; il est bon de remar-

quer. que le malade rendit près de trois aulnes de ver solitaire ; le pouls ayant repris son *égalité* vers le douzième, la maladie fut bientôt terminée.

OBSERVATION LIV.

Fièvre assez forte dans un homme vigoureux ; le pouls fut depuis le deuxième jour *intermittent* à chaque huitième pulsation, *irrégulier & sautillant*, il se développa & devint plus fréquent, vers le neuvième ; le malade eut ce jour-là un dévoiement abondant, & dès le douzième jour de la maladie le pouls fut presque rétabli dans son état naturel.

OBSERVATION LV.

Douleurs de colique avec le pouls fort *irrégulier & intermittent* à chaque dix ou douzième pulsation ; ces douleurs se terminent par des évacuations très-abondantes du quatrième au septième, & du septième au onzième jour de la maladie.

OBSERVATION LVI.

Fluxion de poitrine avec crachement de sang , dans un vieillard ; le pouls reste *convulsif & indécis* jusques vers le douzième de la maladie , & dans cet intervalle il n'y eut presque point d'évacuations , malgré l'usage de quelques légers purgatifs ; le pouls se *déveiope* alors, il devient *dur, inégal, irregulier, sautillant* , les évacuations bilieuses sont annoncées , & elles sont fort abondantes vers le quatorze ; le pouls change ensuite , il devient *pectoral* , les évacuations du ventre cessent , les crachats sont abondans & comme purulens ; ils terminent la maladie.

OBSERVATION LVII.

Un jeune homme robuste est attaqué d'une fièvre continue , avec une bouffissure de tout le corps , & un gonflement si considérable de la langue , qu'elle sortoit hors de la bouche ; le pouls est *dur, plein, égal, rebondis-*

sant presque à chaque pulsation ; il y a du saignement de nez du six au dix de la maladie ; le ventre pendant ce tems-là demeure resserré malgré un usage journalier d'apozèmes purgatifs ; vers le onzième le pouls change presque subitement : il se développe médiocrement , ses pulsations sont inégales , & sur-tout à des distances très-différentes , il y a même quelques légères intermittences ; vers le quatorzième jour , il survient un dévoiement considérable , qui cependant ne termina pas la maladie.

OBSERVATION LVIII.

Fièvre continue , qui avoit pour principal accident une douleur vive du côté droit , depuis l'aîne jusques aux fausses côtes ; malgré plusieurs saignées & l'usage des potions huileuses , le pouls demeura *concentré , vif , convulsif* , & le ventre très-resserré , pendant les cinq premiers jours de la maladie : vers le sixième le pouls devint plus *plein , moins égal , quelquefois intermittent* , & il y avoit des

pulsations qui paroissent subintrantes ; du dix au onze , il survint des évacuations bilieuses fort abondantes , entretenues par de légers purgatifs , & la maladie fut ainsi terminée en peu de jours.

OBSERVATION LIX.

Une femme après des couches , dont toutes les suites paroissoient se bien passer , mangea un potage le quatrième jour ; dès le soir même elle eut un frisson ; le pouls étoit *vis* & *serré* pendant le frisson ; il se développa un peu pendant la chaleur , & le lendemain il devint *dur* , *irrégulier* , *intermittent* , le ventre se bouffit , la malade rendit naturellement le sixième jour une quantité prodigieuse de matieres bilieuses & laiteuses , le pouls se *remit* peu à peu vers le neuvième , & le lendemain le cours des vuidanges fut rétabli.

OBSERVATION LX.

Un homme de complexion délica-

te , qui cependant paroît jouir d'une bonne santé , a depuis trois ou quatre ans une excessive liberté de ventre au point d'aller ordinairement trois ou quatre fois par jour ; il s'est apperçu lui-même que toutes les fois qu'une évacuation se prépare , son pouls s'*élève* , sa chaleur augmente ; il sent une révolution générale dans toute la machine ; le pouls est habituellement *ferré* & un peu *intestinal* , il se *développe* de tems en tems , il devient *inégal* , *sautillant* , il y a des *pulsations* qui sont fort éloignées les unes des autres , d'autres sont si près que l'une n'attend pas l'autre , & cette révolution du pouls est constamment suivie d'une évacuation , après quoi le pouls se remet dans son état ordinaire.

On trouvera à peu près les mêmes phénomènes dans presque tous les dévoyemens critiques , comme on l'a déjà vû dans l'Observation 50.

Mais il y a des maladies accompagnées de dévoyement où le pouls est si *convulsif* , qu'il ne peut presque point obéir aux déterminations pro-

pres à le rendre *intestinal* ; ces évacuations sont presque toujours symptomatiques. Voyez Chap. 23. & les suivans.

Au reste les occasions de faire des Observations pareilles à celles qu'on vient de rapporter, sont si communes, que tout Praticien peut aisément les vérifier en peu de tems ; la proposition qui fait le sujet de ce Chapitre, peut être établie d'une manière à laisser peu de doutes. M. Nihell a laissé d'excellentes remarques sur le pouls *intermittent*.

CHAPITRE XII.

Du Pouls des règles, ou du Pouls simple de la matrice.

LEs signes qui font distinguer ce pouls de celui du dévoyement critique, ne paroissent pas d'abord bien aisés à saisir : *l'irrégularité dans les pulsations, & le sautellement de l'artere*

sont communs à ces deux espèces de pouls ; on ne sçauroit par conséquent les différencier que par d'autres signes.

Voici la maniere qui a paru la plus propre à les distinguer : *l'intermittence* ne se montre pas à beaucoup près aussi communément avec le pouls qui annonce les regles , qu'avec celui du dévoyement critique. Il est même rare qu'il y ait des *intermittences* dans le pouls des régles ; ou s'il s'y en trouve , c'est lorsqu'elles sont jointes au dévoyement , & alors le pouls est *compliqué* & non point *simple*.

Le pouls *simple de la matrice* est en général *plus fort* , *plus plein* que celui du dévoyement ; on pourroit même dire *plus sanguin* , puisqu'il est de fait que le pouls qui précède & accompagne les hémorragies critiques est sur-tout dans les commencemens beaucoup *plus fort* , *plus rénitent* que celui des autres excrétiions.

Une autre différence remarquable entre le pouls *simple de la matrice* , & le pouls *simple intestinal* , c'est une *tendance* au caractère du pouls du

saignement de nez , qu'on trouve ordinairement dans le pouls des règles ; & jamais dans *l'intestinal simple* ; on peut même avancer que ce caractère est commun aux pouls de toutes les espèces d'hémorrhagies.

Le pouls simple de la matrice est donc ordinairement plus élevé , plus développé que dans l'état naturel , ses pulsations sont inégales ; il y a des rebondissemens , moins constans à la vérité , moins fréquens ou moins marqués que dans le pouls nasal , mais cependant assez sensibles.

Ce pouls est beaucoup plus aisé à reconnoître dans les jeunes filles qui sont à la veille d'être réglées , pour la première fois , parce qu'il arrive souvent que la révolution qui détermine cette crise est accompagnée d'un mouvement de fièvre qui rend les modifications du pouls beaucoup plus sensibles , à moins que quelqu'autre cause jointe à l'effort qui produit cette fièvre ne rende le pouls *compliqué*.

Les femmes qui approchent du tems de perdre leurs règles , ont

aussi très-communément dans le tems que les règles doivent paroître, une sorte de fièvre qui indique une plus forte résistance de la part de la matrice ; celles qui sont sujettes à des pertes sont dans le même cas lorsque l'hémorragie se prépare.

Il y a une attention importante à faire à l'égard du pouls *simple de la matrice* ; c'est qu'il ne faut pas s'attendre à le trouver dans toutes les femmes tel qu'il vient d'être décrit ; il y en a dans lesquelles la révolution des règles, est pour ainsi-dire, insensible ; la crise se fait sans qu'il paroisse dans le pouls des changemens bien considérables (1).

Il y a des femmes dans lesquelles le pouls au lieu de se *dilater* & de se *développer*, se *resserre* au contraire à l'approche des règles ; néanmoins les *rebondissemens* & l'*irrégularité* des pulsations s'y trouvent assez souvent malgré le *resserrement* ; c'est ce qu'on a lieu d'éprouver, sur-tout dans les femmes un peu grasses ; tout cela regarde les pouls *compliqués*.

(1) Voyez le dernier Chapitre.

Il y a encore une attention à avoir en examinant le pouls des personnes du sexe ; c'est qu'il s'en trouve de si impressionables, que la seule présence du Médecin les affecte au point de changer brusquement leur pouls , & de lui donner un caractère opposé à la disposition réelle où elles se trouvent ; ce changement rend même quelquefois le pouls fort approchant de celui des règles ; on comprend bien qu'en ces cas là dont il n'est pas difficile de s'appercevoir , il faut avoir la précaution de tâter le pouls à plusieurs reprises.

Il faut observer aussi , que le pouls *simple de la matrice* n'annonce que le tems des règles , c'est à dire , qu'il n'est pas toujours facile de décider par l'état du pouls , si les règles sont à la veille de paroître , si elles paroissent actuellement , ou si elles ont fini depuis peu ; ce n'est que par le grand usage qu'on peut parvenir à quelque précision là-dessus.



OBSERVATION LXI.

Je fus appelé pour une Dame, qui me dit qu'elle craignoit beaucoup pour sa poitrine, & qu'elle se croyoit d'autant plus disposée à cracher du pus, qu'elle avoit un point de côté & un rhûme qui duroient depuis long-tems ; je lui répondis après avoir tâté son pouls, qu'on ne pouvoit point encore juger du tems où les crachats viendroient, principalement en ce moment là que le pouls paroissoit indiquer les règles, (car il étoit *irrégulier, dur, tendant au nazal, fréquent, & un peu saillant* ;) votre remarque est bien juste, me dit cette Dame, je suis sujette depuis quelque tems à des pertes qui m'inquiètent bien autrement que ma poitrine, & je suis actuellement dans cet état là ; elle me fit alors l'aveu de sa petite supercherie.

On peut souvent en éprouver de pareilles de la part de plusieurs femmes, qui étant aux approches de

leurs règles , qui les ayant , ou qui sortant de les avoir , demandent qu'on leur tâte le pouls sous le prétexte de quelque incommodité.

Il ne faut jamais oublier en pareil cas , qu'il y a des femmes dans lesquelles les règles ne produisent pas dans le pouls les changemens ordinaires ; & si on cherche la raison de ces exceptions , on trouvera que les femmes qui sont dans ces cas là , ont les unes des dispositions habituelles , & les autres d'accidentelles , qui empêchent que l'effort critique des règles n'influe sur le pouls , comme il le fait ordinairement ; ce qui a déjà été remarqué ci-dessus.

OBSERVATION LXII.

Une fille âgée de treize ans , qui n'avoit pas encore eu ses règles avoit le pouls *fiévreux* , *plein* , *dur* , *un peu rebondissant* : les pulsations étoient *très - inégales* & quelquefois *presque subintrantes* ; je jugeai que les règles étoient au point de paroître , qu'il n'y avoit rien à faire qu'à pren-

dre de tems-en-tems quelque tasse d'infusion de safran, & laver les jambes dans l'eau chaude une fois par jour ; les règles parurent en effet le quatrième jour ; & après les règles le pouls fut comme à l'ordinaire , *souple, égal & bien conditionné.*

OBSERVATION LXIII.

Plusieurs filles ayant les pâles couleurs , n'étant point encore réglées , ou l'étant mal , avoient le pouls , les unes *convulsif*, les autres très-*irrégulier*, & d'autres fort *compliqué* ; elles n'ont été foulagées de leurs infirmités que lorsque par les secours de l'art ou par celui de la nature , leur pouls est devenu *développé, vif, inégal, disposé au rebondissement*, & qu'il s'est soutenu pendant un tems assez considérable dans cet état ; les règles ont paru après ces révolutions du pouls , plus ou moins promptement, selon les dispositions plus ou moins favorables de ces jeunes personnes.

OBSERVATION LXIV.

Une femme âgée de quarante-un ans, n'a point eu ses règles depuis trois mois ; elle a été dans un accablement singulier pendant tout ce tems-là, son pouls a été constamment *petit, vif, convulsif & dans un état bien marqué d'irritation ; il vient à se développer & à se dilater ; il est rebondissant presque à chaque pulsation ; ensuite il se durcit un peu, il devient très-irrégulier, fort inégal, & il reste dans cet état pendant trois ou quatre jours ; cette femme rend chaque jour quelques gouttes de sang par le nez ; je lui annonçai néanmoins qu'elle auroit ses règles incessamment ; elles parurent vers le quatrième jour si abondamment, qu'on pouvoit dire que c'étoit une perte ; elle dura sept ou huit jours presque avec la même abondance, & peu de tems avant la fin de la perte, le pouls redevint *souple, assez égal, & presque point convulsif.**

OBSERVATION LXV.

Une femme sujette à des pertes considérables , a ordinairement le pouls *concentré, mince, fréquent*, & les extrémités froides; elle juge elle-même du retour prochain de la perte par la chaleur qui lui vient aux extrémités & qu'elle attribue à un mouvement de fièvre; en effet le pouls s'élève sensiblement, *ses pulsations sont fort inégales, irrégulières*, il y a des rebondissemens légers, assez fréquens, la perte paroît environ 24 heures après.

OBSERVATION LXVI.

Un frisson survenu le deuxième jour d'une couche qui paroissoit heureuse, suspend toutes les évacuations, le pouls devient très-convulsif, les mammelles s'affaissent, la peau devient sèche & rude; je fis faire une saignée du pied, le pouls se releva après cette saignée, le ventre

fut gonflé & tendu sans être trop sensible ; le pouls continue à se développer , il est *plein* , un peu *dur* , *irrégulier* , légèrement *rebondissant* , il y avoit entre les pulsations des *intervalles fort inégaux* ; j'annonçai le retour de la perte ; elle parut du six au sept , dura peu & tout se remit dans l'ordre naturel.

OBSERVATION LXVII.

Deux jeunes femmes dont les règles sont naturellement fort abondantes , deviennent grosses ; la première se trouve incommodée le deuxième mois de sa grossesse , elle garde le lit : le pouls qui étoit *lent & plein* , devient un peu *fréquent* ; il est *irrégulier* , il y a quelques *rebondissemens* ou plutôt une sorte de *sautillement de l'artere* qui donne , pour ainsi parler , un *coup aigu* ; la malade fut saignée du bras sans aucun effet favorable , je jugeai qu'on devoit s'attendre à une fausse couche ; elle arriva en effet la nuit suivante ; il faut re-

marquer que cette femme étoit alors dans le deuxième période de ses règles.

L'autre femme grosse de trois mois, croit avoir fait un effort; elle sent des lassitudes dans tout le corps; après deux saignées du bras le pouls se roidit & se durcit, *il est très-inégal & il y a des rebondissemens assez marqués*; elle fit une fausse couche six jours après l'effort prétendu, celle-ci étoit aussi dans le tems qui répondoit à celui où elle avoit ordinairement ses règles.

On trouvera dans le Chapitre vingunième & dans quelques autres beaucoup de choses qui ont du rapport au Chapitre présent.



CHAPITRE XIII

Du Pouls simple du foie.

QUELQUES Historiens rapportent que les Médecins Chinois qu'on dit être dans l'usage de juger des maladies par les divers états du pouls, assurent qu'il y a un pouls *particulier pour le foie* (1); c'est ce qui a principalement donné l'idée d'examiner s'il y avoit réellement un pouls *hépatique*; sans chercher s'il étoit tel que les Médecins Chinois l'ont décrit; parce que ce qu'ils ont dit à cet égard ne mérite pas attention.

J'ai trouvé que les ictériques ont un pouls qui leur est propre; il est à la vérité difficile à reconnoître d'abord; mais il devient plus marqué lorsqu'il commence à se faire dans le foie quelque mouvement critique; & ce qui est très-remarquable, c'est que ce caractère particulier du pouls

(1) Histoire des Chinois.

se montre beaucoup plus sensible-
ment du côté droit que du côté gau-
che.

Ce pouls est évidemment *inférieur* :
après le *stomachal* il n'y a point de
pouls *critique* aussi *concentré* ; il n'a ni
dureté ni *roideur* , il est *inégal* & cette
inégalité consiste en ce que deux ou
trois *pulsations inégales* entr'elles, suc-
cèdent à deux ou trois *pulsations par-*
faitement égales , & qui semblent sou-
vent *naturelles*.

Ce pouls est moins fort , moins
brusqué que celui de la matrice , &
encore moins *vis* , moins *irrégulier*
que l'*intestinal* : on ne le trouve ja-
mais *rebondissant* à moins qu'il ne
soit *complicqué* avec quelque autre
espèce de pouls *critique* à laquel-
le le *rébondissement* soit nécessaire-
ment joint.

Mais ces marques qui caractéri-
sent exactement le pouls *hépatique* , ne
suffisent pas pour le faire reconnoître
facilement ; il est si souvent *com-*
pliqué avec d'autres espèces de pouls
critique , principalement avec le *sto-*
machal & l'*intestinal* , que les occa-

sions de le trouver avec son caractère *simple*, sont fort rares, excepté le moment dans lequel la crise du foie se détermine parfaitement.

Il faut d'ailleurs observer qu'indépendamment de la jaunisse, le foie est sujet à plusieurs sortes d'embarras qui ne peuvent manquer de produire dans le poulx, des changemens qui tiennent du caractère *hépatique*. Lorsque ces embarras ne se trouvent pas être supérieurs à l'effort critique, les changemens du poulx suivent à peu-près le même ordre que dans les jaunisses, c'est-à-dire, que ces changemens sont peu reconnoissables dans les commencemens, & beaucoup plus marqués à proportion du progrès de la crise.

Le pronostic d'un jaunisse critique, que Solano dit avoir fait par le poulx est fort remarquable ; « Ce Méde-
» cin voyoit avec deux ou trois cé-
» lébres Praticiens de Madrid, un
» malade qui tomba dans une mé-
» lancolie opiniâtre causée par le
» chagrin qu'il conçut d'être lou-

» che ; Solano apperçut le pouls de
 » la *sueur* qu'il appelloit *inciduus*, «
 (& qui n'est qu'une gradation de
 deux ou trois pulsations qui vont
 en augmentant) c'étoit » après cha-
 » que vingtième diastole avec une
 » tension considérable à l'artere ;
 » ce pouls revenoit ensuite régu-
 » lièrement entre la septième & la
 » huitième pulsation ; Solano dit
 » alors que la crise approchoit , &
 » par la dureté du pouls , & quel-
 » ques autres circonstances de
 » la maladie , il jugea & pronos-
 » tiqua ouvertement que ce seroit
 » une jaunisse ; le malade devint
 » en effet tout jaune du troisième
 » au quatrième jour depuis le pro-
 » nostic.

M. Nihell remarque » que Solano
 » connut bien par la dureté du pouls
 » que cette crise ne seroit pas une
 » sueur ; mais il ne dit pas , ajoute
 » M. Nihell , ce qui le détermina
 » à assurer que ce seroit une jaunisse
 » à moins que comme il survint au
 » malade trois jours avant la crise
 » une douleur & une tension aux

» hypocondres, Solano ne jugeât que
» cette maladie ne se termineroit pas
» par la diarrhée, le vomissement,
» &c. parce que le pouls annonçoit
» une autre espèce de crise & que la
» jaunisse ne pouvoit être regardée
» comme une conséquence naturelle
» de l'état de la maladie.

OBSERVATION LXVIII.

Un hypocondriaque rend des urines rouges, chargées, le ventre est un peu gonflé, le malade est tourmenté de flatuosités, il y a des grouillemens considérables; le pouls devient *intestinal* bien décidé, la bile coule, il y a des évacuations copieuses jusques vers le sixième jour, que le malade fut vivement affecté d'un chagrin qu'on lui causa; le pouls devient fort *concentré*, il perd beaucoup de son ressort & il n'est presque plus *inégal*; les urines sont claires, le ventre s'arrête, les grouillemens sont suspendus & vers la fin du septième jour le malade devient extrêmement

ment jaune par tout le corps ; le pouls reste dans le même état de *constriction & de foiblesse* jusques vers le onzième de la maladie ; il redevient *intestinal* ; la bile coule abondamment avec le secours de quelques légers purgatifs & la maladie est terminée.

OBSERVATION LXIX.

Un jeune homme qui a du chagrin tombe dans un abattement singulier ; il se plaint d'un bouleversement général qu'il dit se faire dans ses entrailles ; le pouls est *inférieur* sans être déterminé à aucune excrétion ; dans cet état , le malade mange beaucoup & se donne une indigestion qui se termine par des vomissemens ; le pouls qui a paru *convulsif, stomachal*, pendant le travail de l'indigestion , est le lendemain plus *tranquille* , plus *égal, mieux réglé* qu'il ne l'étoit avant le vomissement ; le ventre est resserré ; les urines coulent peu ; & deux jours après cette indigestion le

malade devient très jaune en peu d'heures.

Le pouls annonçoit un embarras dans le bas-ventre avant l'indigestion ; cet embarras qui auroit dû naturellement être suivi d'évacuations ne le fut point ; l'indigestion suspendit l'effort des entrailles ; elle changea le pouls ; si l'on avoit fait attention à ce changement & qu'on eût jugé que les matieres qui ne s'étoient pas évacuées par les voies ordinaires , devoient devenir une cause d'irritation qui ne pouvoit que changer l'ordre de l'action des viscères ; auroit-on pu légitimement soupçonner qu'il arriveroit une jaunisse ?

OBSERVATION LXX.

Abbattement général , embarras d'entrailles, pesanteur de tête , fièvre dans un vieux gouteux ; le pouls est très-dérangé les deux premiers jours , les pulsations sont *inégaies* , mais le pouls n'est pas exactement *intestinal* ; son *irrégularité* est plus évidente du

côté droit que du côté gauche : quoiqu'il n'y eut ni douleur ni tumeur du côté du foie, je jugeai néanmoins qu'il étoit fort à craindre qu'il ne s'y formât quelque embarras dans ce viscere ; le malade fut saigné du bras , & on le mit dans l'usage d'apozèmes faits avec des plantes nitreuses ; ce qui n'empêcha pas qu'au quatrième de la maladie le malade ne devînt jaune par tout le corps ; vers le neuvième , le pouls se développe , il est beaucoup plus *inégal* ; il devient *intestinal* bien déclaré , & la maladie se termine par de copieuses évacuations que produisent quelques légers purgatifs.

On voit par cette Observation que dans l'état où se trouvoit le pouls du côté droit au troisième jour de la maladie , on auroit pu prédire une jaunisse.

OBSERVATION LXXI.

Un jeune homme âgé de quinze ans avoit depuis son enfance un embarras marqué à la rate , il se plai-

gnoit de tems en tems de douleurs très-vives dans l'hypocondre gauche; le pouls gauche étoit ordinairement & sur-tout dans les paroxismes de cette douleur, plus *irrégulier*, plus *vif*, plus *tendu* que celui du côté droit.

Il est à présumer que les variations que l'action de la rate opéte sur le pouls, doivent être rapportées à la classe du pouls *d'irritation*; cependant si la rate forme un réservoir particulier pour le sang, ce réservoir fait vrai-semblablement, lorsqu'il se vuide ou lorsqu'il se remplit, des changemens sur le pouls; ces changemens lorsqu'on sera parvenu à les bien déterminer, serviront à caractériser le pouls *simple de la rate*, que je n'ai pas eu occasion d'observer assez pour en bien connoître les signes distinctifs,



CHAPITRE XIV.

Du Puls simple des hémorrhoides.

CETTE espèce de pouls tient un peu du pouls *supérieur* sur-tout du *nasal*, & quoiqu'il soit examiné ici comme *simple*, il est pourtant très-communément *complicqué* avec le pouls *d'irritation*, peut-être même l'est-il toujours.

Ce n'est que par une suite d'observations faites avec la plus grande attention qu'on a pu parvenir à constater exactement le caractère de cette espèce de pouls, souvent même il y a beaucoup de difficulté à le distinguer du pouls des règles.

Stahl a remarqué qu'il y a beaucoup de ressemblance entre la disposition des vaisseaux hémorrhoidaux & celle des vaisseaux de l'intérieur des narines, ainsi qu'entre plusieurs des affections auxquelles ces parties sont

sujettes ; il a remarqué aussi qu'il y avoit un rapport particulier entr'elles ; en effet il n'est pas rare de voir l'hémorrhagie d'une de ces parties succéder & suppléer à celle de l'autre. Cette observation bien approfondie seroit propre à jeter des doutes sur plusieurs idées reçues au sujet des conséquences tirées des loix de la circulation. Voy Chap. XXI.

L'état *d'irritation* qui paroît presque inséparable du pouls des hémorrhoides est cause qu'on a souvent de la peine à juger si un flux hémorrhoidal est critique , ou symptomatique ; les remarques que Stahl & ses disciples ont fait sur le flux hémorrhoidal , quelques utiles qu'elles soient , n'ont pourtant pas déterminé ce qui peut servir à faire cette importante distinction : venons aux marques qui caractérisent le pouls hémorrhoidal.

Ce pouls est inégal comme toutes les autres espèces de pouls inférieur , mais c'est d'une inégalité qui lui est particulière , ses pulsations se ressemblent

peu entr'elles pour la force & encore moins pour les intervalles ; ces pulsations lorsqu'elles sont moins inégales paroissent presque toujours tenir de l'état d'irritation : il y en a néanmoins de tems en tems quelques-unes de plus dilatées & où le resserrement est moins sensible ; ces pulsations plus dilatées sont bientôt suivies de pulsations où il y a du rebondissement ; voici l'ordre à peu près que ces changemens ont accoutumé de suivre.

A trois ou quatre pulsations un peu concentrées, vives, roides, presque égales, succèdent deux ou trois pulsations un peu dilatées comme arrondies & moins égales ; les trois ou quatre pulsations suivantes se font avec du rebondissement ; mais ces diverses pulsations ont ceci de commun , c'est qu'on y trouve une sorte de tremblement assez constant , plus de fréquence & de fonds de resserrement que dans les autres espèces de pouls inférieur.

On sent pour ainsi dire , une sorte de profondeur du pouls , & cette profondeur jointe au tremblement des pulsations , semble être le caractère le plus

distinctif entre le pouls des règles & celui des hémorrhoides : celui-ci est moins dilaté que le premier ; celui des hémorrhoides n'est jamais intermittent non plus que celui des règles ; ou s'il l'est, le devoyement se joint aux hémorrhoides.

Au reste , ce n'est qu'avec beaucoup d'attention & en combinant la disposition, l'état habituel , l'âge & le tempérament du sujet qu'on examine, qu'il faut se flatter de distinguer par l'état du pouls l'engorgement des vaisseaux hémorroïdaux, le tenesme, ou le flux hémorroïdal rouge ou muqueux ; car ce sont là les incommodités que suit & qu'annonce le pouls des hémorrhoides , dont les différens degrés ne peuvent être bien reconnoissables qu'avec le secours de cette comparaison.

OBSERVATION LXXII.

Une femme âgée de près de 60 ans bien constituée naturellement , eut une affection convulsive dans la région épigastrique ; le principal accident étoit une espèce de hoquet pres-

que continuel suivi dans ses intervalles de fréquentes nausées ; la malade disoit sentir sur la région de la poitrine & de l'estomac un resserrement fort incommode ; je ne fus appelé que le vingtième jour de la maladie pour laquelle on avoit déjà mis en usage plusieurs sortes de remèdes ; je fis faire une saignée du bras , & j'ordonnai pour le lendemain de l'ipécacuanha qui eut le succès qu'on en pouvoit attendre ; les accidens disparurent , mais ils revinrent vers le trente-cinquième jour , sans qu'on pût s'en prendre à aucun défaut notable de régime ; ils se calmèrent naturellement peu de tems après.

Il resta à la place de ces accidens un malaise général , une inquiétude singulière dans l'esprit de la malade , un abattement extraordinaire sans fièvre bien décidée ; on employa toutes sortes de remèdes , les adoucissans , les toniques , les amers , toutes les espèces de sels , la saignée du pied , &c. tout fut inutile , les remèdes ne faisoient même qu'aigrir

le mal, & ils excitoient des bouffées de chaleur qui sembloient partir des entrailles & remonter à la tête ; les pieds étoient légèrement enflés, les urines tantôt briquetées, tantôt claires, le ventre toujours molet & point douloureux.

Le pouls qui avoit été jusques-là *sec, vis, concentré, un peu fréquent & égal*, devint *inégal mais serré dans bien des pulsations* ; il y en avoit qui étoient dilatées ; on sentoit dans d'autres du rebondissement avec un tremblotement de l'artère ; plusieurs jours se passerent sans qu'il arrivât rien de nouveau. Déterminé par la persévérance de cette espèce de pouls, je soupçonnai une disposition au flux hémorrhoidal, & je l'annonçai ; quelques jours après & le soixantième à peu près de la première attaque, la malade rendit trois ou quatre palettes de sang par le fondement. Depuis cet instant, elle fut délivrée de toutes ses incommodités, & reprit sa gaieté naturelle.

OBSERVATION LXXIII.

Fièvre putride maligne ; la tête

légèrement prise , cinq saignées dont deux du pied , faites aux cinquième jour , le visage fort pâle , les extrémités froides , le pouls *irrégulier comme vuide & néanmoins avec une roideur considérable , un tremblotement des parois de l'artere & quelques legers rebondissemens.*

Quoique le ventre ne fut ni tendu ni gonflé , ni douloureux , je présumai néanmoins qu'il y avoit de l'embarras & quelque tension singulière dans les vaisseaux du bas-ventre ; je trouvai qu'on avoit donné ce jour-là une décoction de tamarins avec deux grains de tartre stibié : le malade mourut la nuit suivante , c'est-à-dire , à l'entrée du sixième jour , rendant une grande quantité de sang par le fondement.

OBSERVATION LXXIV.

Un homme âgé d'environ soixante ans , fort adonné au vin , avoit eu long-tems la fièvre quarte ; il tomba dans un abattement extraordinaire , perte d'appétit , gêne dans toute

l'étendue du bas ventre : le pouls est *vis*, *dur*, *profond* pendant près de trois semaines ; il se *développe* un peu après un long usage d'apozèmes & de bols apéritifs ; il devient *plein*, *dur*, *inégal* avec *quelques rebondissemens peu sensibles* ; il reste plusieurs jours dans cet état ; le malade rend naturellement par bas , dans l'espace de vingt-quatre heures , plus de six pintes d'une matiere noire avec beaucoup de petits caillots de sang mêlés de glaires , quelque tems après il devint hydropique.

OBSERVATION LXXV.

Un mélancolique sujet au flux hémorrhoidal a ordinairement le pouls *tendu*, *vis*, *assez plein*, *irrégulier* ; pendant les cinq ou six jours qui précèdent l'évacuation , le pouls se *dilate sensiblement*, *il est très-inégal* ; *tremblotant* avec des *rebondissemens inégaux entr'eux* & *assez fréquens* ; le flux hémorrhoidal survient il est quelquefois très-abondant, & dès-qu'il est fini le pouls reprend son

état ordinaire. Cette personne a très-bien appris à juger par son pouls des approches du flux hémorrhoidal.

OBSERVATION LXXVI.

Colique assez vive dans un autre sujet mélancolique ; le pouls est *obscur*, *serre* ; ensuite il se développe un peu , mais il reste une roideur considérable dans l'artere ; ses battemens sont *inégaux*, il y a quelques foibles rebondissemens & des intermittences peu fréquentes. On avoit saigné le malade une fois & on lui avoit donné beaucoup d'huile d'amandes douces ; il y eut des évacuations bilieuses & assez considérables le sixième jour ; le pouls devint un peu plus *mol* & cessa d'être *intermittent* ; il y eut deux jours après un prodigieux engorgement des vaisseaux hémorrhoidaux ; on employa inutilement des saignées & des demis-bains pour dissiper cet engorgement , le pouls étoit toujours dans le même état , mais encore plus *vis* & plus *con-*

vulſif vers le ſoir & toutes les fois que les douleurs augmentoient.

Il ſortit enfin par le fondement une grande quantité de matieres ſéreuſes, *muqueuſes* & ſanguinolentes; les vaiſſeaux hémorrhoidaux ſe dégagerent enſuite peu à peu, & le pouls revint, par degrés, dans ſon état ordinaire.

OBSERVATION LXXVII.

Un mélancolique adonné à ſes plaiſirs qui avoit fait pendant près de trois mois de violens exercices, prétendoit être fort incommodé, & prit de lui même pendant pluſieurs jours des eaux de Bannieres chaudes & ſalées & regardées comme très-purgatives; il lui en reſta un flux hémorhoïdal aſſez conſidérable; c'eſt alors que je fus appelé; je trouvai le pouls *irrégulier*, un peu *rebondissant*, tantôt *plein* & tantôt *reſſerré*; on employa inutilement les remèdes accoutumés; l'hémorrhagie ſubiſta toujours, & le malade mourut dans le maraſme: le pouls qui

s'étoit toujours soutenu dans le même état quoique fort *affoibli*, devint trois ou quatre jours avant la mort plus *serré*, plus *égal*, plus *convulsif*.

OBSERVATION LXXVIII.

Le pouls est *fréquent* & *serré* les trois premiers jours après l'opération d'une fistule considérable au fondement, faite à un homme âgé de quarante-cinq ans; vers le quatrième jour le pouls *se dilate*, il est *légèrement rebondissant*, *très-tremblotant*, fort *irrégulier*, il survient une hémorrhagie d'un pansement à l'autre; le sang perce tout l'appareil; le rectum se remplit de gros caillots; le malade est très-foible, le pouls redevient *petit*, *serré*, *tendu*; il reprend ensuite des forces, la suppuration s'établit; elle dura un tems considérable & le malade guérit.

OBSERVATION LXXIX.

Pâles couleurs dans une fille âgée

de vingt - cinq ans, inquiété ;
vaporeuse , de complexion sèche ;
le pouls paroît chaque mois annon-
cer l'approche des règles ; il est
inégal , légèrement rebondissant , dur ,
ferré , convulsif , tremblotant ; au lieu
des règles , il paroît quelques jours
après un flux hémorrhoidal.

OBSERVATION LXXX.

Une fille âgée de quarante sept ans
qui a cessé d'être réglée à quarante-
quatre , a souvent le pouls assez sem-
blable au pouls des règles , il *s'élève ,*
se durcit , est inégal , fort ferré , un peu
rebondissant ; les vaisseaux hémorrhoi-
daux s'engorgent ; cet engorgement
est quelquefois suivi d'un flux hé-
morrhoidal , & jamais les règles
ne paroissent.

OBSERVATION LXXXI.

Le pouls est *fiévreux , fréquent &*
petit à la suite d'une ancienne dis-
senterie dans un vieux homme infir-
me , il *s'élève de tems en tems , il*
est un peu rebondissant , très-tremblo-

tant , si profond quelquefois qu'il paroît se dérober au doigt ; les pulsations sont fort irrégulières, tantôt une pulsation n'attend pas l'autre , tantôt il se trouve des intervalles considérables ; il y a un tenesme qui résiste à tous les remèdes appropriés; il ne sort que des matieres muqueuses & ensanglantées, & le malade meurt enfin dans le marasme ayant les extrémités œdémateuses.

Le cadavre étant ouvert, on trouva dans le rectum & dans la plus grande partie du colon une grande quantité de tubercules noirâtres à peu près comme des meures , ou comme des espèces de crêtes spongieuses , d'où il sortoit du sang lorsqu'on les exprimoit.

OBSERVATION LXXXII.

J'ai observé plusieurs fois le pouls dur, irrégulier , légèrement rebondissant inégal, deux & trois mois , avant que le flux hémorrhoidal se déterminât, & c'étoit dans des personnes qui n'y étoient point encore sujettes;

on aura souvent lieu de faire la même observation pour le pouls des règles dans des filles , qui n'étant pas encore réglées sont arrivées à peu près au tems de l'être.

Il semble que plus les périodes d'une évacuation critique sont étendus , & plus les signes de cette évacuation se font sentir de loin , surtout avant la première détermination critique. Ceci tient aux révolutions des maladies chroniques. *Voyez les Chap. XXVI. , &c.*

CHAPITRE XV.

Du Pouls simple de l'excrétion critique des urines.

LA sécrétion ordinaire de l'urine rénale peut-être regardée comme une sorte de filtration qui se fait presque sans aucun effort marqué de la part des reins (1) ; la modification

(1) Voy. Recherches sur les Glandes, &c.

particuliere que le pouls reçoit par l'action *critique* d'un organe n'est vraisemblablement due qu'à l'effort que cette organe fait pour l'excrétion ; cette modification ne peut donc pas avoir des signes évidens dans l'excrétion des reins si leur action *excrétoire* n'est pas susceptible d'un changement propre à se faire sentir dans le pouls.

Hippocrate dit que ceux „ qui „ ont les hypocondres élevés avec „ bruit, s'ils viennent à sentir de la „ douleur aux reins, leur ventre „ se relâche & devient libre ; à moins „ que les vents ne s'échappent par „ bas, ou qu'il ne leur survienne un „ grand flux d'urines (1).

Cette observation fait voir qu'il a un grand rapport entre l'excrétion par la voie des intestins & celle qui se fait par la vessie ; elle peut appuyer l'opinion de ceux qui pensent que la matiere des urines est formée en partie de la rosée qui abonde dans la capacité du bas-ven-

(1) Aphor. 73. sect. 4.

tre & que la vessie ne cesse d'absorber. L'observation d'Hippocrate prouve aussi que les signes antécédens de l'excrétion des intestins , peuvent être confondus avec ceux de l'excrétion de l'urine.

» Solano n'a point observé de
 » crise simple par les urines sans la
 » complication de la diarrhée , plus
 » ou moins considérable ; il n'a con-
 » nu aucun signe nouveau de cette
 » crise ; il avance seulement , que
 » la molesse de l'artere jointe à l'in-
 » termision , est un signe certain
 » d'une crise par les urines com-
 » pliquée avec la diarrhée. Le pouls
 de l'excrétion des urines seroit donc ,
 suivant les observations de Solano ,
 toujours *compliqué ou composé* & ja-
 mais *simple*.

Ce pouls lorsqu'il est bien criti-
 que , se trouve avoir beaucoup de
 rapport avec le pouls *intestinal* ,
 en ce que ses pulsations sont *inéga-*
les ; mais il paroît que dans cette *iné-*
galité même , il y a une sorte de ré-
 gularité qui manque au pouls *intes-*
tinal : le pouls des urines a plusieurs

pulsations moindres les unes que les autres, & qui vont en diminuant jusqu'à se perdre, pour ainsi dire, sous le doigt; c'est dans ce même ordre qu'elles reviennent de tems en tems; les pulsations qui se font dans ces intervalles, sont plus développées, assez égales & un peu sautillantes.

Enfin il semble, & ~~celle~~ là est très remarquable, que ce pouls soit l'inverse de celui de la sueur dont il sera parlé au Chapitre suivant; c'est ce qui paroît indiqué par le petit nombre d'observations qu'on a pu faire sur les signes propres de l'excrétion des urines.

OBSERVATION LXXXIII.

Un homme de moyen âge, très-bien constitué, tomba dans un abattement & un état de mélancholie qui lui fit ardemment désirer de faire des remèdes; il en avoit déjà fait beaucoup lorsque je fus appelé; il me demanda de le voir pendant trois jours, de lui tâter le pouls sans qu'il voulût entrer dans aucun

détail sur son état. Ayant examiné son pouls avec beaucoup d'attention, pendant le tems convenu, je trouvais qu'il étoit irrégulier, sans intermittences, tantôt fort, tantôt foible, il y avoit de tems en tems cinq ou six pulsations qui alloient en diminuant, & puis les pulsations fortes reparoissoient avec des inégalités remarquables.

Le malade m'apprit alors, qu'il étoit tourmenté de beaucoup de vents, qu'il avoit des maux de reins continuels; & qu'il sentoît presque toujours une pesanteur fort importante sur l'estomac.

Je commençai par le mettre dans l'usage de quelques apozèmes nitreux. Il fut plus agité qu'à l'ordinaire pendant deux ou trois nuits consécutives, il y eut ensuite des évacuations bilieuses assez abondantes; le malade fut purgé avec un purgatif ordinaire, & je le mis dans l'usage journalier de quelques verres d'une décoction de rhubarbe & de raisins secs.

Le désordre des entrailles, la dou-

leur des reins & la pesanteur de l'estomac subsisterent ainsi que l'état du pouls , pendant plusieurs jours ; enfin les urines devinrent épaisses & avec cela très-abondantes , durant trois nuits consécutives ; le pouls reprit son état naturel & le malade fut délivré de ses accidens & de ses inquiétudes.

OBSERVATION LXXXIV.

Une femme âgée de 26 ans soupçonnée d'avoir des embarras considérables au foie & à la matrice , est devenue hydropique ; le pouls a été constamment serré , concentré , convulsif ; enfin il a changé sans cause manifeste ; il s'est élevé , il est devenu nasal , bien décidé ; ce qu'il n'est pas rare d'observer dans les hydropisies un peu avancées ; la malade a eu un saignement de nez ; on a donné un vomitif , suivant des indications bien marquées ; ce vomitif a eu le succès qu'on en pouvoit attendre ; le pouls est resté à peu - près dans le même état. On a donné en-

suite six gros de nitre purifié dans deux vers d'eau commune, à une heure d'intervalle l'un de l'autre; remède éprouvé en pareil cas. Ce remède n'a opéré ici que par les urines; elles ont coulé très-abondamment pendant trois jours; le volume du ventre a sensiblement diminué ainsi que l'enflure des extrémités inférieures.

Le pouls précédemment *supérieur* & un peu *convulsif* a été pendant l'opération du nitre, *inférieur*, *irrégulier*, *inégal*; il y avoit des pulsations assez fortes, suivies de cinq ou six qui diminuoient à proportion qu'elles s'éloignoient de la première. Le pouls a changé le quatrième jour, il est redevenu *supérieur* & *naçal*; le saignement de nez a reparu; les urines sont rouges & en très-petite quantité; l'enflure augmente & revient à son premier point.

OBSERVATION LXXXV.

Une fille âgée de quatorze ans & qui n'est pas encore réglée, a toutes les nuits, depuis les premiers tems de son enfance, une incontenance d'urine; elle n'en rend point dans la journée, & c'est pendant le sommeil qu'elle perd son urine abondamment; on a essayé inutilement toute sorte de remèdes.

Cette fille a habituellement la peau sèche & froide, le pouls très-petit, serré, & assez égal; elle a chaque soir une sorte de frisson en entrant dans son lit; elle s'endort; son pouls se développe pendant le sommeil, il devient inégal, quelques pulsations vont en diminuant à proportion qu'elles s'éloignent de la première; l'excrétion de l'urine se fait vers minuit sans que la fille s'en apperçoive; son pouls est le lendemain comme la veille petit, serré, convulsif.

Il est certain que les évacuations critiques du ventre sont assez souvent accompagnées d'une excrétion

critique d'urines ; mais il n'est pas démontré, comme Solano paroît le croire, que cette dernière excrétion soit toujours jointe avec la diarrhée ; il est au moins douteux que les caractères du pouls qui précède l'excrétion critique des urines compliquée avec la diarrhée, se réduisent, à *la mollesse & à l'intermittence* : c'est ce qu'on peut conclure des observations rapportées. M. Nihell ne paroît pas être entièrement de l'avis de Solano à l'égard du pouls des urines.

Au reste les Praticiens sçavent que les excrétions abondantes d'urines crues, toujours précédées & accompagnées d'un pouls *un peu inégal, serré, convulsif*, ne sont presque jamais que symptomatiques : d'ailleurs l'observation fait voir que les crises complètes, par des urines abondantes, sont extrêmement rares ; le flux critique d'urine, nommé par les anciens *Perirrhie*, étoit même contesté parmi eux.

L'excrétion abondante d'urines nommée *diabetes* a été comparée fort à propos au dévoyement ; il faut

ajouter pour rendre la comparaison plus parfaite, que ce dévoyement auquel le *diabetes* est comparable, est *symptomatique, colliquatif, non-critique*; on ne doit donc pas s'attendre à un pouls bien critique dans le *diabetes*.

CHAPITRE XVI.

Du Pouls qui annonce la sueur critique.

IL est décidé par les Auteurs anciens & modernes que la sueur critique est précédée du pouls *plein, souple, ondulant*: ce pouls paroît être le seul pouls critique décrit par Galien qu'on s'est long-tems contenté de copier, sans faire des efforts pour aller plus loin que lui, & que les Modernes ont trop négligé au sujet de l'histoire du pouls.

Solano soutient que le pouls qui annonce la sueur critique, & qu'il nomme *inciduus*, est celui » dans le-

» quel deux pulsations, trois ou qua-
» tre tout au plus, s'élèvent non-
» seulement au-dessus des autres,
» mais aussi par degrés, chacune au-
» dessus de la précédente; la secon-
» de au-dessus de la première, &
» ainsi de suite, jusqu'à la quatriè-
» me inclusivement; car Solano n'a
» jamais observé plus de quatre pul-
» sations consécutives de cette sor-
» te ». M. Nihel n'a jamais observé
le pouls *inciduus*.

Ce pouls *inciduus* paroît être dif-
férent de l'*ondulant*, avec lequel le
pouls *pectoral simple* se trouveroit
avoir plus de rapport.

On pourroit inférer delà, que les
cas où les Anciens ont trouvé le pouls
ondulant, étoient des cas *compliqués*
d'un double mouvement critique,
qui rendoit en même-tems à l'ex-
crétion des crachats & à celle de la
sueur.

En effet, le mélange du pouls *pec-
toral* avec celui de la *sueur* n'est pas
rare; aussi n'est-il pas rare de voir des
malades qui crachent & qui suent

abondamment en même-tems : mais il n'est question ici que du pouls *simple* de la *sueur*.

Ce pouls lorsqu'il est bien critique est constamment *plein*, *souple*, *développé*, *fort* ; il a tant de rapport avec le pouls *supérieur*, qu'à moins d'une attention particulière, ou d'une grande habitude d'en juger, il est difficile de ne pas les confondre ; il est au contraire très-rare de le trouver joint au pouls *inférieur* ; aussi les Anciens mettoient-ils la rougeur de la face, qui indique le transport des humeurs vers les parties supérieures, parmi les signes les plus certains de la *sueur*.

Le *développement* qui est un caractère du pouls de la *sueur* critique, est prouvé même par les observations de Solano. Il dit avoir trouvé le pouls de la *sueur* *mol* ; cette *moleffe* n'est autre chose que le *développement* qui, ainsi qu'on l'a dit en son lieu, est un signe propre à tous les pouls critiques.

Voici la description du pouls critique de la *sueur*. *Lorsque le pouls est*

plein , souple , développé , fort , qu'à ces modifications se joint une inégalité , dans laquelle quelques pulsations s'élèvent au-dessus des pulsations ordinaires , & vont en augmentant jusqu'à la dernière , qui se fait distinguer par une dilatation & en même-tems une souplesse plus marquées que dans les autres pulsations , il faut toujours attendre une sueur critique.

Il est dit dans cette description qu'il y a quelques pulsations qui s'élèvent au-dessus des autres & qui vont en augmentant. Solano a borné le nombre de ces pulsations ainsi graduées à celui de quatre , & communément on n'en trouve que deux ou trois ; un Auteur plus moderne que Solano & cité dans la préface , dit avoir observé plus de cinq élévations graduées : ce sur quoi il faut attendre la décision des observateurs.

On ne sauroit trop répéter que la première condition du pouls critique de la sueur est d'être *développé , dilaté & sur-tout assez égal dans les intervalles des pulsations* ; car il y a des pouls compliqués , dans lesquels

deux ou trois pulsations sont plus fortes que les ordinaires, & où il semble qu'il y ait quelque sorte de gradation, sans que ces pouls soient suivis de sueur; mais dans ces cas il y a une *roideur*, une *tension*, une *sécheresse* considérable de l'artère, ainsi qu'un *sautillement* & une *inégalité* dans les distances des pulsations, qui ne se trouvent point dans le pouls *simple* de la sueur critique.

Il n'y a pas beaucoup de sueurs bien critiques; elles ne sont, le plus souvent, que symptomatiques. Hippocrate a prononcé que » les sueurs » promptes & violentes, celles même » qui arrivent aux jours critiques, sont » dangereuses, ainsi que celles qui sortent du front en manière de gouttes, » & les sérosités saillantes fort froides » & en quantité; car il faut nécessairement que de telles sueurs soient » faites avec beaucoup de violence, » par un travail excessif, & par une » longue expression « (1); on trouve toujours en ces cas-là, le pouls

(1) Aphor. 4. sect. 8.

de la sueur *complicqué* avec celui d'*irritation*.

Quant aux sueurs symptomatiques, » celles qui coulent toujours , dit encore Hippocrate , font juger que le » corps abonde en humeurs & qu'il » faut évacuer (1) ; la sueur qui survient à un fébricitant sans que la fièvre cesse , est un mal , parce qu'elle » signifie que la maladie sera longue » (2) : « il ne faut pas chercher dans ces sueurs tous les signes des sueurs critiques.

Solano prétend qu'il ne trouvoit pas le pouls *inciduus* dans les sueurs qui arrivent à la fin des accès de fièvre *intermittente* : cette règle n'est pas générale , car le pouls de la sueur se trouve quelquefois dans les derniers accès de fièvre , c'est-à-dire sur la fin de la maladie.

Les sueurs critiques arrivent aussi dans les maladies aiguës & continues, sur la fin , ou du moins dans des jours marqués par les signes d'une bonne coc-

(1) Aphor. 61. sect. 4.

(2) Aphor. 56. sect. 4.

tion (1) : elles sont précédées d'une espèce singulière de tremblement & de la suppression des urines (2), qui selon Avicenne, sont en ces cas-là, fort rouges & fort enflammées : ces espèces de sueurs ne manquent jamais d'être précédées & même accompagnées du pouls critique qui leur est propre.

On trouve à peu - près le même pouls dans l'éruption favorable de la rougeole & de la petite-vérole, excepté qu'il n'a pas tout-à-fait le même degré de *molle* ; car quoique le pouls soit ordinairement *non critique* au commencement de ces maladies, il se *développe* bientôt, i. e. qu'elles sont bénignes : il est fort ordinaire de trouver alors le pouls de la sueur qui indique le transport des humeurs vers la surface de la peau ; cependant il y a toujours une tendance marquée au *rebondissement* qui se change, pour ainsi dire, en *ondulation* dans le cas d'une éruption favorable ; c'est ce

(1) Hipp. Aphor. 36. sect. 4.

(2) *Idem.* Epid. sect. 1. liv. 6.

qui montre parfaitement le rapport du pouls de la sueur, avec le pouls *supérieur* auquel il se trouve souvent joint.

Plusieurs Auteurs célèbres ont avancé que quelquefois » le mouvement » tonique vital paroît se déterminer » de l'intérieur du corps à l'extérieur , » & réciproquement de l'extérieur à » l'intérieur (1) ; « c'est de ce changement qu'il faut déduire le tremblement & le resserrement qui , suivant Hippocrate , précède la sueur ; la chaleur qui survient après le *frissonnement* , est une preuve que les viscères se sont dégagés de la surabondance d'humeurs , dont ils se trouvoient chargés pendant le resserrement.

C'est vraisemblablement à la faveur de ces principes qu'on parviendra à découvrir les causes particulières des divers changemens du pouls dans toutes les excrétions critiques.

(1) Hofman. Médecin. raison. T. 3. sect. 1. Chap. 6. Voy. Stahl. Thèse des eaux d'Aquitaine , &c.

OBSERVATION LXXXVI.

Une fille fort âgée est sujette à suer toutes les nuits, depuis plus de dix ans: elle a une si grande disposition à la sueur, que pour peu qu'elle approche du feu, ou qu'elle soit couverte dans son lit, il lui vient tout d'un coup des sueurs abondantes; la seule vue du soleil, un rayon même qui tombe sur sa main, & les lumières dans une chambre fermée, lui excitent d'abord la sueur; il faut qu'elle soit toujours dans l'obscurité, & presque point couverte dans son lit; son pouls est ordinairement *plein, fort, assez égal*; dès qu'elle sent une augmentation de chaleur, ce qu'elle appelle *sa sueur qui vient*, le pouls devient *plus plein, plus souple, inégal*; c'est-à-dire, qu'il y a deux pulsations beaucoup plus élevées que les autres; plus ces pulsations reviennent souvent, & plus la sueur est prochaine & abondante.

Semblable à des intestins dans un état de dévoyement, la peau de cette fille est toujours dans une disposition

prochaine à la sueur, *souple, onctueuse*; le pouls plus ou moins *mol, plein, dilaté*; les urines sont en très-pétite quantité, & rendues difficilement; le ventre est fort resserré: ce qui indique que cette sueur tient beaucoup de la sueur critique.

OBSERVATION LXXXVII.

Sueurs abondantes toutes les nuits, depuis fort long-tems, dans un homme âgé de quarante-cinq ans; il croit avoir remarqué que de deux nuits l'une, sa sueur est plus considérable. Il lui arrive souvent, en entrant dans son lit, une sorte de frisson & de tremblement par tout le corps; ce frisson lui dénote que sa sueur sera très-abondante.

Le pouls est habituellement assez *dilaté, égal, lent*: néanmoins l'artère paroît avoir quelque tension, & cette tension cesse aux approches de la sueur: alors le pouls devient plus plein, plus fréquent: on sent très-souvent des pulsations plus élevées que les autres: il y en a quelquefois deux, quel-

quefois trois qui s'élèvent par gradations. Cet état du pouls subsiste jusqu'au déclin de la sueur.

Lorsque la sueur est moindre qu'à l'ordinaire, le pouls n'est pas à beaucoup près aussi *dilaté*, aussi *souple*, & il y a moins de pulsations *élevées* par-dessus les autres.

OBSERVATION LXXXVIII.

Un homme âgé de vingt six ans, & qui paroît bien constitué, est attaqué d'une fièvre continue; il a le pouls *rebondissant presque à chaque pulsation*, dès le premier jour, & ce jour-là même il fut saigné trois fois du bras; cela n'empêcha pas que le soir il ne saignât du nez; le lendemain le visage est très-rouge, le pouls très-plein, moins *dur* & point *rebondissant*: on fait une saignée du pied. Vers le soir du quatrième jour le malade est fort agité & fort inquiet; il sent des bouffées de chaleur qui lui montent à la tête.

Le pouls est *plein*, *vigoureux*, *souple*; on sent des pulsations beaucoup

plus pleines , plus moles les unes que les autres : & le lendemain , à l'entrée du cinquième jour , le malade est en sueur ; le pouls est encore plus plein , plus mol , il y a plus souvent des pulsations élevées : la sueur dure deux jours consécutifs ; elle est universelle , très-grasse , fétide ; le pouls se soutient dans le même état pendant ce tems - là , les urines ne coulent presque point ; le ventre nes'ouvre que vers la fin du septième jour , & alors le pouls est devenu *intestinal* : on donne au huitième un léger purgatif , qui réussit bien , & le malade entre en convalescence.

OBSERVATION LXXXIX.

Fièvre continue avec redoublemens ; le pouls est plus ou moins *convulsif* , non critique : pendant les douze premiers jours , il y a de tems en tems , dans cet intervalle , quelques légers *rebondissemens* ; le malade saigne du nez en petite quantité & à plusieurs reprises ; le pouls se *développe* vers le quatorzième jour ; il

devient *égal*, *mol*, on y découvre quelques *pulsations plus élevées* : ces pulsations sont plus fréquentes du quinze au seize ; j'annonçai la sueur pour le dix huitième, ou le vingtième ; elle parut en effet, & dura quelques vers le vingt-unième, que le pouls devint *intestinal* : on donna les jours suivans quelques légers purgatifs, & au vingt-cinq la maladie fut terminée.

OBSERVATION XC.

Fluxion de poitrine avec le pouls *d'irritation* bien marqué, & crachement de sang au quatrième jour : le pouls se *développe* au sixième, il *s'étend* & se *ramollit* : il y a des pulsations *plus élevées les unes que les autres*, qui me parurent d'abord tenir du pouls *redoublé* : j'annonçai les crachats, au lieu desquels la sueur se déclare au septième ; elle est fort abondante jusqu'au neuvième : la maladie est terminée le onzième par des évacuations du ventre, précédées du pouls qui les annonce, & qui fu-

rent aidées par un purgatif placé sur l'indication du pouls.

Je n'avois pas remarqué , faute d'une suffisante attention , en annonçant la crise par les crachats , que le pouls étoit plus tourné à la sueur qu'à l'expectoration , ce dont je fus convaincu pendant que la sueur dura ; car le pouls fut toujours *plein , mol , & il y avoit fréquemment des pulsations élevées au-dessus des autres , & qui étoient tantôt deux à deux , tantôt trois à trois.*

OBSERVATION XCI.

Plusieurs rougeoles , dans lesquelles le pouls est au tems de l'éruption *mol , plein* avec des pulsations plus *élevées* que les autres ; les malades furent assez abondamment , à proportion que l'éruption rougit & s'étend davantage.

Le pouls a paru moins *souple , moins plein , moins dilaté* , dans les rougeoles , dans lesquelles la toux a été opiniâtre , il étoit encore plus *vis* , plus *serré , irrégulier , sautillant* ,

dans celles où il y avoit un dévoyement considérable : enfin dans celles où il y a eu un saignement de nez, le pouls a été *rebondissant* : & il y en a eu de malignes, ou opiniâtres, dans lesquelles l'on a distingué le pouls *nasal*, l'*intestinal* avec des *intermittences* & le pouls de la sueur qui se suivoient d'assez près.

Dans les rougeoles où il est arrivé que la crise s'est faite principalement par l'expectoration, elle n'a pas manqué d'être annoncée par le pouls *pectoral simple*, ou *complicqué*.

On a observé les mêmes variations & complications dans le pouls des petites véroles bénignes, dans lesquelles il est fort ordinaire de le trouver, après l'éruption, dans un état de *souplesse* & d'*égalité* jusques vers le onzième ou le quatorzième jour ; alors le pouls devient de lui-même *nasal* ou *guttural*, il est suivi d'excrétions muqueuses & même sanguinolentes par le nez ; ou bien il devient *irrégulier* & *intestinal*, quand les évacuations du ventre terminent la maladie.

Petite-vérole confluyente, dans laquelle l'éruption se faisoit difficilement; la tête fut prise vers le septième jour; le pouls devint très-*convulsif*: on fit une saignée du pied, le pouls demeura *serré*, & la tête également embarrassée: on appliqua des vésicatoires aux jambes, & on imagina en même-tems de mettre au malade une chemise d'un autre, dont la petite-vérole étoit en pleine suppuration. Cette chemise, qui étoit imbibée de pus en plusieurs endroits, se cola à la peau du malade; au neuvième jour les vésicatoires ayant assez bien mordu, le pouls se *développa*, & devint bientôt *rebondissant*: il y eut le soir même un saignement de nez.

Le lendemain le pouls ne fut plus *rebondissant*, il resta néanmoins assez *dilaté*, il fut *inégal* avec quelques pulsations fort *élevées*; mais il étoit fort lent & d'une extrême *molle*: on eut recours à des portions cordiales, la peau paroissoit s'assouplir & s'humecter, la tête restoit toujours dans le même embarras: vers le soir

du onzième jour le malade eut un violent frisson , & mourut le lendemain dans la sueur.

Cette observation fait voir que , même dans les plus fâcheux événemens des maladies , le pouls est quelquefois suivi de l'espèce de crise qu'il annonce.

Un malade extrêmement foible , disoient les Anciens , peut mourir avant la fin de la crise ; & untel cas , s'il arrive , ajoute Solano , ne peut point altérer la vérité des observations sur le pouls.

CHAPITRE XVII.

Des Pouls critiques combinés entr'eux ou composés.

LES pouls *composés & compliqués* sont plus ordinaires que les pouls *simples* , mais ils ne sont pas aussi aisés à bien caractériser ; il y a dans leur marche de fréquentes variations qui paroissent d'abord confondre les espèces de pouls jointes ensemble.

Un pouls *composé* est celui qui résulte du *mélange* ou de l'*union* de deux ou plusieurs pouls *simples*, qui se succèdent alternativement. Gaïen avoit déjà parlé des pouls *composés*, mais il ne les avoit pas considérés comme ils le sont dans cet ouvrage.

Les révolutions particulières de chaque organe font chacune un changement particulier dans le pouls; les révolutions successives de plusieurs organes, doivent donc donner au pouls des modifications dans lesquelles on puisse découvrir le changement dû à l'action de chaque organe affecté.

Cette réflexion ne sera pas inutile pour une plus parfaite intelligence, des observations qui seront rapportées.

Ainsi l'on verra dans la suite, que le pouls *nasal* & le *guttural* se trouvent souvent joints dans une même maladie; le *nasal* & le *pectoral* vont encore très-communément ensemble; le *pectoral* & le *pouls de la sueur* sont aussi souvent réunis: le *pectoral* & l'*intestinal* quelque opposés qu'ils

paroissent , forment une *combinaison* qui est assez ordinaire : enfin , on trouvera peu d'exemples de tous ces pouls *simples* , joints ensemble dans le même - tems ; c'est-à-dire dans un même redoublement,

Il y a des espèces de pouls *composés* , dans lesquels un pouls *simple* paroît constamment dominer sur tous les autres ; c'est même cette supériorité d'une espèce de pouls qui assure l'événement heureux de la crise ; puisqu'il est fort rare qu'une excré- tion qui se fait par plusieurs organes soit bien complète & bien décisive (1).

On n'examine ici que les différentes combinaisons des pouls *critiques* , ce qui exclut la présence du pouls *convulsif* , ou du pouls *d'irritation* qui est *non-critique* , & qui comme on le verra en son lieu , se *complique* souvent avec les pouls *critiques*.

» Quelquefois tandis que le pre-
» mier signe observé dans le pouls
» subsiste , un second , & même un

(1) Voy. le Chap. 22.

» troisième survient & ils persistent
» ensemble ; alors les deux ou trois
» crises signifiées par-là arrivent.

M. Nihell rapporte cette assertion vague & isolée, de Solano, sans entrer dans aucune discussion particulière, & même sans dire ce qu'il en pense.

On verra dans la suite, que l'histoire de la *composition*, & de la *complication* du pouls, est ce qu'il y a de plus important sur cet objet : la matière est même si difficile, si étendue & si nouvelle, qu'on ne sauroit douter que les observateurs n'y ajoutent un grand nombre de découvertes.

CHAPITRE XVIII.

*De la combinaison des pouls
supérieurs.*

TO U T E S les espèces de pouls *supérieurs* se trouvent quelquefois ensemble dans la même maladie, &

même dans un seul redoublement , en se succédant à de plus ou moins grands intervalles.

On pourroit présumer , d'après beaucoup d'observations , que le mélange , ou l'union de tous ces pouls indique , que dans certaines maladies , le corps du tissu cellulaire & vasculaire qui se trouve depuis le diaphragme jusqu'à la tête , est généralement affecté ; il résulteroit de-là que les mouvemens critiques peuvent se déterminer successivement dans les différentes portions de ce tissu : c'est ce qui donne lieu de croire , en ne raisonnant que sur les apparences , que la maladie passe d'une partie à une autre.

Venons à la manière dont les pouls *supérieurs* se trouvent le plus ordinairement *combinés* dans les maladies légères ou peu graves : un pouls *composé* du *pectoral* & du *naçal* , sera celui dont quelques pulsations auront le *rebondissement* & la *mollese* propres au *pectoral* , & d'autres le *rebondissement* & la roideur propre au *naçal*. Qu'il y ait plusieurs pulsations pro-

pres au pouls *pētoral*, sur peu de celles qui appartiennent au pouls *na-zal*, que ces pulsations particulières se répètent plus ou moins souvent, le pouls n'est pas moins réellement *composé* ; il s'en suivra seulement qu'une de ces excrétiions sera plus décidée, ou plus abondante que l'autre.

Il peut aussi arriver que le pouls se soutiendra *pētoral*, par exemple, l'espace de vingt-quatre heures, ou de beaucoup moins, & qu'il deviendra ensuite *na-zal* dans les mêmes proportions ; ces espèces de pouls n'en sont pas à moins juste titre dans la classe des *composés*.

Les *compositions* doivent être sujettes à beaucoup de variations selon la disposition du sujet, la nature de la maladie & la méthode du traitement. Les observations suivantes fourniront plusieurs exemples de ces *combinaisons*.

OBSERVATION XCII.

Erésipèle au visage, avec fièvre continue,

continue, dans un jeune homme bien constitué : malgré deux saignées du pied, faites au deuxième & au troisième jour, le pouls devient *naçal* vers le quatrième; il se déclare presque en même-tems un saignement de nez, qui dure jusques vers le sixième; alors on trouve dans le pouls quelques dispositions à devenir *pectoral*; les pulsations sont plus pleines, les rebondissemens sont plus molets; le malade touffe du septième au dixième, & pendant ce tems-là il rend de la gorge & de la poitrine des crachats épais & un peu de sang du nez : il ne faut pas omettre qu'on avoit donné l'émétique dans le septième, qui, comme on voit, n'avoit pas dérangé l'expectoration; il n'en eut vrai-semblablement pas été de même de l'effet d'un purgatif un peu fort.

Le pouls *pectoral* devient dominant depuis le dixième, le *naçal* ne fait que se montrer de tems en tems à peu-près à chaque huitième pulsation; ce dernier devient fréquent vers le treizième, le *pectoral* est moins

apparent , le saignement de nez augmente ; il cesse enfin vers le vingtième , & alors le pouls reste fixé au *pectoral* , qui dure plusieurs jours , avec le *guttural* ; il sort de la poitrine , de la gorge , & du nez une quantité prodigieuse de matière comme purulente , & la maladie est terminée au moyen de quelques légers purgatifs , indiqués par les changemens du pouls.

OBSERVATION XCIII.

Fluxion de poitrine , point de côté , crachement de sang dans un homme de complexion sèche , & d'un âge avancé. Le pouls est *tendu* , *vif* , *convulsif* dans les premiers jours ; on fait cinq saignées du bras pendant ce tems-là ; le pouls se développe vers le fixième , il devient *pectoral* , & le septième les crachats sont cuits , & viennent facilement ; on donne ce jour-là un purgatif à cause d'un redoublement orageux qu'il y avoit eu la veille ; le pouls se *serre* & se *roide* ; les crachats sont diminués ; le

pouls devient *rebondissant* vers le neuvième, & du neuf au onze il est *pectoral*, à peu-près dans six ou huit pulsations, & *nasal* dans trois ou quatre; il survient un léger saignement de nez; au douzième le point de côté se réveille; il y a beaucoup de chaleur & de sécheresse à la gorge, les crachats sont presque supprimés. Le pouls devient enfin bien *pectoral* vers le quatorzième, les crachats sont cuits & sortent de la gorge & de la poitrine en grande abondance: la maladie fut heureusement terminée vers le vingtième.

Il faut remarquer que depuis le purgatif on avoit presque toujours tenu le malade dans l'usage d'une potion huileuse, avec du kermès, qui avoit été suivie d'évacuations peu considérables.

OBSERVATION XCIV.

Fièvre maligne dans un jeune homme bilieux, de complexion vive & sèche: le pouls reste pendant les vingt premiers jours presque toujours con-

vulsif ; dans cet intervalle on fit neuf saignées du bras , ou du pied , & on donna beaucoup d'émétique en lavage , avec peu de succès.

Le pouls parut quelquefois *naçal* , mais peu *développé* , il y eut quelque léger saignement de nez , & un peu d'inflammation à la gorge : vers le vingt , & dans les jours suivans , il sortit du nez , & de l'arrière narine quelques matières puriformes ; le pouls fut *pectoral* vers le vingt-cinq , avec de la toux & de l'enrouement ; & du vingt-cinq au trente le malade rendit une assez grande quantité de crachats presque purulens ; la maladie ne fut terminée qu'imparfaitement.

OBSERVATION XCV.

Mal de gorge avec peu de fièvre & un gonflement considérable des amygdales , dans un homme d'un âge un peu avancé ; au quatrième jour le pouls est tantôt *naçal* , tantôt *pectoral* ; il y a quatre ou cinq pulsations qui ont la *roideur* & le *rebondissement*

propres au pouls *nasal*, d'autres sont *moles*, *souples*, *pleines*, ainsi que dans le pouls *pētoral*; il y a un peu de saignement de nez pendant tout le cours de la maladie; il sort aussi du nez beaucoup de sérosités & de matières muqueuses; les crachats qui viennent de la gorge sont presque puriformes: le pouls devient *pētoral* plus *décidé*, il est bientôt suivi d'une expectoration abondante & bien conditionnée. La maladie finit par des excrétions presque continuelles, du nez, de la gorge & de la poitrine.

Ce malade fut saigné cinq fois dans les commencemens de la maladie, & purgé ensuite trois fois avec des purgatifs doux, dont l'effet fut assez médiocre; les changemens que ces purgatifs produisirent dans le pouls furent peu considérables, & de peu de durée.

Voyez le Chapitre XXXIV, au sujet des remèdes qui ne changent presque point la marche du pouls.

CHAPITRE XIX.

*De la combinaison des Pouls supérieurs
avec le Pouls intestinal.*

IL est plus ordinaire de trouver l'espèce de *combinaison* ou de *composition* dont il s'agit ici , que celle qu'on a examinée dans le Chapitre précédent.

Le dérangement des fonctions des viscères du bas-ventre entrant toujours pour beaucoup dans la plûpart des maladies , il n'est pas surprenant que les changemens du pouls qui annoncent ou qui suivent ces dérangemens & leurs effets soient très-fréquens ; ainsi on trouvera facilement les occasions de reconnoître la *combinaison* des pouls *supérieurs* , avec le pouls *intestinal*.

On verra dans les Observations les diverses espèces de pouls critiques tantôt se succéder l'une à l'autre dans les redoublemens ou dans les divers

tems des maladies , tantôt se présenter presque en même tems ou se succéder très-rapidement.

Au reste on les trouve plus ou moins dominantes les unes sur les autres, selon les déterminations plus ou moins difficiles de l'effort critique. Tout cela se présentera d'une manière très-sensible au doigt d'une observateur attentif.

OBSERVATION XCVI.

Le pouls est *vif, fréquent, rebondissant* dans un jeune sujet au cinquième jour d'une fièvre continue. Il y avoit eu cinq saignées du bras qui n'empêcherent pas que le saignement de nez annoncé par le *rebondissement* ne parût vers la fin du sixième jour : au milieu du septième le pouls change subitement sans qu'on puisse l'attribuer à l'action d'aucun remède ; il devient *inégal, sautillant avec quelques intermittences* ; le ventre grouille ; un purgatif léger placé heureusement le lendemain huitième de la maladie , produit des évacuations

considérables ; le pouls redevient peu à peu *supérieur*, les jours suivans ; ses pulsations sont *égales*, *dilatées*, *redoublées avec souplesse* ; le ventre se resserre malgré l'usage des apozèmes légèrement purgatifs, & les crachats paroissent vers le onzième jour ; les crachats sont plus cuits & plus abondans vers le quatorzième ; & vers le vingt, la maladie est terminée.

OBSERVATION XCVII.

Fièvre assez considérable mais sans aucun fâcheux accident dans un vieillard que je n'ai eu occasion de voir que le onzième jour. Il y avoit eu au septième un dévoyement spontané très-abondant ; ce dévoyement dure encore au onzième ; le pouls est *lent*, *petit*, *inégal* ; avec quelques *sautillemens* ; il y paroît au douze quelques légers *rebondissemens*, les pulsations deviennent ensuite plus *pleines*, plus *moles*, *redoublées & égales*, on en trouve jusqu'à quatre de cette espèce après quoi les pulsations *inégales* recommencent ; au treizième jour le

pouls est *supérieur* plus décidé ; le malade prend deux verres d'eau de casse avec deux grains de tartre stibié , il vomit assez abondamment ; le lendemain , c'est-à-dire , le quatorzième , le pouls est évidemment *pectoral* ; la toux paroît deux jours après , elle devient grasse , les crachats sont abondans vers le seize , il n'y a plus de dévoyement depuis la fin du quatorze ; la maladie finit par l'expectoration vers le dix-huit : cette expectoration n'a pas été dérangée par l'action de l'émétique , elle l'avoit été par celle d'un purgatif dans l'Observation 93.

OBSERVATION XCVIII.

Fluxion de poitrine , crachement de sang dans un autre vieillard ; malgré plusieurs saignées & l'usage des remèdes ordinaires le pouls reste toujours *ferré* , *non critique* jusques vers le onzième jour ; alors il commence à se développer , les pulsations deviennent en peu de tems fort inégales , il y a des intermittences auxquelles succé-

dent des sautillemens vifs de l'artère.
J'annonçai les évacuations du ventre, elles sont abondantes du treizième au quatorzième jour ; les crachats qui ne venoient jusqu'alors que difficilement sont supprimés pendant ce tems là ; le pouls devient bien *pectoral* malgré un léger purgatif qui eut peu d'effet au seize ; la toux reparoit , les crachats sont bien cuits , abondans & viennent facilement , le ventre se resserre ; la maladie finit heureusement vers le vingt-unième.

OBSERVATION XCXIX.

Pouls *naçal* & *pectoral* dans un jeune sujet sur la fin d'une fièvre double-tierce continue pour laquelle on avoit fait plusieurs saignées & employé des purgatifs & des apozèmes fébrifuges. Le malade touffe & crache abondamment , le ventre est resseré ; le pouls devient *inégal* , *sautillant* , *intermittent* , il survient dans la nuit un dévoyement considérable ; le pouls redevient *supérieur* , & trois jours après il est bien *pectoral* Les crachats repa-

roissent bien conditionnés, & le malade entre en convalescence.

OBSERVATION C.

Pouls *naçal & pectoral* vers la fin d'une fièvre maligne, le malade crache & mouche pendant quelques jours beaucoup de matieres *muqueuses*, puriformes & sanguinolentes; on employoit pendant ce tems, les apozèmes légèrement purgatifs: le pouls se *concentre*, il devient *irrégulier*, *sautillant & très-inégal*, il est bientôt suivi d'un dévoyement, les crachats cessent, & le malade reste dans un état de langueur.

OBSERVATION CI.

Pouls *dur*, assez *plein*, très-*inégal & sautillant* vers le quinzième jour d'une maladie de mauvaise espèce, pour laquelle on avoit fait six saignées, donné l'émétique suivi le lendemain d'une potion purgative & ensuite d'apozèmes laxatifs: le ventre se gonfle, & se tend sans douleur, il

y a beaucoup de grouillemens & de fréquentes envies d'aller inutiles; la nuit suivante, c'est-à-dire, vers le seizième jour, il y eut d'abondantes évacuations: le pouls fut *concentré* le lendemain & fréquemment *intermittent*, néanmoins les évacuations discontinuèrent; le pouls se *développe* au dix-septième jour, il survint une douleur vive entre les deux épaules; le pouls fut *pectoral*, le ventre resseré; la toux parut vers le dix-neuf, les crachats furent un peu cuits & assez abondans; le pouls se *roidit* & devint un peu *rebondissant* vers le vingt-un, & le malade cracha & moucha les jours suivans des matières ensanglantées; il resta bouffi & ne paroissoit pas bien jugé; on n'avoit cessé de faire couler le ventre par des apozèmes chargés de sels.

OBSERVATION CII.

Fièvre qui a pris par un frisson considérable, accompagné d'un violent mal à la tête, dans un jeune homme de forte constitution: le pouls est *re-*

bondissant vers le quatrième jour , il survient le lendemain un saignement de nez qui dure par intervalles quelques vers le septième : le pouls étant *rebondissant & serré comme stomachal*, il devient après l'effet d'un émétique, *inférieur* ; il est *irrégulier , intermittent* , le ventre coule abondamment les jours suivans , & vers le onzième le pouls se *releve* ; il est *plein , vigoureux* , assez *souple* , *redoublé* , *bien décidivement pectoral* , la toux est vive vers le quatorze , les crachats sont très-abondans & très-cuits jusques vers le vingt , & la maladie se termine.

Ce malade avoit été saigné trois fois , deux du bras & une du pied dans les trois premiers jours ; au sixième il avoit pris l'émétique qui avoit bien opéré , un léger purgatif au huitième suivi d'évacuations considérables & de bonne espèce ; le reste du tems il fut dans l'usage des remèdes propres à favoriser l'expectoration , & il fut repurgé à la fin de la maladie : la maladie fut traitée suivant les indications tirées du pouls.

OBSERVATION CIII.

Fièvre putride maligne avec saignement de nez dans les premiers jours ; le pouls demeure *rebondissant* après plusieurs saignées du pied ; il devient *inégal & intermittent* vers le septième ; le malade étant dans l'usage d'apozèmes aiguës par de l'émerique qui ne fit jamais vomir ; le ventre coule abondamment vers le dixième.

On sent évidemment deux espèces de pouls dans l'ordre suivant ; à quatre ou cinq pulsations bien *rebondissantes* succèdent cinq ou six pulsations *irrégulières, brusques, sautillantes, avec une ou deux intermittences*. Le pouls est donc en même temps *nasal & intestinal*, aussi est-il suivi du saignement de nez & du dévoiement qui durent par intervalles jusques vers le trentième ; la maladie fut très-mal jugée puisque le malade resta dans un état de langueur & une espèce de fièvre lente.

OBSERVATION CIV.

Erésipéle au visage avec fièvre considérable dans un jeune homme, saignement de nez vers le quatrième jour ; le pouls de *dur & rebondissant* qu'il étoit malgré trois saignées du pied , devient vers le sixième *inégal & très-sautillant & d'une fréquence assez variable*. Le malade qui avoit usé de quelques apozèmes légèrement purgatifs évacue beaucoup de bile ; les jours suivans les *rebondissemens* qui n'avoient pas entièrement cessé pendant ces évacuations , deviennent plus évidens , le pouls est plus *souple* ; plus *dilaté* ; vers le neuvième , la voix devient rauque , la toux survient , & vers le douze il y a en même tems un léger saignement de nez , une expectoration imparfaite & du dévoiement.

Pendant ce tems-là le pouls étoit composé dans cet ordre ; cinq ou six pulsations redoublées avec égalité & mollesse qui dénotoient le pouls *pectoral* ; elles étoient suivies de deux ou

trois rebondissemens brusques , durs & avec roideur de l'artere, qui marquoient le pouls nazal : venoient ensuite six ou sept pulsations inégales entr'elles , sautillantes , tremblantes , & il y en avoit de si peu apparentes qu'on avoit lieu de soupçonner des intermittences , ce qui caractérisoit le pouls intestinal. C'est dans cet ordre que le pouls toujours suivi par intervalles des évacuations propres à chaque espèce , se soutint jusques vers le vingt-septième ; la maladie n'étoit pas encore jugée.

CHAPITRE XX.

De la combinaison des différentes espèces de Pouls inférieurs avec diverses espèces de Pouls supérieurs.

PLUS on avance dans l'histoire du pouls composé , & plus on trouve des difficultés qui exigent une attention scrupuleuse de la part des Observateurs.

Les *combinaisons* qui ont été décrites dans le Chapitre précédent se présentent dans des maladies assez légères ; elles sont moins difficiles à reconnoître que celles dont il est question dans celui-ci , & qui regardent des maladies graves : il y aura encore plus de difficulté à bien tracer les *mélanges* des différentes espèces de pouls , dont il sera question dans la suite ; mais ces difficultés diminueront à proportion qu'on se formera l'habitude de faire des observations sur cette matière.

Les causes des variations & de l'instabilité du pouls , les changemens ou les suites qu'elles annoncent , la manière dont il faut les évaluer & les classer pour pénétrer dans les vûes ou dans la marche de la nature , toutes les questions importantes qu'on peut proposer sur cette matière ne sont pas de ce lieu.

On y trouvera seulement plusieurs histoires de maladies , dans lesquelles le pouls *simple* prend à différentes reprises , des caractères différens ; tantôt les pouls *inférieurs* précéderont

les *supérieurs* , & tantôt ces derniers feront suivis des premiers ; le pouls *stomachal* sera suivi du *pectoral* ; à celui-ci succédera le pouls *des urines* ou le *naçal* ; plusieurs espèces de pouls qui se combattent , pour ainsi dire , se feront sentir en même tems & seront mêlés l'un dans l'autre.

En un mot , on verra des exemples dans lesquels il seroit raisonnable de penser que la nature flotte dans une incertitude singulière , en faisant des efforts redoublés pour emporter les embarras qui se trouvent dans les différens organes ; tantôt elle semble vouloir déterminer la crise par plusieurs organes à la fois , tantôt elle en abandonne un pour s'attacher à un autre , qu'elle quitte ensuite pour revenir au premier qu'elle a entrepris de débarrasser.

Telle est en général la nature , la marche , la bizarrerie des phénomènes des maladies graves , difficiles à conduire à une fin heureuse , & qui ne sont que trop propres à faire échouer les méthodes de traitement qui paroissent les mieux justifiées.

Tous ces phénomènes deviennent ordinairement plus ou moins irréguliers , plus ou moins tumultueux selon la difficulté de la crise qui se prépare. C'est tout ce qu'on peut avancer ici sur cette matière : il faut se flatter que quelque observateur adroit & hardi parviendra un jour à applanir entièrement des difficultés que la suite de cet ouvrage pourra rendre moins considérables.

OBSERVATION CV.

Fièvre, toux, crachement de sang; douleur vive vers l'hypocondre gauche, le pouls est *convulsif* les trois premiers jours, il paroît se *développer* un peu après cinq saignées; au quatrième jour il devient *vis*, *brusque*, *irrégulier*, *stomachal*; un émétique placé d'après cette indication, procure un vomissement abondant; vers le sixième le pouls est *plein*, *redoublé*, *vigoureux*, *assez égal*; les crachats ne sont plus sanguinolens, ils deviennent épais les deux jours suivans.

Vers le neuvième jour le malade sentit tout d'un coup dans l'hypocondre gauche une espèce d'éclat qu'on peut regarder comme une prompte détente de quelques parties des intestins. Le pouls devient ensuite *inférieur, intestinal*, à pulsations *inéga-les, dures & arrondies* avec des *intermittences* : les crachats sont presque supprimés, le ventre coule abondamment à la suite d'un léger purgatif donné au onzième jour ; les évacuations durent naturellement jusques vers le treizième ; le pouls redevient *pētoral*, on trouve quelques *rebondissemens*, les crachats redeviennent sanguinolens ; il sort du nez beaucoup de matieres muqueuses légèrement teintes de sang, & vers le seizième le pouls étant *pētoral* bien décidé & bien fixe, les crachats sont cuits & viennent en abondance ; le malade entre en convalescence vers le vingt-cinq.

OBSERVATION CVI.

Le pouls est *vif, irrégulier, un peu*

arrondi , assez fréquent vers le quatrième jour , dans un malade qui a un vomissement spontané : ce vomissement fut suivi deux jours après d'une douleur sourde à l'hypocondre droit ; on fit deux saignées du bras ; le vomissement cessa , le pouls fut *moins dur* , *moins inégal* & parut se concentrer.

Le malade fut très-jaune vers le septième ; deux jours après le pouls se développe un peu, il est irrégulier, plus sautillant , il paroît annoncer un dévoiement , qui cependant ne vint que plusieurs jours après ; vers le onzième le pouls est *pectoral* & un peu rebondissant , il y a des crachats épais & abondans ; au quatorzième le pouls redevient *intestinal* ; & vers le vingtième il y a de copieuses évacuations qui terminent la jaunisse pour laquelle on avoit toujours continué l'usage des apozèmes plus ou moins purgatifs ; après ces évacuations le pouls est de nouveau *pectoral* ; le malade crache beaucoup jusques vers le trente , & la maladie ne paroît pas bien jugée.

OBSERVATION CVII.

Erépipéle au visage avec fièvre considérable dans un jeune homme de forte constitution. Le pouls ne se *développe* que foiblement vers le quatrième jour après cinq saignées; on sent de tems en tems dans l'artère quelques *rebondissemens* bien marqués; il y a aussi plusieurs pulsations un peu *arrondies* dans lesquelles l'artère *paroît trembloter*, mais avec une *roideur remarquable*, & le malade a de fréquentes envies de vomir; on lui donne l'émétique le sixième; le soir de ce jour-là le pouls est après un vomissement abondant, *plus fort, plus développé, rebondissant presque de trois en trois pulsations*; le malade saigne du nez la nuit suivante; ce saignement dura quelques jours & fut en diminuant, ainsi que le *rebondissement*. Pendant ce tems-là le pouls devint *sautillant, irrégulier, avec quelques intermissions*; il y eut des *grouillemens* considérables, la bile coula abondamment à la suite d'un léger

purgatif; les apozèmes laxatifs que le malade vomissoit avant que le pouls fut devenu *intestinal*, passèrent aisément & entretenirent l'écoulement de la bile; vers le dix-huit, le pouls qui n'avoit cessé d'être un peu *rebondissant* de tems en tems, devient *égal*, *mol*, *redoublé*, *peñtoral*: toutes les évacuations cessent, excepté l'expectoration qui fut fort abondante. Il y a pendant cette expectoration quelques changemens dans le pouls, qui dénotent le pouls *de la sueur*, aussi vient-elle toutes les nuits, & elle dure, ainsi que l'expectoration, jusqu'au vingt-huit; le malade se flatte d'être en convalescence; le malade paroît cependant mal jugée.

OBSERVATION CVIII.

Fièvre aiguë avec une disposition inflammatoire dans le bas-ventre: le pouls est les premiers jours *petit*, *concentré*, fort *convulsif*. Il se développe vers le sixième après plusieurs saignées; bientôt il devient *irrégulier* avec quelques *intermittences*, c'est-à-

dire, *intestinal*. Il y a des pulsations brusques, un peu arrondies, tremblotantes, ce qui constitue le pouls propre à l'effort de l'estomac : le pouls se soutient dans cet état à peu près jusqu'au neuvième ; le malade vomit les remèdes appropriés qu'on lui donne ; vers le dix on trouve quelques pulsations fortes, pleines, redoublées, c'est-à-dire, un commencement de pouls *pectoral*, néanmoins le vomissement continue, ainsi que le pouls qui lui est propre & qu'on découvre dans les intervalles du *pectoral* & de l'*intestinal* ; les évacuations critiques du ventre paroissent vers le quatorzième ; les jours suivans il y a des crachats épais, un peu cuits ; mais il reste toujours dans le pouls une certaine roideur, un caractère d'irritation qui indique que l'estomac est encore dans un état d'effort ; il survient vers le dix-huit un vomissement spontané dans l'effet d'un purgatif très-doux, & jusqu'au vingt le malade vomit à cinq ou six reprises ; du vingt au trente le pouls demeura tendu, concentré, non critique ; le malade se trouva pen-

dans

dant ce tems-là dans un état d'abattement qui faisoit voir que la maladie n'étoit pas bien jugée.

OBSERVATION CIX.

Rhume négligé dans un jeune homme bien constitué ; les crachats sont abondans , le pouls est *plein , redoublé , pectoral* ; le malade mange & boit beaucoup malgré cet état ; il a une indigestion suivie d'un vomissement qui dure pendant deux jours à différentes reprises ; le pouls est durant le vomissement & jusqu'au quatrième jour de l'indigestion , *serré , irrégulier , tremblotant , inégal* , c'est-à-dire ; *stomachal*. Il se développe ensuite & il devient vers le sixième jour *intermittent , irrégulier , intestinal* : on y trouve des pulsations du pouls *pectoral* ; il y en a qui semblent *décliner par gradations* à la maniere du pouls *des urines* ; le malade à qui on avoit donné beaucoup de potion huileuse a des évacuations bilieuses assez considérables vers le neuvième , & en même tems les urines coulent en gran-

de quantité ; on donna alors un léger purgatif qui purgea très-bien : les jours suivans le pouls redevint *pectoral* & l'expectoration se rétablit. Il y a cependant dans le pouls , quoique *pectoral* , un caractère d'irritation qui fait soupçonner une suppuration dans la poitrine , les crachats deviennent en effet *puriformes* , & le malade tombe en fièvre lente peu de tems après.

OBSERVATION CX.

Fièvre & douleur habituelle au rein droit à la suite d'une suppuration dans cette partie. Le malade mange pendant quelques jours plus qu'à son ordinaire ; la fièvre augmente considérablement , le pouls est *très-serré & très-vif* les premiers jours ; il se *développe* après quatre saignées ; il devient ensuite *intermittent* & en même tems *pectoral* : il y eut des évacuations abondantes par l'effet de deux onces de manne données le septième ; & vers le neuvième , il eut de la toux qui fut suivie de quelques crachats assez épais ; les urines sont en petite

quantité ; la douleur du rein se réveille vers le onzième ; le pouls devient un peu plus *vif*, *serré*, *irrégulier*, & il y a des pulsations qui ont l'espèce de *déclin* propre au pouls des *urines* ; elles coulent très-abondamment vers le quatorzième, elles sont chargées d'une matière *purulente*, & le malade rentre dans son état habituel, excepté que le fonds de fièvre demeure plus considérable.

CHAPITRE XXI.

Du pouls des règles & des hémorrhoides, combiné avec celui des autres hémorrhagies, & principalement avec le nasal.

ON a déjà vû que le *rebondissement* fait le principal caractère des différens pouls qui précèdent les hémorrhagies (1) ; cette vérité trouvera un nouvel appui dans les remarques suivantes.

(1) Chap. 14.

Le rapport des vaisseaux veineux de l'intérieur des narines, avec ceux des viscères du bas-ventre, est démontré par les observations journalières des Praticiens : on peut avancer que la découverte de la circulation du sang a fait trop négliger l'attention particulière que méritoit ce rapport ; la découverte de la circulation est une lumière éclatante, qui paroît avoir plus ébloui qu'elle n'a éclairé ; la plupart des Modernes, fondés sur une vérité aussi bien établie, ont cru qu'ils ne devoient rien admettre que ce qui se trouveroit conforme à cette vérité ; toujours prévenus contre les opinions de la vieille Médecine, ils ont rigoureusement mis à l'écart tout ce que les loix de la circulation n'embrassoient pas.

Stahl & ses Disciples, pleins de leur système de *l'ame ouvrière* de routes les fonctions, se sont placés entre les Anciens & les Modernes ; ils croyoient peut-être que les loix de la circulation pourroient soustraire la marche des liqueurs aux conséquences de leur théorie ; c'est pourquoi

ils se sont particulièrement attachés à recueillir & à faire valoir tous les faits qu'ils ont jugés propres à infirmer les loix connues de la circulation.

Si on faisoit une exacte comparaison des observations des Anciens sur cette matière , avec les conséquences qui suivent nécessairement de la théorie des Modernes , on ne manqueroit ni de raisonnemens , ni de faits d'Anatomie & de Pratique , pour former contre cette théorie des difficultés très-considérables.

En effet , s'il est vrai qu'il y ait entre les extrémités des artères & celles des veines , des vaisseaux de communication , ou plutôt que ces extrémités qui se joignent les unes aux autres , fassent tantôt la fonction d'artère , tantôt celle de veine ; c'est - à - dire que les humeurs s'y meuvent suivant des déterminations particulières des oscillations , on aura tout d'un coup une très - grande quantité de vaisseaux , dans lesquels les mouvemens progressifs des humeurs ne suivent pas toujours les loix ordinaires de la circulation.

Si on fait ensuite attention au grand nombre d'anastomoses, ou de branches de communications qui se trouvent entre les différens vaisseaux, tant artériels que veineux, & qu'on suppose, comme cela paroît naturel, que ces anastomoses ne peuvent servir qu'à fournir aux humeurs des routes pour aller & venir, *fluer & refluer*, on soustraira encore une très-grande quantité de vaisseaux aux mêmes loix de la circulation.

Enfin, si tout le *tissu muqueux*, ou la substance cellulaire n'est qu'un corps homogène, *gélatineux*, plus ou moins épais, partagé en une très-grande quantité de petites couches concentriques & excentriques, & qui n'est dans le fond que le même *corps muqueux* que les Chymistes trouvent fort abondant dans les Plantes, dont les animaux se nourrissent; si ce *tissu muqueux* dépourvu de vaisseaux & même de fibres, proprement dites, est disposé & étendu dans les animaux, de manière que les liqueurs qu'il contient puissent y être mues en tout sens; il faudroit convenir encore

que les loix de la circulation n'ont pas lieu dans le *tissu muqueux* ou cellulaire, qui fait à lui seul au moins la moitié du volume du corps.

Or, diroient les Partisans des opinions & des observations des Anciens, la plûpart des changemens dans les maladies, les stagnations des humeurs, les œdèmes, les échimoses, les inflammations, les gangrenes, les suppurations, les cicatrices, les obstructions, les métastases, les *flux séreux*, les *flux muqueux*, les révolutions dans les mouvemens de la matière de la transpiration, les résolutions des tumeurs; tous ces changemens qui sont des causes ou des effets de la plûpart des maladies, ont précisément leur siège dans le *tissu muqueux* ou cellulaire, dans ces derniers vaisseaux qui joignent les veines aux artères, dans les vaisseaux infinis, formés par les communications des vaisseaux qui font les anastomoses.

On ne sauroit déduire aucun de ces changemens des seules loix de la circulation. Rivière n'auroit donc pas si mal-rencontré, en jugeant de ce qui

lui étoit connu de la circulation, que cette découverte ne sauroit être d'une certaine utilité dans la pratique de l'Art.

Il seroit par conséquent bien difficile de condamner légitimement ceux des Modernes, qui ont sù se tirer de la foule des Auteurs acharnés à dépriser les Anciens, à cause de l'ignorance où ils étoient de la circulation, & ne regarder cette circulation que comme un fait particulier de Physiologie.

En ne jugeant Hippocrate que comme Anatomiste, on ne pourroit, à la lecture du Chapitre cinquième de son Livre de la *Nature humaine*, que perdre beaucoup de la vénération qu'on a pour lui; cette distribution des vaisseaux par laquelle il veut établir des communications entre la tête, le tronc & les extrémités, n'est, telle qu'il la dépeint, qu'une pure fiction.

Mais en ne considérant Hippocrate que comme observateur, cette fiction même devient, comme bien d'autres endroits de ses ouvrages, compara-

ble à ces antiques qui expriment la Nature avec tant de force & de vérité.

Lorsqu'Hippocrate imagina cette distribution des vaisseaux, c'étoit sans doute d'après des récits de ces mélancholiques sujets aux hémorrhoides. Il est probable qu'ils disoient alors comme aujourd'hui, qu'ils sentent le sang monter des entrailles à la tête avec une sorte de véhémence, qu'ils le sentent s'arrêter dans les lombes, monter ensuite le long de l'épine du dos jusqu'à la tête, & aller former un embarras qui les met comme dans une espèce d'yvresse; d'autres fois ils croient sentir la tête qui se débarrasse, & le sang retourner le long de l'épine du dos droit aux vaisseaux hémorrhoidaux, & y produire le flux critique dont ils se sentent si soulagés.

Ces phénomènes ne sont déduits aujourd'hui que des désordres des oscillations nerveuses qui en sont, il est vrai, la principale cause déterminante; mais le désordre de ces oscillations n'explique pas suffisamment l'inégalité de la distribution du sang

en ces momens - là : ce n'est qu'en considérant l'union des veines de la tête & du tronc, avec le sinus de la tête & de l'épine, qu'on peut parvenir à concevoir clairement les raisons de ces phénomènes.

Il résulte de toutes ces remarques qu'en rapprochant les faits qui en font l'objet, & en cherchant à les ramener à des loix, dont ils puissent dépendre, il faut nécessairement considérer le *système veineux*, ou l'ensemble de toutes les veines, comme étant particulièrement assujéti aux oscillations nerveuses, & faisant un corps à part, un organe particulier, qui a des mouvemens propres & variés, suivant les circonstances.

Ces réflexions seront justifiées par la plûpart des Observations rapportées dans la suite de ce Chapitre.

OBSERVATION CXI.

Un jeune homme bilieux, sec & mélancholique, sujet au flux hémorrhoidal, en a le pressentiment par une espèce d'accablement général, où

il se trouve quelque-tems avant que ce flux arrive ; cet accablement est promptement suivi d'une violente douleur de tête, qui ne cesse que par l'écoulement du sang hémorrhoidal & par un léger saignement de nez, qui termine ordinairement l'attaque d'hémorrhoides.

Le pouls, deux ou trois jours avant la détermination du flux hémorrhoidal, se trouve élevé, fréquent, irrégulier, avec quelques rebondissemens évidens ; l'élevation n'est jamais complete : on sent toujours une dureté particulière de l'artère ; l'irrégularité n'est pas aussi marquée que dans le pouls qui annonce le dévoiement ; c'est-à dire que l'artère ne fait point de petits sauts brusques, & sort différens des diastoles ordinaires. Ce pouls tient évidemment du pouls inférieur, & semble composé de toutes les espèces de pouls de cette classe ; aussi les entrailles sont-elles dans un mouvement considérable ; & cet orage finit par le flux hémorrhoidal.

A proportion que le flux vient à son déclin, le pouls s'élève, il de-

vient *supérieur*, les *rebondissemens* sont fréquens, & le saignement de nez succède à ces phénomènes; après quoi le pouls reprend son *égalité* & sa *souplesse* naturelle; il y reste pourtant toujours une *contriction* particulière avec un peu d'*irrégularité*. Il y a donc dans les paroxysmes, dont il est question, un *mélange* du pouls *inférieur* & *supérieur*, savoir du pouls des *hémorrhoides* avec le nasal.

OBSERVATION CXII.

Un vieillard sujet aux hémorrhoides avoit dans une attaque le pouls *dur*, *inégal*, *fréquent*, *assez dilaté*, quoique *trémblotant*, avec quelques *rebondissemens légers*; un violent mouvement de colère qui fut suivi de beaucoup d'efforts inutiles pour vomir, rendit d'abord le pouls plus *petit*, plus *vis*, moins *inégal*; le flux hémorrhoidal cessa; deux jours après le pouls devint *très-fort* & *rebondissant* à chaque *pulsation*; ce fut le prélude d'une attaque de phrénésie qui arriva peu de tems après, pendant laquelle il for-

toit quelquefois un peu de sang du nez ; ce qui paroissoit de bon augure aux assistans, parcequ'ils prétendoient avoir vû le malade presque toujours saigner du nez , sur la fin de ses attaques d'hémorrhoides. Il ne fut pas possible de rétablir l'écoulement des hémorrhoides , ni de le suppléer par une grande quantité de saignées & par d'autres remèdes qu'on fit en très-peu de tems ; le malade mourut d'apoplexie.

OBSERVATION CXIII.

Une fille âgée de vingt-cinq ans ; assez bien réglée quant au tems périodique , n'a presque jamais ses règles qu'elles ne soient précédées ou suivies d'un saignement de nez. Le pouls devient toujours dans ce tems-là *dur* , *tremblotant*, *irrégulier*, *fréquent*, & *rebondissant* ; moins il y a de *rebondissemens* , & moins la malade saigne du nez ; si les *rebondissemens* prennent le dessus, presque toute la crise ou l'évacuation se passe en saignement de nez.

OBSERVATION CXIV.

Une jeune fille qui n'est pas encore réglée, est sujette à de fréquens saignemens de nez ; le pouls est pendant ce tems-là *plein, fort & rebondissant*, il tient même habituellement de ce caractère ; les règles ayant enfin paru, le pouls est devenu moins *fort*, plus *inégal*, avec des *rebondissemens fréquens*. Il y a eu pendant les premiers mois des règles, plus ou moins de saignement de nez selon qu'elles étoient plus ou moins abondantes ; quelques mois après les saignemens n'ont pas reparu, & le pouls qui annonce les règles, n'est plus que légèrement *rebondissant, dur, irrégulier*.

OBSERVATION CXV.

Une femme sujette les premiers mois de ses grossesses à des saignemens de nez, & à de légères apparitions des règles au tems périodique, avoit dans cet état le pouls *dur, irrégulier, fort, rebondissant*, ce qui fai-

soit craindre une perte considérable. Deux saignées du bras , suivies néanmoins d'un saignement de nez , rendirent le pouls *souple* & moins *inégal* ; les accidens disparurent.

OBSERVATION CXVI.

Une fille qui est arrivée au tems de perdre ses règles , a tous les mois le pouls *irrégulier* , *vif* , *dur* , avec des *rebondissemens assez fréquens* ; à peine les règles paroissent-elles ; mais il y a constamment dans ce tems-là un enchiiffrement considérable qui finit par une excrétion abondante de matieres muqueuses & sanguinolentes. Il arrive de tems en tems que le pouls est *intermittent* pendant ces révolutions , & alors il se joint un dévoyement aux autres évacuations.

OBSERVATION CXVII.

On trouve très-souvent des filles & des femmes dans lesquelles le dévoyement suit , accompagne ou précède l'évacuation des règles ; & il est

fort ordinaire que si ces femmes n'ont point de maladies habituelles , leur pouls soit *composé* pendant la révolution des règles , *du pouls de la matrice & de l'intestinal* ; c'est-à-dire , qu'il est *irrégulier*, avec des *sursauts de l'artère*, fort *inégal*, tant à raison de la force des pulsations , qu'à raison des distances qui se trouvent entr'elles ; il y a outre cela quelques rebondissemens & de légères intermittences, ou ce qui est plus fréquent, des pulsations si foibles, qu'elles sont presque insensibles.

Le pouls est *compliqué* ou *composé* à peu-près de la même manière dans les flux hémorroïdaux joints au dévoiement ; on l'a souvent trouvé disposé de manière que le pouls propre aux hémorroïdes étoit le prédominant , & alors la perte de sang duroit pendant quelques jours , & l'évacuation de la bile lui succédoit ; l'évacuation du sang suspendoit celle de la bile ; c'est un fait utile à sçavoir dans le traitement des fièvres compliquées avec le flux hémorroïdal , & même avec toute autre perte de sang : en général les pertes de sang suspendent

les évacuations critiques bilieuses, & même la marche critique de toute fièvre : ne pourroit-on pas faire quelque application de cette observation à la théorie des saignées ?

OBSERVATION CXVIII.

Un vieux homme sujet à des hémorrhagies presque périodiques par les voies des urines, a constamment lorsque le tems de l'hémorrhagie approche, le pouls *inégal, roide, irrégulier avec quelques rebondissemens fort inégaux*, & il y a fréquemment des *especes de petits sautillemens de l'artere*. Cette révolution dans le pouls, est suivie d'une évacuation abondante de sang en rendant les urines.

OBSERVATION CXIX.

Un malade qui eut pendant plusieurs jours de vives douleurs dans la région du rein droit, avoit le pouls *fort vif & convulsif*; il se développa un peu, il devint *irrégulier avec quelques légers rebondissemens* : ce qui désignoit

naturellement le flux hémorrhoidal ; mais le malade pissa du sang abondamment pendant quelques jours , probablement par une suite de la vive douleur du rein qui déterminâ l'hémorrhagie dans le rein même.

OBSERVATION CXX.

Pissement de sang abondant depuis trois jours dans un mélancholique naturellement disposé aux hémorrhoides ; le pouls est *inférieur, assez dilaté, irrégulier* , il y a quelques *rebondissemens, mais ils sont éloignés l'un de l'autre* ; ce malade avoit le dévoyement avant cette hémorrhagie , il a cessé depuis qu'elle a paru , & les *rebondissemens* qui n'existoient pas pendant le dévoyement , se sont montrés avec l'hémorrhagie.

OBSERVATION CXXI.

Une vieille fille très-mal réglée est sujette presque tous les mois à une hémopthisie considérable, qui est précédée d'une chaleur vive à la poitrine.

Cette hémorrhagie paroît tenir lieu des règles. *Le pouls est avant & pendant le crachement de sang assez irrégulier, mais très-tendant au nasal, avec des rebondissemens un peu plus mols, plus dilatés que ceux qui annoncent le saignement de nez.*

OBSERVATION CXXII.

Une fille avoit à la jambe un ulcère variqueux, duquel il sortoit beaucoup de sang chaque mois, comme si les règles qui ne venoient pas par les voies ordinaires avoient passé par cet ulcère. Elle sentoît avant cette hémorrhagie tous les avant-coureurs des règles. *Le pouls devenoit vif, irrégulier, inégal, avec quelques légers rebondissemens, & un tremblement de l'artère.*

CHAPITRE XXII.

Du Pouls de la sueur combiné, avec les autres espèces de pouls critiques.

HIPPOCRATE a prononcé que toute crise doit être universelle (1); seroit-ce

(1) Prognostic, sect. 3.

qu'il n'y a de crise parfaite que celle qui se fait en même tems par tous les émonctoires du corps?

Cette décision d'Hippocrate prise en ce sens-là n'est pas sans fondement, puisqu'on a quelquefois observé de ces crises *universelles*; mais ces observations sont si rares, & les crises favorables par des couloirs particuliers si communes, que la remarque d'Hippocrate est bien éloignée de pouvoir faire une loi générale.

On verra dans une des observations suivantes (2), l'exemple d'une maladie grave qui se termine heureusement par une crise *universelle*, avec ceci de remarquable que cette crise s'est faite en même tems par tous les couloirs du corps, & non successivement, à la maniere des espèces de crises *générales* qu'il n'est pas rare d'observer, connues sans doute à Hippocrate.

S'il étoit vrai qu'une évacuation critique faite en même tems par tous les couloirs, fût un événement auquel

on peut ordinairement s'attendre, on en pourroit conclure que le traitement des maladies doit uniquement être dirigé, de manière à favoriser une évacuation par quelque couloir que ce puisse être; les Médecins qui ne penseroient pas qu'on dût compter sur des crises, & qui se proposeroient toujours de les prévenir, ou de les empêcher, pourroient établir leur méthode là-dessus.

S'il est vérifié, au contraire, qu'une évacuation critique faite en même-tems par tous les couloirs, soit un phénomène rare, il s'ensuit que la nature détermine ordinairement les crises par quelques couloirs particuliers; un Médecin est donc assujetti à seconder les mouvemens de la nature, c'est-à-dire, à favoriser, autant qu'il est possible, la *fonction excrétoire* des couloirs vers lesquels la crise paroît se déterminer; le choix des méthodes de traitement devroit donc être déterminé suivant des vûes, & avec des précautions qu'il ne faudroit point attendre de ceux qui regarderoient les crises comme étant toujours

universelles, & encore moins de ceux qui n'en admettroient point.

C'est dans les femmes en couche, qu'on trouve de fréquens exemples des crises qui approchent le plus d'une crise *universelle*: une femme qui vient d'accoucher est dans un état qui peut devenir en fort peu de tems la cause d'une maladie très-grave; il se fait alors une espèce de bouleversement général d'autant plus dangereux qu'il est plus prompt: lorsque le cours de cette révolution ne trouve point d'obstacle, elle détermine aisément les évacuations critiques.

Si la nature suffit seule à une crise aussi considérable, & aussi *compliquée*, que n'est-on point en droit d'attendre d'elle dans toutes les maladies dans lesquelles les symptômes ne sont pas dans le fond plus graves que ceux d'une couche? & combien ne trouveroit-on pas de maladies qui pourroient être mises dans cette classe!

OBSERVATION CXXIII.

Fièvre continue avec des redouble-

mens dans un jeune homme assez bien constitué ; le pouls a été *rebondissant* vers le sixième jour , & le malade a saigné du nez à diverses reprises pendant trois jours ; le pouls est ensuite devenu *pectoral*, & les crachats ont été assez cuits & abondans vers le neuvième ; il est survenu alors une variation prompte & spontanée dans le pouls , il est devenu *inférieur*, *sautillant*, *intermittent*, & le ventre a coulé abondamment jusqu'au quatorzième. Enfin il a paru dans le pouls des *inégalités* ou des *élévations graduées* qui annoncent la sueur , & le malade a sué abondamment vers le seize : toutes ces évacuations se sont succédées dans cet ordre jusques vers le vingtième : & alors elles commencent à se faire ensemble , ou en se suivant à de forts petits intervalles ; aussi observe t-on dans le pouls les signes propres à toutes ces crises , selon qu'elles se trouvent plus ou moins déterminées. Cet état continue pendant cinq ou six jours sans que les forces du malade en paroissent plus abattues ; le pouls se rétablit ensuite , dans cet état de *sou* :

plèssè , d'égalité & de douceur qui annonce la convalescence ; & en effet la maladie fut heureusement terminée vers le vingt-fixième jour.

OBSERVATION CXXIV.

Le pouls est *convulsif* six heures après les couches dans une jeune femme très-bien constituée ; dès le lendemain le pouls est *développé , irrégulier , avec de légers rebondissemens* ; la perte vient abondamment : au troisième jour le pouls qui a paru se *ser-rer & se durcir* pendant quelques heures, est devenu *supérieur* ; le sang monte beaucoup à la tête , les mamelles s'engorgent prodigieusement, le pouls *se ramollit vers le quatrième , il est ondulant avec des inégalités dans les pulsations* , la sueur est abondante. Le pouls se concentre du cinq au six , il devient *irrégulier , inégal* , avec quelques légères *intermittences* , il est *intestinal* bien décidé ; aussi est-il promptement suivi de copieuses évacuations bilieuses. Le pouls se rétablit ensuite dans l'état ordinaire aux femmes en couche.

OBSERVATION CXXV.

Le pouls est au quatrième jour d'une couche, *développé, fréquent, un peu dur, inégal*, dans l'ordre suivant : on sent des pulsations où il y a des *rebondissemens marqués* : il y en a qui sont *inégaux entre elles & séparées par quelques légères intermittences* ; d'autres sont combinées de manière qu'elles vont de l'une à l'autre en diminuant jusqu'au point d'être insensibles ; le pouls se relève ensuite avec une gradation marquée dans quelques pulsations ; les rebondissemens paroissent de nouveau & sont suivis des autres pouls dans l'ordre qu'on vient de décrire. Cette femme sue beaucoup, la perte est abondante, les mamelles sont gonflées & douloureuses, les urines sont laiteuses, les évacuations sont bilieuses, & le pouls reprend son état naturel vers le neuvième jour de la couche.

On aura souvent lieu d'éprouver dans les femmes en couche que les évacuations suivent constamment les changemens du pouls, qui ne manque

presque jamais de prendre toutes les formes propres à chaque évacuation critique. Tantôt toutes ces modifications se présentent ensemble, c'est-à-dire, dans un très-court espace de tems, tantôt elles se succèdent dans les différens jours de la couche.

Il y a pourtant des exceptions à faire dans les femmes attaquées de maladies *nerveuses*, ou d'autres maladies habituelles, parce qu'alors l'état du pouls résultant de ces maladies, prévaut sur les déterminations de l'effort critique qui se fait dans les suites des couches. Tout cela regarde l'histoire des pouls *compliqués* avec le pouls d'*irritation* (1).

OBSERVATION CXXVI.

Fluxion de poitrine : les crachats sont abondans & bien cuits vers le septième jour ; le malade sue beaucoup, le pouls est en même tems *pectoral* & *élevé par gradations*.

Vers le onzième jour d'une fièvre

(1) Voyez Chap. 23, 24, &c.

double tierce continue , & après des purgatifs qui avoient été suivis de copieuses évacuations, le pouls d'*intestinal* qu'il étoit , devient *supérieur* , *ondulant* , *élevé par gradations* , c'est-à-dire , *pouls de sueur* ; le malade sue très-abondamment jusqu'au quatorzième. Alors le pouls qui avoit été *pectoral* dès les premiers jours , le devient plus décisivement , le malade crache vers le seizième & le vingtième des crachats bien cuits.

Il faut remarquer qu'il n'est question dans toutes ces observations que des *sueurs critiques* qu'on doit bien se garder de confondre avec les *sueurs symptomatiques*.

CHAPITRE XXIII.

Du Pouls d'irritation ou non critique.

C'EST toujours un grand bien que le pouls se *développe* dans une maladie ; c'est un grand mal , au contraire , qu'au lieu de se *développer* , il se

resserre & se concentre : on a suivi jusqu'ici les effets heureux du *développement* du pouls ; ils ont pre. que toujours lieu dans des maladies simples & bénignes , que la nature aidée au besoin des secours de l'art , parvient à vaincre assez facilement.

Ces effets ne sont , en général , que des évacuations bien critiques , précédées & accompagnées de l'espèce de pouls qui leur est propre ; condition d'autant plus nécessaire pour les crises favorables , qu'on a souvent observé que les évacuations les plus complètes en apparence , se trouvoient peu critiques dans l'événement , lorsqu'elles n'étoient ni précédées , ni accompagnées de leur espèce particulière de pouls.

On entreprend ici l'examen des effets funestes qui accompagnent ou qui suivent le *resserrement* , & l'*état convulsif* du pouls : on va voir des crises manquées , des *restes de crises* qui causent souvent des *récidives* (1) , des bouleversemens dans le corps à

(1) Hipp. Aphor. 12. sect. 2.

la suite des évacuations imparfaites , ou procurées mal-à-propos , des viscères délabrés par des suppurations inévitables , la gangrène des différentes parties , des affections incurables dans les viscères , des tumeurs , des callosités , des cicatrices , l'atonie des organes ; effets fâcheux qui sont la source des maladies chroniques presque toujours incurables.

Le pouls d'*irritation* est , comme on l'a déjà dit (1) , *serré , fréquent , concentré , assez dur* , il s'oppose à ce qu'on appelle la *coction* dans les maladies ; ou , pour mieux dire , aux évacuations critiques qui les terminent heureusement ; quelquefois même il efface les espèces particulières de pouls critique avec lesquelles il se *complique* , de manière qu'elles en deviennent presque méconnoissables.

La *coction* d'une maladie , ou , si l'on veut , de la matière de cette maladie , qui a été tant célébrée par les Anciens , n'est dans le fond qu'un effort général propre à surmonter les

(1) Voyez Chap. 3.

obstacles qui empêchent l'action libre des vaisseaux & les fonctions des organes excrétoires. Le pouls *d'irritation* qui suppose des embarras ou des obstacles considérables, est opposé au mécanisme de la *coction*, & par conséquent c'est un signe presque toujours certain que la *coction* n'a pas lieu.

Une plaie faite dans une partie sensible, va changer le pouls naturel en pouls *d'irritation*; une passion vive, la peur, le chagrin, la joie, une surprise quelconque produisent des effets à-peu-près semblables: les commencemens & les frissons des fièvres sont encore des causes fréquentes du pouls *convulsif*: les accès de goutte & de colique, les douleurs de l'enfantement, l'action des vomitifs & des autres remèdes sont immédiatement suivis du *resserrement*, de la *concentration* & de la *convulsion* du pouls.

Ce pouls *non critique* accompagne, & même il caractérise souvent la plupart des fièvres malignes les plus dangereuses; on le trouve aussi dans beaucoup de maladies chroniques, ainsi

que dans les derniers tems des maladies mortelles , ou mal jugées.

On comprend bien que ce pouls doit avoir différens degrés , même quelques caractères particuliers selon la nature des maladies qui le produisent ; & ces différences n'échappent pas à un tact exercé. Il y a même lieu de soupçonner que le pouls *d'irritation* a encore des caractères distinctifs , selon qu'il se trouve joint à des affections de la tête , de la poitrine , ou du bas ventre.

Mais on ne considère ici que le pouls *d'irritation* , en général , & autant qu'il le faut pour le bien distinguer de toutes les espèces de pouls *critique* , avec lesquelles il se trouve souvent *compliqué* ; l'analyse de cette espèce de pouls , & l'examen suivi de ses variations fournira sans doute un jour matière à des observations bien intéressantes.

Le pouls *d'irritation* est , ainsi que le pouls *critique* , produit par l'*action nerveuse* ; elle est bien déterminée , bien dirigée dans toutes les espèces de pouls *critique* , elle est *brusque* ,

incertaine , irrégulière dans le pouls d'irritation ou non critique.

Il y a souvent avec le pouls *non critique* des évacuations de toute espèce , quelquefois même fort abondantes ; ce sont des excréctions faites sans *coction* , c'est-à-dire , par expression , par la convulsion des organes : il est fort rare qu'elles puissent être salutaires ; il n'y a pas de plus grand objet d'attention pour les Praticiens , que de ne pas les confondre avec les excréctions *critiques* , précédées & accompagnées du pouls qui leur est propre.

La différence de ces évacuations *critiques* ou *non critiques*, n'avoit pas échappé au génie observateur d'Hippocrate : » Dans les diarrhées & les » vomissemens qui arrivent d'eux- » mêmes , si l'évacuation se fait des » humeurs qu'il faut purger , les ma- » lades s'en trouvent bien , & la sup- » portent aisément, sinon, ils la souffrent avec peine ; il en est de même des évacuations qui se font par les vaisseaux , si l'évacuation se fait comme il convient , les malades

75 s'en trouvent bien , & ils la sup-
 77 portent avec facilité , sinon le con-
 79 traire arrive ; il faut donc avoir
 81 égard à la région , au tems , à l'âge ,
 83 & aux maladies auxquelles elle con-
 85 vient , & à celles auxquelles elle
 87 ne convient pas (1).

Ces observations sont des vérités
 fondamentales & élémentaires de
 l'art ; elles font sentir la différence
 qu'il faut mettre entre les évacua-
 tions *symptomatiques* & les *critiques* ;
 dans les premières le pouls est *oppres-*
sé & n'annonce rien de favorable ;
 dans les autres il est , & demeure
 pendant un certain tems , *développé*
ou excréteur ; il annonce la supério-
 rité des forces de la nature.

(1) Hipp. aphor. 2. sect. 1.



CHAPITRE XXIV.

*Du Pouls d'irritation compliqué avec
le Pouls critique.*

LE pouls *d'irritation* n'est pas toujours funeste, ou pour mieux dire, il ne l'est que par sa durée; s'il ne subsiste que pendant le premier tems des maladies, qui est plus ou moins long, selon la nature & le degré de ces mêmes maladies, si le pouls se *développe* ensuite, & qu'il n'y ait point des marques *d'irritation*, pendant le tems du *développement*, cet état est ordinairement peu à craindre : c'est celui qu'on trouve dans beaucoup de maladies qui guérissent assez bien. Le pouls *d'irritation* devient, au contraire, fort dangereux à mesure qu'en s'étendant au-delà du premier tems des maladies, il empêche la *coction* & les évacuations critiques; on ne peut guère s'attendre alors qu'à des événemens fâcheux.

Ce même pouls *d'irritation* peut

cependant subsister pendant tous les tems d'une maladie , sans être au point d'apporter un obstacle invincible aux mouvemens des crises , & aux changemens qui les précèdent : c'est alors que se *comploquent* entr'eux le pouls *critique* & le *non-critique*.

On voit aisément , que les maladies dans lesquelles se trouve cette *complication* , doivent être d'un événement douteux , & qu'il faut juger de leur terminaison , selon que le pouls *critique* ou le *non-critique* prévalent plus ou moins l'un sur l'autre.

Voici , à peu-près , la marche du pou's dans cette *complication* ; il est *ferré* , *convulsif* dans deux ou trois ou plusieurs pulsations ; *développé* , même *excréteur* dans quelques autres , & quelquefois la *convulsion* se fait sentir assez évidemment dans les mêmes pulsations qui paroissent se *développer* , ou qui annoncent quelque évacuation critique ; mais il arrive aussi que quand le pouls *convulsif* subsiste éminemment pendant tous

les tems d'une maladie , ce pouls change tout d'un coup , & ne se montre presque que sous l'apparence du pouls *naturel* , ou de quelques espèces de pouls *critique* , qui ne se soustiennent point pendant un certain tems ; alors la maladie est très - dangereuse.

Ce phénomène ne doit être attribué qu'à un affaïssement mortel qui commence à se faire dans quelque partie du corps. Le pouls *d'irritation* n'en existe pas moins dans le fonds en ce moment ; c'est le dernier & le plus fâcheux degré de la *complication* avec le pouls *critique*. Examinons ici un point fort important.

Les Médecins ont été de tout tems fort partagés sur la vérité & l'application de ces fameux apophthegmes d'Hippocrate , par lesquels il subordonne absolument les vûes de l'art aux mouvemens de la nature ; il dit en plusieurs endroits , qu'*il faut que le Médecin suive la nature , & porte ses vûes précisément au même but qu'elle ; que le Médecin n'est que le Ministre de la nature , & que c'est elle qui guérit les maladies.*

Ceux qui, parmi les Anciens & les Modernes, ont été contraires à la décision d'Hippocrate, ont prétendu qu'il étoit dangereux de se fier à la nature, que par conséquent il faut *éviter les crises, les empêcher, ou chercher à les déterminer suivant qu'on le trouve convenable* ; il faut, continuent-ils, *diriger la nature, & regarder toujours la fièvre & les autres maladies comme un état directement opposé au principe vital.*

Les Partisans de cette opinion accorderoient, tout au plus, à ceux d'Hippocrate, que les incommodités légères, les maladies simples & bénignes, peuvent guérir aussi-bien par le secours de la nature que par celui de l'art : mais dans les maladies graves & compliquées, où les forces de la nature paroissent totalement *déconcertées*, puisqu'il n'y a aucune marque de *coction*, convient-il que les vues du Médecin demeurent subordonnées à des mouvemens critiques qui n'existent point & qu'on ne voit pas ? Voilà le point de la difficulté, & en même-tems la plus

grande objection qu'on puisse faire contre les opinions d'Hippocrate.

Il faut convenir que ceux qui suivroient aveuglement ces opinions , auroient de la peine à se bien tirer de cette difficulté , & de plusieurs autres , que les Partisans de l'opinion contraire seroient en état de leur opposer ; ils n'auroient certainement pas pour eux le grand nombre de malades , qui sont persuadés qu'on ne peut guérir que par les remèdes , non plus que les Médecins , qui ont pour principe d'évaluer par le raisonnement la nature & la marche des maladies , ainsi que l'action des remèdes.

Voici les principales raisons par lesquelles les Partisans d'Hippocrate s'assurent dans leur façon de penser ; ils avancent d'abord , d'après Hippocrate même , qu'il y a des maladies aiguës , mortelles par elles-mêmes & au-dessus de toute espèce de secours ; qu'il y en a de tout , aussi fâcheuses parmi les chroniques dans lesquelles les remèdes , si peu effectifs qu'ils soient , ne peuvent qu'accourcir la

vie, ou diminuer les forces inutilement : ces maladies mortelles & incurables, sont celles dont Hippocrate a dit *qu'il ne faut pas entreprendre de les traiter, parce qu'elles sont au-dessus des forces de l'art* (1); aveu qui valut à Hippocrate & à ses Partisans cette Epigramme d'Asclépiade, qui appelloit la Médecine ancienne, *méditation sur la mort*.

Ils disent ensuite qu'il y a des maladies dans lesquelles les symptômes paroissent effrayans, quoiqu'ils ne soient au fonds que des efforts victorieux de la nature : c'est ainsi que les *redoublemens qui précèdent les crises sont toujours fort considérables* (1). Ce seroit une erreur funeste que de prendre ces efforts salutaires, qui annoncent la guérison, pour des symptômes auxquels il faudroit apporter de prompts remèdes.

Ils ajoutent, enfin, que les maladies dans lesquelles les remèdes semblent suivis des effets qu'on en doit

(1) Liv. de l'art.

(1) Hipp. aphor. 13. sect. 2.

attendre , ne sont pas pour cela soustraites aux efforts critiques de la nature ; un purgatif , ou un émétique n'agissent jamais aussi parfaitement que lorsque la nature est disposée à les seconder ; s'ils sont donnés hors de ce tems-là , ils sont toujours nu sibles ou tout au moins inutiles , ou *indifférens* (1).

L'attention d'un Médecin se réduiroit donc , suivant Hippocrate , à bien distinguer les maladies mortelles par elles-mêmes , d'avec celles qui ne le sont point ; celles-ci comportent seules l'usage des remèdes , placés dans les dispositions favorables , formées & indiquées par les mouvemens critiques de la nature : c'est donc , suivant ce système , au Médecin à savoir discerner dans les maladies graves quels sont les symptômes qui annoncent les efforts heureux de la nature , afin , d'en profiter au lieu de les craindre mal-à-propos : il faut s'attacher à connoître les voyes que la nature

(1) Voyez Chapitre 34. au sujet des remèdes *indifférens*.

tend à se frayer , & à les suivre par une méthode convenable de traitement ; il faut aussi prendre garde de ne pas multiplier les remèdes dans les cas où il ne seroit nécessaire que d'en employer un petit nombre.

C'est d'après ces raisons qu'un commentateur d'Hippocrate (1), » a pré-
 » tendu que pour que les phénomè-
 » nes des crises , presque effacés , pa-
 » roissent de nouveau sur notre ho-
 » rison , il faut que la Médecine re-
 » vienne à ses anciens usages , libre
 » du joug chimérique & fabuleux des
 » inventions humaines ; si on appre-
 » noit à révéler la nature , à l'obser-
 » ver scrupuleusement , à ne la point
 » traverser dans ses opérations , & à
 » ne point interrompre ses mouve-
 » mens , mais à les suivre sans les per-
 » vertir , on verroit de nouveau pa-
 » roître les crises , & les miracles
 » qu'elles produisent , que l'ancienne
 » Médecine a tant célébrés.

Mais de pareilles réflexions peu-
 vent-elles satisfaire ou convaincre un

(1) Hecquet, aphor. 33. sect. 2.

Médecin qui a vû guérir d'anciennes dysenteries par quelques prises d'y-pécacuanha , d'anciennes douleurs de tête par une saignée au pied , des crachemens de sang par des saignées ou des émétiques , le scorbut par des remèdes appropriés , &c. Ces maladies & tant d'autres qui , livrées à elles-mêmes , ne guériroient au moins que très - rarement , on les voit céder promptement à des remèdes appropriés.

N'est-il pas naturel , diroit ce Médecin , de juger de la puissance de l'art par de pareils effets ? & ne doit-on pas croire qu'au moyen des remèdes bien appliqués il est possible d'emporter de même la plupart des maladies dans leur naissance ? ne voit-on pas que presque tous les symptômes graves ne sont fâcheux qu'autant qu'ils nuisent aux fonctions des viscères ? & quelle que soit la disposition du corps , doit-il y avoir d'indication plus grande que celle d'écarter des obstacles aussi pernicieux ?

On n'a exposé ici ces deux opinions que pour avoir lieu de faire re-

marquer les avantages qu'elles pourroient tirer de l'histoire du pouls.

Les Partisans des idées des Anciens, fondés sur le pouls *critique*, peuvent dire qu'à moins qu'une maladie ne soit mortelle par elle-même, auquel cas tout secours de l'art est inutile, il doit se faire nécessairement quelque effort critique dans un certain tems de la maladie, que c'est alors qu'on peut employer avec succès des secours appropriés si on les juge nécessaires, ou laisser faire la nature, si on a lieu de croire par la présence d'un pouls *critique* bien déclaré, que la crise puisse se terminer heureusement par elle-même.

Les Partisans de l'opinion contraire ne manqueront pas d'alléguer que toute maladie n'est qu'un état d'*irritation*, toujours subsistant dans les parties affectées & toujours remarquable dans le pouls quels que soient les changemens qui lui arrivent; or, cet état d'*irritation* ne cessant de menacer le principe de la vie, il ne doit y avoir rien de plus pressé que de chercher à détruire, ou au moins à

détourner une disposition aussi dangereuse ; si la maladie se trouve insurmontable par elle-même , on a du moins la consolation d'y avoir opposé les secours possibles ; s'il en est autrement , on ne sauroit douter que les effets des remèdes renouvelés à propos , ne prennent sur la cause de la maladie , & ne facilitent l'action des organes.



CHAPITRE XXV.

Du Pouls d'irritation compliqué avec le pouls critique dans les maladies aiguës qui ont une heureuse terminaison.

QUELQUES exactes que puissent être les descriptions générales & particulières des changemens qui arrivent au pouls dans les maladies, il seroit difficile de bien évaluer ces changemens, par rapport à la pratique de l'art, si les descriptions sur lesquelles on se règle, ne pouvoient être rapportées au mécanisme, & à la marche des maladies.

Or, pour bien établir ce rapport, il n'y a pas de plus sûr moyen que de considérer l'état de maladie dans sa plus grande simplicité.

Rien n'approche plus d'un état de maladie dans un corps sain, que les phénomènes des excrétions & des sécrétions, qui se font avec quelque

difficulté : on y apperçoit d'abord un effort général du corps , & en particulier celui des organes sécrétoires & excrétoires , sur-tout dans le tems où ils ont quelque peine à s'acquitter de leurs fonctions.

Il est certain que les sécrétions ne se feroient point si les humeurs n'étoient préparées peu-à-peu ; c'est-à-dire , si l'action générale du corps ne leur donnoit d'abord une modification particulière , que l'action des organes sécrétoires doit ensuite perfectionner.

L'effort général de la nature qui opère la préparation des humeurs ; cet effort qui redouble encore lorsque la préparation est faite , & ensuite l'action particulière des organes excrétoires & sécrétoires , sont donc trois conditions nécessaires à toute excrétion & sécrétion (1).

C'est dans le travail de la digestion que ces trois tems se manifestent assez sensiblement. On y dis-

(1) Voy. Recherches Anatomiques sur la position des glandes , &c.

tingue le premier effort de l'estomac sur les alimens, la révolution générale du corps, qui vient à l'appui de cet effort, & le tems de la fin de la digestion, où l'action qui a été concentrée dans l'estomac vient à se répandre successivement dans les différentes parties. Ces phénomènes ne ressemblent pas trop imparfaitement à un léger accès de fièvre.

La plupart des incommodités, dont la principale cause ne consiste souvent que dans des sécrétions & des excrétions pénibles, peuvent de même être regardées comme l'esquisse d'un paroxysme de fièvre. Ces digestions pénibles, ces excrétions forcées ont leur marche, leur tems, leurs symptômes qui se retrouvent d'une manière plus sensible dans une fièvre déclarée & simple.

Aussi toute maladie si simple qu'elle puisse être, ne se fait-elle d'abord remarquer que par un état d'irritation, de spasme, d'accablement dont le corps se trouve saisi. Cette révolution a sa cruë, sa gradation jusqu'à l'établissement complet de la

maladie. Alors commence une autre révolution, qui n'est que la détermination des forces, ou le mécanisme qui sert à préparer la crise; cette révolution dure jusqu'à un troisième tems, qui est celui où les couloirs étant bien disposés & les humeurs bien préparées, il se fait un dernier effort qui détermine les excrétions & finit la maladie.

Il y a donc trois tems à considérer dans toutes les maladies. Le premier qui n'est, pour ainsi dire, que l'appareil de tous les symptômes essentiels, dans lequel les forces du corps se rassemblent & se concentrent. Le deuxième tems, est celui dans lequel les forces concentrées viennent à se développer, & où les humeurs reçoivent les préparations nécessaires pour devenir propres à être séparées dans leurs couloirs; ce second tems est ordinairement accompagné de quelques changemens remarquables dans les organes, par lesquels la crise doit se faire. Le troisième tems, est celui dans lequel la crise étant bien disposée, les excrétions se déterminent

terminent avec facilité , ce qui finit la maladie. C'est en ce sens-là sans doute , qu'on peut dire avec Hippocrate , *que toutes les maladies ont une même forme , ou une même marche générale* (1).

Toute fièvre , considérée dans ses périodes , paroît donc composée de trois fièvres particulières , celle d'*irritation* , celle de *côction* & celle d'*excrétion*. Ces trois états sont très-distincts dans les maladies simples ; ils sont plus ou moins longs & se confondent différemment dans les maladies graves & *compliquées* : delà résultent des symptômes proportionnés à la nature & au degré de la maladie qu'il est toujours essentiel de comparer avec l'état du pouls , pour pouvoir juger des mouvemens favorables , ou contraires aux crises.

Ces trois états , ces trois fièvres , ces trois tems des maladies peuvent être substitués à ce que les Anciens ont désigné par le *commencement* ,

(1) Hipp. Traité des Vents , chap. 2.

l'augmentation, l'état & le déclin de la maladie (1).

Les changemens qui arrivent au pouls, suivent exactement ces trois tems ou ces trois états dans les maladies bénignes : le pouls est d'abord, c'est-à-dire, pendant la fièvre d'*irritation*, *vis*, *serré*, *convulsif*, *non-critique* ; il se dilate, il se développe sensiblement, il devient plus *plein*, plus *fort*, plus *libre* dans le second période de la maladie. Lorsque dans le dernier période l'excrétion est prête à se faire, & qu'elle se détermine en effet, le pouls prend le caractère propre aux évacuations qui doivent arriver ; c'est-à-dire, qu'il est *pectoral* si les crachats terminent la maladie, *intestinal* si elle est finit par les évacuations du ventre, &c.

Mais, dira-t-on, comment concevoir le mécanisme qui établit tous ces rapports entre le mouvement du pouls, le caractère, & les tems des maladies, si on ne peut se former au-

(1) Voy. Thes. des Eaux d'Aquitaine.

cune idée de la cause qui occasionne ces changemens dans l'action du cœur , & dans celle des artères ? A quoi il est aisé de répondre , que ce n'est point ici le lieu de placer des explications. On ne manque pourtant pas de principes propres à rendre raison de tous ces phénomènes inexplicables par la théorie la plus reçue. L'exposition de ces principes se trouve dans un ouvrage récemment publié , dont il ne seroit pas facile de faire la critique (1). Cette réflexion peut suffire à des Observateurs bien intentionnés ; elle doit écarter des oppositions fondées sur des préjugés théoriques quels qu'ils puissent être.

Comme la plupart des Observations précédentes peuvent se rapporter par plusieurs endroits à l'objet de ce Chapitre , on se contentera d'en placer ici deux , qui paroissent présenter suffisamment l'idée du pouls *d'irritation* joint à des pouls *critiques* ,

(1) Institutiones medicæ ex novo Medicinæ conspectu.

dans des maladies considérables, qui ont ordinairement une heureuse terminaison.

OBSERVATION CXXVII.

Fèvre putride dans une jeune fille, qui n'a point eu ses règles depuis deux mois ; le pouls dès le troisième jour est *rebondissant & convulsif*, bien marqué, malgré trois saignées du bras ; il y a un saignement de nez au sixième jour, ce qui détermine à faire deux saignées du pied. Le pouls devient *intestinal* vers le septième, mais en conservant toujours un état *d'irritation* ; on prit le parti de donner des apozèmes rafraîchissans & légèrement laxatifs ; ils ne firent d'abord qu'exciter le vomissement, bientôt ils passèrent mieux, & il y eut vers le neuvième d'assez copieuses évacuations ; elles durèrent jusqu'au onzième, que le pouls redevint un peu *dilaté, brusque, rebondissant, irrégulier* ; les règles reparurent ; peu de tems après le pouls devint *souple & bien développé* ; vers le quin-

zième , où les règles finirent , il devint *peñtoral* bien déclaré. On donna en ce tems-là un léger purgatif , qui déconcerta la marche du pouls , & qui n'eut presque point d'effet. Le pouls se rétablit vers le vingt-unième ; il y eut une expectoration pendant laquelle on trouva toujours un fonds *d'irritation* avec les *redoublemens* du pouls *peñtoral* ; la maladie se termina fort lentement , ce qui probablement ne seroit pas arrivé sans le purgatif placé au moment dans lequel la crise alloit se déterminer.

OBSERVATION CXXVIII.

Fluxion de poitrine dans un jeune homme maigre & sec ; il est saigné cinq fois du second au septième jour ; le pouls , qui a été *convulsif* les trois premiers jours , se *développe* un peu au quatrième ; il est *peñtoral* , mais avec une *tension* & une *roideur* considérable de l'artère ; les crachats qui viennent difficilement sont sanguinolens & écumeux ; du cinq au septième

me jour, le pouls devient *inégal*, *intermittent*, mais toujours *serré*. On purgea le malade au huitième; il y eut des évacuations assez abondantes, mais peu bilieuses; le neuvième on donna du kermès & des apozèmes appropriés, qui ne furent suivis d'aucun effet remarquable; le pouls devient *pectoral* au dixième, mais il est très-peu *développé*; les crachats sont un peu cuits & viennent moins difficilement; (on continuoit l'usage du kermès & des apozèmes); le onzième le malade eut un redoublement considérable, qui commença par de longs frissonnemens; à la fin de ce redoublement le pouls demeura *souple* & *développé*, il devint *pectoral décidé*, & en même-tems très-*ondulant*: le malade qui usoit toujours du kermès & des apozèmes, cracha & sua abondamment les jours suivans. Il fut purgé le dix-huitième jour, & il entra en convalescence vers le vingt-unième.

CHAPITRE XXVI.

Du Puls d'irritation compliqué avec les pouls critiques dans les maladies chroniques.

EN observant avec attention la marche des maladies chroniques, on y découvre de même, à peu-près que dans les maladies aiguës, trois états remarquables, sur lesquels il convient de se régler pour établir & conduire la méthode de traitement.

La seule différence qu'il y ait à considérer ici entre les maladies chroniques & les aiguës, c'est que celles-ci parcourent leurs tems plus promptement que les autres; ce qui n'empêche pas que, dans le fonds, les aiguës ainsi que les chroniques, ne consistent originairement dans un désordre des sécrétions & des excrétions; c'est ce qui fait que ces maladies ont toujours des terminaisons, ainsi que des accidens fort ressemblans.

Les derniers tems des maladies chroniques font sensiblement connoître leur rapport ou leur ressemblance avec les maladies aiguës : on a déjà observé qu'une maladie chronique devient ordinairement aiguë à proportion qu'elle se dispose à la terminaison ; Hippocrate dit, *qu'en traitant une maladie chronique, il faut premièrement la changer en maladie aiguë* (1).

Or, les maladies chroniques ayant des révolutions qui préparent & déterminent leurs crises & leurs terminaisons, on doit y trouver aussi les divers changemens du pouls qui précèdent & accompagnent ces crises.

La santé parfaite n'est qu'un être purement idéal. *Personne ne peut se flatter de n'avoir pas quelque partie foible* (2). Notre vie n'est qu'un tissu d'incommodités, une maladie continuelle, qui ne cesse de faire des progrès.

Nous vivons avec cette foiblesse

(1) Hipp. des Lieux dans l'homme, cap. 13.

(2) Celse, chap. 3.

naturelle de quelques organes; & ce qui doit paroître singulier, c'est que c'est sur cette foiblesse même qu'est fondée la santé propre à chaque individu: c'est d'elle que dépendent les différens tempéramens qui ne viennent tous que de la différence de l'action des organes (1): ce sont-là les sources de la vie, de la santé, des maladies & de la mort.

On observe dans tous les âges des maladies qui ne viennent que de la suite des effets produits par ce *desaccord* presque naturel des organes

La nature & l'art ne parviennent à vaincre les maladies qu'autant qu'ils rétablissent l'ordre d'action naturelle à chaque sujet; ou bien qu'ils opèrent des changemens, sur lesquels s'éablit une autre sorte de santé, différente de la première, & qui dans les suites sert souvent de baze à une autre maladie aiguë ou chronique.

Les guérifons de la première espèce sont des guérifons parfaites: elles

(1) Recherches sur les Glandes.

sont très-rarees dans les maladies graves & compliquées ; la résolution complete d'une petite inflammation, ou le parfait rétablissement d'une partie enflammée dans son état naturel, est peut-être impossible ; la terminaison la plus favorable de ces maladies graves & compliquées, n'est qu'une guérison de la seconde espèce.

C'est de ces crises imparfaites que dépendent la plûpart des maladies chroniques, qui parcourent leur tems plus ou moins promptement, selon la nature, le lieu & le degré du changement intervenu dans l'ordre de la santé primitive ; il arrive pourtant quelquefois qu'une maladie aiguë considérable paroît se terminer si favorablement, que le malade se trouve ensuite plus fort, plus actif qu'il ne l'étoit auparavant ; ce qui prouve que le changement opéré par cette crise a adouci ou augmenté le ressort de quelque organe, qui faisoit la cause du désordre naturel.

Mais il ne faut pas toujours regarder comme une terminaison favorable, des convalescences suivies d'une

augmentation considérable d'embonpoint qui, dans le fonds, est plus souvent un nouvel état de maladie, que l'effet d'une meilleure santé.

Quant au tems que les maladies chroniques peuvent mettre à passer par leurs divers périodes, il est quelquefois si long, qu'Hippocrate prétend en avoir vû qui *duroient six ans* ; d'autres, dont le cours naturel étoit *de six mois*, & d'autres qui parcourroient leurs tems *en deux ans* (1). Plusieurs maladies, dit-il, » sont jugées dans les enfans le quarantième » jour, d'autres le septième mois, » les autres dans sept ans (2) : il y a » des maladies qui se jugent les unes » par les jours, les autres par les » mois, les autres par les quarantaines de jours, & d'autres par les » années ou par une année (3).

Aretée a parlé des maladies chroniques dans lesquelles les révolutions

(1) Hipp. de affect. inter. cap. 52.

(2) *Idem*, livre de l'Enfance, des sept mois.

(3) *Idem*, Aphor. 28. sect. 3.

ou les changemens sont pareils à ceux d'une maladie aiguë (1). Bail-lou demandoit s'il n'y avoit pas des maladies qui durent sept ans, & d'autres qui durent une année entière (2). Les crises sont dites quelquefois se faire par mois & par années (3).

Les Observations suivantes feront la preuve de tout ce qu'on vient d'exposer ; savoir que dans la marche de la plûpart des maladies chroniques, il y a comme dans les aiguës, des révolutions, des tems très-importans à remarquer ; que ces maladies chroniques ne se terminent presque jamais qu'en devenant aiguës ; & enfin que les changemens du pouls annoncent & suivent les révolutions de ces maladies.

OBSERVATION CXXIX.

Une fille pulmonique à l'âge de

(1) Aretée, des maladies longues, Liv. 4. chap. 3.

(2) Baillou, Consult. 106.

(3) Dulaurens, des Crises. Voy. Thes. des Eaux d'Aquitaine, sur tout ce qui est contenu dans ce chapitre.

quarante - six ans , a été sujette , dès son enfance , à des toux opiniâtres & à des saignemens de nez ; les règles qui ont paru assez exactement , ont toujours dégagé la poitrine , sans empêcher cependant des rhumes fréquens , des extinctions de voix , & de légères incommodités , suivies de dévoyement & de sueurs ; dès que les règles ont diminué , la poitrine s'est prise de plus en plus , jusqu'à ce que les crachats ayent été bien purulens , & la pulmonie au dernier degré.

Il paroît que le dérangement naturel , ou presque naturel de la poitrine , a été un obstacle continuel à la santé , pendant tout le cours de la vie , & que les embarras qui fomentoient ce dérangement ont toujours augmenté.

OBSERVATION CXXX.

Une vieille fille avoit une tumeur cancéreuse à la mamelle droite ; elle assure que dès sa jeunesse il arrivoit à cette mamelle , dans toutes les révo-

lutions des règles , des changemens plus notables qu'à la mamelle gauche ; peu à peu la mamelle s'est engorgée , & lorsque les règles ont été au tems de finir , cette tumeur est venue à suppuration , & il s'est établi une fièvre lente.

La foiblesse ou la disposition particulière de cette mamelle droite , en a occasionné la tumeur , qui a parcouru ses tems insensiblement.

OBSERVATION CXXXI.

Un homme eut une attaque d'apoplexie à l'âge de soixante ans ; il avoit été pendant sa jeunesse sujet à de très-violens maux de tête , à des maux de gorge , à des saignemens de nez , à des toux fréquentes ; il fut sujet ensuite à des coliques violentes ; ensuite à un flux hémorrhoidal , & à des douleurs vagues aux reins , & aux bras ; le flux hémorrhoidal diminua , & vint à cesser entièrement dans les dernières années de sa vie ; le malade se plaignoit quelque-tems avant son attaque , d'un engourdissement

de tout le corps , & principalement de la tête.

Quoique cet homme parut très-bien constitué , il avoit cependant , depuis son enfance , une incommodité habituelle , qui l'a conduit par degrés à l'apopléxie.

OBSERVATION CXXXII.

Un homme qui est pulmonique à l'âge de trente-cinq ans , avoit eu dans sa jeunesse la jaunisse ; il fut ensuite sujet à des douleurs rhumatismales aux bras & aux jambes , & à des rhumatismes fréquens ; il parut vers l'âge de dix-huit ans une dartre considérable au visage ; cette dartre fut traitée ainsi que les autres incommodités ; elle disparut ; le malade paroissoit se bien porter ; il eut des accès de fièvre tierce , qui durèrent plusieurs mois , & qui revinrent à plusieurs reprises , dans l'espace de trois ans ; la fièvre devint quotidienne , & dans la suite elle fut continue ; la poitrine se prit , & le malade devint phthisique.

Cette observation présente un tissu, ou une suite d'incommodités, qui n'ont été probablement que les effets de l'ancien foie de la principale maladie.

OBSERVATION CXXXIII.

Un homme âgé de cinquante-cinq ans devient hydropique ; il a été pendant sa jeunesse sujet à la jaunisse, à de fréquens saignemens de nez, à des fièvres intermittentes & à de mauvaises digestions ; les urines varioient souvent, étant tantôt crues & abondantes, tantôt rouges, briquetées & en petite quantité ; quelques années avant l'hydropisie le malade fut attaqué d'une disposition inflammatoire au foie, avec fièvre considérable, & il traîna jusqu'au tems de l'hydropisie une convalescence fort imparfaite.

Les Anciens n'auroient pas manqué d'accuser, en pareils cas, l'*intempérie* naturelle du foie, qui n'a cessé de faire des progrès pendant le cours de la vie.

OBSERVATION CXXXIV.

Il n'est pas rare de voir des asthmes se préparer depuis longtems & finir après une longue durée par des hydropisies de poitrine ; des maladies cutanées opiniâtres produire enfin des ulcères au poumon ; de vieilles pertes blanches , suivies d'hydropisies ou de phthisie ; la goutte & le rhumatisme finir par des engorgemens de la poitrine , ou des viscères du bas-ventre.

Ces faits & tant d'autres de cette espèce qu'on pourroit alléguer , prouvent qu'il y a beaucoup de maladies chroniques , principalement produites par une mauvaise constitution naturelle , ou accidentelle de quelques organes , qui rend très-graves des causes assez légères par elles-mêmes , & peu nuisibles en effet , avec une meilleure constitution.

Les Observations suivantes serviront à prouver que les maladies chroniques se changent presque toujours en maladies aiguës vers leurs derniers tems.

OBSERVATION CXXXV.

Ancien rhumatisme, sans fièvre apparente, dans un jeune homme assez robuste, & d'un tempérament sec; les eaux minérales de *Barèges*, prises en bain & en boisson, augmentent prodigieusement les douleurs; la fièvre est évidente vers le sixième jour; on suspend l'usage des eaux; la fièvre dure jusques vers le quatorze, d'abondantes évacuations par les sueurs, par le ventre & par les urines, qui se succèdent ensuite, terminent la maladie aiguë; le pouls qui a d'abord été *fiévreux, vif, & non critique*, est devenu *excréteur*, & a annoncé toutes ces évacuations. Depuis ce tems, le malade s'est trouvé bien guéri de son rhumatisme.

OBSERVATION CXXXVI.

Plusieurs mélancholiques fort éprouvés des accidens ordinaires à leur état, se mettent à l'usage des eaux minérales, dites *Eaux - Chau-*

des ; le pouls habituellement variable , irrégulier , plus ou moins serré , se développe sensiblement , & devient vif , fréquent , & prend des caractères particuliers , selon la disposition des sujets ; les uns ont des hemorrhagies du nez ; la fièvre augmente dans d'autres , de manière à exiger quelques saignées ; il y en a enfin qui ont une espèce de fièvre putride qui , au moyen des remèdes appropriés , se termine par de copieuses évacuations & des sueurs abondantes ; tous ces malades se trouvent ensuite très-bien guéris , & plusieurs mois après ils disent n'avoir éprouvé aucune des fâcheuses incommodités , dont ils étoient si fort tourmentés auparavant.

Il paroît évidemment que dans ces cas-là , l'Art , suivant le précepte d'Hippocrate , fait d'une maladie habituelle & chronique , une maladie aiguë , & bien critique ; c'est ce qui donne occasion de soupçonner que les maladies chroniques qu'on croit terminées après des traitemens , qui ne sont dans le fonds que palliatifs ,

& qui n'excitent pas une crise convenable, ne sont pas toujours bien guéries : telle est la terminaison de plusieurs des maladies, pour lesquelles on a par exemple employé le lait pour toute nourriture, ou qui n'ont été traitées qu'avec des remèdes calmans : ne doit-on pas mettre dans cette classe la plupart des maladies aiguës, traitées par de fréquentes saignées, des lavages & des adoucissans ?

Venons aux observations qui prouvent que les changemens du pouls suivent exactement les tems & les espèces de révolutions qu'on observe dans les maladies chroniques.

OBSERVATION CXXXVII.

On trouve le pouls *dur, irrégulier, déréglé, peu constant*, dans toutes les filles qui ont les pâles couleurs ; dès que les règles viennent à se bien déterminer, le pouls se *développe*, devient plus *fort*, & il prend le caractère propre aux évacuations critiques de la matrice ; il ne se trouve

plus ensuite dans la *petitesse* & le *resserrement* propre à l'état des pâles couleurs.

On observe de pareils changemens dans l'état du pouls des mélancoliques, qui ont une disposition au flux hémorrhoidal; quelque tems avant que ce flux soit disposé à se déterminer, le pouls est à peu-près comme dans les pâles couleurs; il se *développe* & il acquiert *de la force* quand le flux hémorrhoidal est bien déterminé.

Il est prouvé par plusieurs des Observations déjà rapportées, que les personnes sujettes à des sueurs ou à des dévoyemens habituels, entretenus par une mauvaise disposition chronique, ont, lorsque ces crises veulent se déterminer, le pouls propre à chacune de ces excrétions.

OBSERVATION CXXXVIII.

Point de côté habituel, crachats forts suspects; dans une fille qui a essuyé il y a trois mois une fluxion de poitrine: le pouls est *fébrile, vis, sec*,

irrégulier ; des apozèmes adoucissans & des eaux minérales sulphureuses augmentent le mouvement du poulx ; elles le *développent* & le rendent plus *souple* & plus *plein* ; il devient ensuite décisivement *pẽtoral* : les crachats sont abondans & de meilleure espèce ; peu à peu la poitrine se dégage & le poulx redevient *souple* & assez *égal* : quelques jours après il devient *inférieur* , & annonce les règles qui n'avoient pas paru depuis trois mois ; elles viennent en effet assez abondamment , & la maladie est heureusement terminée.

OBSERVATION CXXXIX.

Migraine périodique invétérée dans un sujet maigre & sec, le poulx est toujours fort *convulsif* au commencement du paroxisme ; il se *développe* un peu vers le deuxième jour, il devient *dur* , *tendu* , *inégal* , un peu *brusque* , le malade vomit abondamment , & il arrive souvent que ce vomissement est suivi de grouillemens & de quelques légères douleurs de colique ,

dans lesquels le pouls devient *intestinal* ; bientôt après il y a de copieuses évacuations bilieuses.

Mais malgré ces évacuations, & vraisemblablement à cause de la disposition habituelle, le pouls reste dans les intervalles des paroxismes, un peu *dur, serré, presque convulsif* ; ce qui prouve évidemment que la crise n'est qu'imparfaite ; le malade prend des eaux purgatives & des bains chauds ; il survient une fièvre violente, suivie d'abondantes évacuations, avec un pouls si fort & si *développé*, qu'il semble avoir totalement changé de nature ; depuis cette crise il est resté constamment *libre, souple, égal* pendant plusieurs mois, il n'y a eu aucun retour de migraine.



CHAPITRE XXVII.

De la Complication du Pouls d'irritation avec les Pouls critiques dans les maladies aiguës qui ont une mauvaise terminaison.

ON a déjà dit (1), que la *complication* du pouls d'irritation avec le pouls critique , n'entraîne que peu d'accidens fâcheux , dans les maladies qui ne sont point de mauvaise espèce ; rien ne s'oppose invinciblement , dans ces maladies , au *développement* du pouls , & aux excretions critiques : on verra par les observations qui vont être rapportées combien cette *complication* est plus à craindre dans des maladies graves par elles-mêmes.

En examinant de près la nature & les causes de pareilles maladies , on a lieu de présumer qu'elles sont ordinairement *composées* d'un fonds de

(1) Voyez Chapitre 25.

maladie chronique, & d'une maladie aiguë entée, pour ainsi dire, sur ce fonds de maladie chronique.

D'ailleurs, les divers tempéramens n'étant produits que par les dispositions particulières des organes, & par les divers rapports d'action qui résultent de ces dispositions, ils peuvent la plupart être regardés comme une espèce de maladie habituelle; sur-tout en y joignant les effets des excès, dans lesquels les hommes ne tombent que trop souvent.

Il est même très-probable que la plupart des passions & des goûts, principalement celui qui porte à un mauvais régime qu'on suit, & qu'on croit devoir suivre, ont leur première cause dans un désordre de constitution; ce désordre fait ses progrès sourdement, & forme un établissement de maladie, qu'il seroit quelquefois dangereux de vouloir entièrement détruire.

Des personnes ainsi disposées, ne sauroient avoir des maladies qui parcourent leurs tems, comme elles le font dans des corps habituellement

sains : il faut , à plus forte raison , en dire autant des malades qui ont des obstructions , des ulcères internes ou externes , des rhumatismes habituels , des maux de tête anciens , l'asthme , la colique , la goutte , des palpitations , des dispositions dartreuses , ou qui ont déjà essuyé des maladies , qui ont laissé des impressions dans quelque viscère.

On peut encore rapporter ici des phénomènes qu'il n'est pas rare d'observer , au sujet des règles dans les filles qui ne les ont point encore eues , & dans les femmes qui cessent de les avoir. Les règles viennent avec assez de facilité dans les filles bien constituées , & cessent en leur tems , avec peu d'incommodités ; elles ne se déterminent que difficilement dans les filles qui ont la poitrine affectée , ou qui ont quelque mauvaise disposition dans les viscères du bas - ventre ; les causes qui s'opposent à cette première révolution , & qui se trouvent souvent persister jusqu'à l'entière cessation des règles , jettent quelquefois ces personnes , en l'une & l'autre de

ces circonstances , dans des maladies aiguës , très dangereuses.

Les maladies *compliquées* , dont il sera question dans les observations suivantes , feront voir comment il en résulte des *complications* de différentes espèces de pouls , selon la nature , la marche & les événemens de ces maladies.

OBSERVATION CXL.

Un homme âgé de cinquante ans , qui s'étoit long - tems livré à toute sorte d'excès , avoit à l'une des jambes un petit ulcere , qui se rouvroit & se fermoit de tems en tems ; il lui survint une fièvre continue avec des redoublemens , point de côté & crachement de sang ; cette maladie dura pendant près de quarante jours ; le pouls qui demeura *convulsif* pendant presque toute la maladie , fut *intermittent* depuis le troisième jour jusques vers le quatorze : on fit plusieurs saignées du bras , & on employa plusieurs légers purgatifs qui n'eurent que peu d'effet.

Il survint au quatorze , un dévoyement spontané & de matieres bilieuses ; il y eut en même tems des crachats comme purulens , qui furent annoncés , ainſique le dévoyement , par le pouls qui leur eſt propre ; ce pouls fut toujours *compliqué* avec une *irritation* conſidérable ; cependant le malade reprit des forces peu à peu , il ne lui reſta qu'un léger embarras à la poitrine ; l'ulcere de la jambe ne ſe rouvrit point.

Cet embarras de la poitrine devenu habituel , & la ſécherelle conſtante de l'ulcere de la jambe , étoient une preuve que la maladie n'avoit pas été complètement jugée.

Le malade fut attaqué cinq ans après d'une pareille maladie , avec cette différence que le pouls fut toujours dans cette dernière , *viſ* , *ferré* , *convulſif* ; il ſe développa de tems en tems , mais non pas d'une maniere conſtante , tantôt il paroifſoit *peſſo-ral* & tantôt *intefſtinal*. Plusieurs ſaignées & plusieurs purgatifs , employés conformément aux indications qu'on avoit pû ſaiſir , n'eurent aucun effet

heureux. Le malade mourut au quatorze , sans qu'on eut jamais trouvé dans le pouls aucun signe de crise favorable.

OBSERVATION CXLI.

Un jeune homme d'une forte constitution , mais un peu mélancolique , étoit sujet depuis sa tendre jeunesse à des maux de tête assez vifs , & à des symptômes qui accompagnent ordinairement le flux hémorrhoïdal ; il eut la fièvre continue accompagnée d'un violent mal à la tête ; le pouls devint sur la fin , très-rebondissant & *naçal* ; il survint un saignement de nez abondant & des excrétions muqueuses du nez & de la gorge qui terminèrent la maladie : cinq saignées , trois du bras , deux du pied , l'émétique , & quatre purgatifs légers qui avoient précédé cette hémorrhagie critique, n'avoient produit aucun effet remarquable sur le pouls ; il demeura constamment un peu *convulsif* ; cette opiniâtreté étoit vraisemblablement la suite de la cause qui produisoit les

maux de tête auxquels le malade étoit depuis long-tems sujet ; les efforts critiques de cette maladie ne purent détruire entièrement cette cause.

En effet un an après , & à peu près dans la même saison , ce jeune homme eut une maladie assez semblable à la première ; le pouls fut toujours *vif , petit , fréquent , non critique* , il ne changea presque point ; à peine parut-il quelques légers *rebondissemens* ; tous les différens remèdes qui furent employés ne produisirent jamais dans le pouls aucun *développement sensible* ; les urines furent , dans tout le courant de la maladie , ou abondantes & limpides , ou rouges sans sédiment , & en petite quantité ; les évacuations ne furent presque jamais que séreuses ; la tête se prit vers le quatorzième jour ; le malade resta deux ou trois jours dans une sorte de léthargie , après laquelle il fut paralytique du côté droit : enfin il mourut dans les convulsions , le pouls demeurant toujours dans le même état *d'irritation* , plus du côté droit que du gauche.

OBSERVATION CXLII.

Une jeune fille avoit à l'oreille droite une espèce de suintement qui augmentoit à la moindre incommodité ; elle eut une fièvre continue pour laquelle elle fut saignée quatre fois du bras , purgée trois fois , & qui se termina par un dépôt à cette même oreille ; le pouls se *développa* , mais il conserva toujours la *roideur* propre au pouls de suppuration (1).

Trois ans après , cette jeune fille fut mariée ; elle eut à la suite de sa première couche une fièvre , qui eut pour principal accident un violent mal à la tête ; à mesure que la douleur diminuoit par les remèdes qui furent employés , le suintement de l'oreille augmenta ; il survint ensuite un assoupissement léthargique & la malade périt peu de tems après , dans des convulsions ; le pouls étant toujours resté très-*vis* , *irrégulier* , *convulsif* , *non critique* , *peu développé* , &

(1) Voyez le Chapitre 29.

seulement dans de courts intervalles.

Les maladies qui font le sujet des trois observations précédentes, étoient *compliquées* avec d'anciennes mauvaises dispositions qui ne pouvoient manquer de former un obstacle considérable à la liberté des mouvemens critiques.

OBSERVATION CXLIIE.

Fièvre continue dans un homme de constitution robuste, accablé d'un violent chagrin, & réduit à une très-mauvaise nourriture pendant un tems considérable. Le pouls est *vif*, *petit*, *serré*; il paroît quelques *intermittences* au second jour : au troisième le malade vomit naturellement, & ce vomissement est suivi de quelques évacuations simplement stercorales. Cinq saignées & l'usage des apozèmes laxatifs, ne développent point le pouls jusqu'au sixième; il paroît alors se relever un peu : au septième le ventre est bouffi & tendu, le pouls devient *flasque*, & il semble *vide*; on fit encore deux saignées, & on

donna beaucoup de potion huileuse , ce qui n'empêcha pas le ventre de devenir plus tendu & beaucoup plus douloureux ; le pouls se *resserra* de nouveau , avec une augmentation de tension & de gonflement du ventre ; au neuvième le pouls fut plus *petit* , plus *fréquent* , plus *serré* , & le malade mourut ce jour-là.

Voilà un exemple d'un pouls qui reste toujours *concentré* , *non critique* , malgré quelques changemens qui paroissent annoncer une excrétion intestinale. Il est probable que par l'impression du chagrin & les effets de la mauvaise nourriture , les organes ne se sont point trouvés en état d'entrer dans une action convenable pour s'opposer au progrès de la maladie.

OBSERVATION CXLIV.

Fièvre continue de mauvaise espèce dans un malade fort adonné au vin & aux liqueurs spiritueuses. Le pouls reste toujours *serré* , *vif* , *tendu* , *convulsif* , quoiqu'il y ait de tems en tems quelques légers changemens qui

paroissent annoncer le saignement de nez & le dévoyement ; mais le *rebondissement* n'est jamais *complet*, le pouls *intestinal* est toujours, lorsqu'il paroît, joint au *convulsif* ; enfin les évacuations arrivent , mais elles ne sont ni de bonne qualité , ni abondantes ; le malade meurt au quarante-unième jour. On avoit fait de fréquentes saignées ; on avoit employé en leur tems beaucoup de purgatifs & d'apozèmes laxatifs ; on avoit enfin appliqué des vésicatoires aux jambes.

OBSERVATION CXLV.

Fluxion de poitrine dans un malade d'assez foible complexion. Il avoit depuis près de quinze jours un dévoyement considérable & une douleur sourde dans l'hypocondre droit. Il survient un violent frisson qu'on prend ici pour le commencement de la maladie ; la toux est fréquente , la douleur de l'hypocondre plus vive , le pouls est *petit* , *serré* , un peu *irrégulier* : du deuxième au quatrième le dévoyement est moindre , la toux

moins fréquente , mais la douleur de l'hypocondre se répand sur la région épigastrique ; le pouls est moins *vis* , moins *serré* : du quatrième au septième le pouls se *développe* un peu & est *obscurément pectoral* ; il vient un peu plus de crachats mousseux & sanguinolens ; le ventre coule moins quoique le malade soit purgé : du septième au neuvième , le pouls est plus *tendu* , plus *serré* ; le ventre se gonfle & se tend , & les évacuations cessent : du neuvième au douzième le pouls est *rebondissant* , mais avec une *cons-triction* marquée : du douzième au dix-huitième le pouls est *pectoral* & les crachats sont gras & assez cuits : vers le dix-huitième il sort assez de sang du nez : vers le vingt-unième le pouls paroît dans l'*état naturel* , semblable au pouls d'un abcès (1) ; le ventre devient plus tendu jusques vers le trentième ; alors il survient une enflure considérable dans tout l'hypocondre droit & en même tems à la joue & au pied du même côté ;

(1). Voyez Chap. 29.

le pouls est *petit*, serré, irrégulier, & devient un peu *pectoral*, surtout du côté affecté : vers le trente-cinquième, le malade crache beaucoup de pus.

Ce malade fut saigné onze fois, purgé neuf, & fit un grand usage de looc avec du kermès : le pouls ne se développa jamais parfaitement. Il paroît que l'embarras au foie ou à ses appartenances, indiqué par la douleur de l'hypocondre & le dévoiement, étoit le principal *noyau* de la maladie, il formoit un obstacle constant à la liberté des mouvemens du pouls.

OBSERVATION CXLVI.

Fluxion de poitrine à la fin de laquelle les crachats ont été purulens dans une femme maigre & foible : il reste une toux presque habituelle & une fièvre lente, légère, avec des redoublemens suivis de sueurs nocturnes : cette femme devient grosse dans ce tems là ; les accidens furent tellement suspendus, que la malade

parut se porter assez bien jusqu'à la fin de la grossesse. La fièvre se déclara par un frisson considérable dès le second jour de l'accouchement, le pouls fut *serré, vif, convulsif*; on fit d'abord deux saignées du pied, qui ne changerent presque rien dans l'état de la fièvre ni du pouls; il n'y eut presque point de vuidanges; vers le sixième le pouls parut devenir un peu *pectoral*, & il y eut quelque difficulté dans la respiration sans que les mamelles fussent engorgées; c'est ce qui fit faire plusieurs saignées du bras, dans l'intervalle desquelles on plaça du kermès & des potions huileuses, le tout avec peu de succès. Enfin la malade cracha tout d'un coup une grande abondance de pus & demeura pulmonique.

L'événement de cette grossesse & de cette maladie, présente une idée de la cause & du mécanisme de la suppuration un peu différente de celle que fournit la théorie ordinaire: lorsque la malade devint grosse, l'un ou l'autre de ses poumons étoient dans un état de suppuration; cette

suppuration fut suspendue par l'état de grossesse ; c'est ce qui pourroit faire présumer que le mécanisme de la suppuration dépend moins du mouvement propre de la partie abcédée , que d'une espèce de spasme , qui agit, si on peut le dire , *avec une sorte de vive convergence* sur l'endroit dans lequel s'établit une suppuration.

La grossesse a pû faire ici une diversion à la suppuration de la poitrine ou la suspendre ; la mauvaise disposition de la poitrine qui a persisté malgré cette diversion , a dû après l'accouchement , tourner de son côté la plus grande partie de l'action qui devoit déterminer les suites favorables des couches : c'est pour cette raison que la matiere des vuidanges s'est jettée sur la poitrine.



CHAPITRE XXVIII.

De la complication du Pouls dans les maladies convulsives , nerveuses (ou nerveales) , ou plus nerveuses qu'humorales.

C'EST une vérité reconnue en Médecine , que la plûpart des maladies aiguës , sont produites par la suspension des excrétions , des différens couloirs , & terminées par des évacuations plus ou moins abondantes : on sçait aussi qu'il y a des maladies dans lesquelles il y a tant de *sécheresse* , tant de *spasme* , si peu de *matiere* , qu'on ne peut les attribuer qu'à la *sensibilité* des nerfs.

C'est de cette *sensibilité* , que dépendent ces deux fameux principes de la secte des *Méthodiques* , le *stric-tum* , la *constriction* ou le *resserrement* , & le *laxum* ou la *perte de ressort* des parties ; ainsi que tout ce que les Modernes ont avancé du mouvement.

rique, du spasme, de la mobilité des fibres, des convulsions, de l'éretisme.

Il ne faut pas s'attendre à trouver dans ces sortes de maladies, le progrès, la marche & le développement du pouls, qui ne sont que la suite de la régularité & de la constance des mouvemens naturels; ou, pour mieux dire, il est évident que les coctions, les crises, les excretions bien conditionnées, ne peuvent presque pas avoir lieu dans ces maladies nerveuses.

Il est cependant à présumer que quelques irréguliers que semblent être les symptômes de ces maladies, ils ont leurs causes, leurs effets & leurs phénomènes fixes : ce seroit vraisemblablement au moyen des réflexions proposées dans le Chapitre précédent qu'on pourroit suivre, démêler, classer & évaluer tous ces phénomènes, trop regardés comme des symptômes passagers.

Qu'il y ait dans le corps un ou plusieurs obstacles dans les différens viscères, ou dans les organes faits pour soutenir & favoriser l'action des

nerfs ; chacun de ces obstacles doit avoir les phénomènes particuliers ; dans les différentes parties , dans les différens côtés , dans les différens *départemens* des organes (1) : qu'il se joigne à ces obstacles fixes & habituels , un embarras plus considérable qui occasionne , par exemple , la fièvre , cette dernière fièvre aura sa marche , mais elle sera souvent interrompue & changée par les premiers obstacles , qui ne cessent de produire leurs effets propres ; on pourroit , peut-être , décomposer par ce moyen les maladies *nerveuses* les plus compliquées : mais ces sortes d'examens ne regardent pas cet ouvrage.

Une remarque importante à faire , c'est qu'à côté de ces maladies *convulsives* , *nerveuses* , & sans *matière* , se trouvent précisément des maladies contraires , dans lesquelles les embarras des canaux excrétoires sont si considérables , & les différentes *matières d'excrétion* si abondantes , que

(1) Voy. Recherches sur les Glandes.

ce n'est que par de copieuses évacuations qu'on peut attendre du soulagement dans ces maladies (1).

C'est ici un des sujets de division, ou de partage, dans les opinions des Praticiens. Les uns attachés uniquement à l'existence & aux phénomènes du *spasme*, ne s'efforcent qu'à le vaincre par des remèdes doux, calmans & humectans; d'autres enhardis par le succès des violens remèdes, ne manquent pas de les placer dans ces cas, où les mouvemens critiques de la machine sont si gênés, qu'ils croient devoir recourir aux médicamens les plus actifs, pour remettre l'ordre naturel des oscillations.

Tout le genre nerveux est dans un état de *roideur* & d'*irritation* si considérable, par la présence de l'engorgement des viscères, par l'*érétisme* de l'estomac, par les arrêts de la peau & par ceux des autres parties, que ce n'est qu'au moyen des secousses promptes, réitérées, & faites avec effort, qu'on parvient à arrêter les effets

(1) Voyez Institut. Médecin. sur le diagnostic de ces maladies.

pernicieux de ces engorgemens ; mais c'est à condition qu'ils soient *mobiles* ou *amovibles*. » Il y a des maladies » qui paroissent *sèches & crues* ; non » point à cause qu'il n'y a pas des ma- » tières dont l'excrétion doit être fai- » te , mais parce que la fièvre rend le » corps aride (1).

Voilà le triomphe des émétiques, des purgatifs les plus violens, & des remèdes qu'on nomme les plus chauds : c'est ici qu'il faut dire avec Hippocrate , que *les forts médicamens emportent tout* (2) ; voilà des maladies faites pour déconcerter les opinions des Anciens , leur lenteur , leur *expectation* , leur attachement à la nature : il faut pourtant leur rendre la justice qui leur est due , ils connoissoient l'usage de ces remèdes forts ; leur attention à suivre la nature ne les empêchoit pas de les mettre en œuvre , sur-tout dans les maladies dans lesquelles ils avouoient eux-mêmes que la vertu des jours n'avoit point d'influence.

(1) Baillou , Epid. 2. not. 8.

(2) Traité de lieux dans l'homme.

Ils ont parlé de ces combats dans lesquels la nature est vaincue, ou prête à succomber sous les efforts de la maladie si on la livre à elle-même. Une de leurs saignées en valoit plusieurs de celles qu'on fait aujourd'hui; leurs purgatifs étoient beaucoup plus forts; & il y a des Médecins de la secte des Modernes, qui se croyant fort ennemis de l'*expectation* des Anciens, se sont pourtant trouvés plus timides qu'eux & plus soumis à la nature, vû l'insuffisance & la légèreté des petites potions purgatives qu'ils employoient (1).

Mais de quelles lumières n'a pas besoin un Médecin, pour éviter les méprises dans les maladies dont il est question ! La théorie & le raisonnement sont ici très-sujets à faire broncher d'un côté ou de l'autre; l'expérience éclairée est l'unique ressource qui puisse guider les Praticiens.

Le pouls est dans ces maladies *nerveuses*, presque toujours *non critique*;

(1) Voyez le mot *Crise*. Encyclopéd. IV. volume.

il n'est presque point *développé* ; il est très-*serré* au contraire , fort *convulsif* , & sur-tout *variable* , *inconstant* , *mobile* , peu *fixe* , très-éloigné de cette *teneur* , de cette *aisance* , de cette *fermeté* , qui caractérise le pouls *critique*. Ce qu'il y a de plus singulier encore , c'est que le pouls semble quelquefois *critique* dans ces maladies sans qu'il soit toujours suivi des évacuations qu'il annonce : cette observation peut être souvent réitérée dans les maladies convulsives , nommées *vaporeuses* (1).

Baillou prétendoit » que dans les » pâles couleurs le cœur est quelque- » fois *fol* (*fatuum*) , & qu'il y a avec » cette maladie , une sorte de fièvre » qu'il est impossible de déterminer » (2) ; « les pâles couleurs sont une sorte de maladie *nerveuse* ; on peut en dire autant du pouls ou de la fièvre , de toutes les autres espèces de maladies de cette classe.

(1) Voyez le dernier Chap.

(2) Baillou, consult, liv. 3. & au livre des maladies des filles.

OBSERVATION CXLVII.

Mélancolie outrée , dans un jeune homme qui paroît bien constitué , & qui s'est adonné vivement à l'étude pendant plusieurs années ; inconstance , fureur de voyager , vivacité des passions , toutes sortes d'incommodités , sans qu'il y ait une maladie fixe ; les forces diminuent sensiblement dans l'espace de deux ans ; la maigreur augmente journellement ; elle est bientôt au point du marasme parfait : le pouls est constamment serré , *vis* , peu égal , *plus ou moins agité* , *dur & convulsif*. Les remèdes les plus appropriés , les appétitifs , les laitages , les eaux minérales ; l'équitation , &c. n'ont aucun succès , & le malade dépérit de plus en plus , par leur usage ; il meurt enfin dans l'étiisie. Le pouls n'a cessé de se resserrer , de se durcir , de s'affaiblir , & d'être non critique , à proportion que toutes les évacuations sont devenues plus crues , plus séreuses , moins excrémentielles.

OBSERVATION CXLVIII.

Un malade qui a eu beaucoup de chagrin, est devenu si sensible, si délicat, si vif, que le moindre chatouillement, ou la plus légère douleur le met en convulsion; un bruit un peu extraordinaire, un faux mouvement, la passion la moins vive, lui causent des suffocations, des tremblemens, des espèces de frissons; son pouls est habituellement *vif, incertain, palpitant, serré, convulsif*.

Il est fort approchant de ce caractère dans beaucoup d'hypocondriaques, sujets à des douleurs vagues, des vents, des tournemens de tête, qui finissent par des engorgemens des viscères, que l'art ni la nature ne peuvent résoudre, & ont la *convulsion* & le *resserrement* du pouls accompagnent l'opiniâtreté.

OBSERVATION CXLIX.

Plusieurs filles qui ont les pâles couleurs, ont le pouls *irrégulier, serré,*

étranglé , très - variable & convulsif , au moindre mouvement qu'elles font. (Voy. l'Observ. 137).

Quatre de cette espèce , dans lesquelles le pouls prend de la *consistance* , de la *teneur* , de la *force* , à la suite des remèdes ordinaires ; le pouls se *développe* , il est légèrement *rebondissant* , *inégal* , *brusque* ; il annonce les règles qui paroissent en effet , & qui dissipent presque toutes les infirmités habituelles , le pouls se trouve , après ces excretions , *égal* , *souple* , *libre* , assez *plein*.

Trois femmes âgées de quarante-cinq à cinquante ans , sont au point de perdre leurs règles ; le pouls est *irrégulier* , *convulsif* , *dur* , peu *dilaté* pendant plusieurs mois de suite ; il se *calme* enfin , il devient *doux* , *moulet* , assez *plein* lorsque les règles ne se montrent plus ; le pouls se ressent de la tranquillité de la matrice , dont l'excrétion est autrement *active* qu'on ne sauroit le déduire de la simple pléthore générale ou particulière si célébrée dans les Ecoles (1).

(1) Voy. les Recherches sur les Glandes.

Une

Une femme âgée de quarante - six ans, sent depuis longtems des frissons & des douleurs à la tête; elle est toujours agitée; le pouls se ressent de cette *agitation*, il est dans une *incertitude* continuelle, ses mouvemens sont *irréguliers*, l'*artère* est *fort tendue*: il survient un dépôt à une oreille; après l'usage d'une grande quantité de remèdes appropriés; ce dépôt est suivi des signes de suppuration, & lorsque cette suppuration est faite, la douleur & la pesanteur de la tête, les agitations, ont disparu; le pouls est devenu *tranquille*, *égal*, *molet*, *plein*.

OBSERVATION CL.

Le feu prend à une maison, dans laquelle se trouvent deux femmes qui ont leurs règles: elles sont extrêmement effrayées. Il survient à l'une une perte très-abondante, & les règles se suppriment dans l'autre avec des convulsions affreuses: le pouls est très-*vis* & très-*serré* dans l'une & dans l'autre, mais plus dans celle dont les

régles sont supprimées : le pouls indique un peu l'évacuation des règles dans celle qui a la perte ; on sent quelque *rebondissement* léger à travers le *resserrement* de l'artère : le tems & quelques légers secours calment enfin ces accidens ; le pouls reprend sa *tranquillité* ordinaire dans l'une & dans l'autre de ces deux femmes.

OBSERVATION CLI.

Abattement & affaïssement extraordinaire, avec un dégoût total de la vie, dans un homme qui a eu du chagrin ; il tombe dans une langueur & un dépérissement sensibles, il maigrit & s'affoiblit journellement, il perd l'appétit : le pouls devient *petit, serré, dur, presque insensible*, rien ne peut le *développer*. Ce malade meurt sans jamais avoir eu dans le pouls de signe d'aucune sorte d'évacuation *critique* ; il est tombé insensiblement dans un marasme parfait.



OBSERVATION CLII.

Frisson , tremblement & vomissement , dans un homme qui , depuis quelques années , ne buvoit presque que de l'eau - de - vie , & qui avoit beaucoup de chagrin : à ce frisson succède une chaleur âcre , avec une sécheresse générale de la peau : la langue est extrêmement sèche , & rien ne peut l'humecter ; le pouls paroît à peine fiévreux , il est *caché , petit , serré* : les saignées réitérées , les émétiques , les lavages , les adoucissans & les calmans de toute espèce , les vésicatoires même ne procurent aucun *développement* dans le pouls , à peine devient-il un peu plus *fort* : mais il reste toujours *dur & tendu* ; on y sent quelques *rebondissemens* vers le neuf de la maladie : il y a un peu de saignement de nez au onzième : la tête se prend alors après une saignée du pied ; les convulsions surviennent , les bras & les jambes sont dans une roideur extraordinaire , le ventre se bouffit & est insensible ; le malade

meurt le quatorzième jour, malgré huit saignées, l'émétique, plusieurs apozèmes, du kermès, quatre ou cinq purgations, les vésicatoires, des tisannes, du petit-lait, des potions huileuses; le pouls a toujours été en *déclinant* & perdant de sa *consistance* depuis le commencement de la maladie, sur-tout depuis la dernière saignée faite au moment où il sembloit vouloir devenir *critique* (1).

CHAPITRE XXIX.

De la complication du Pouls dans les suppurations à la suite des maladies aiguës.

IL ne faut pas penser que les dépôts, ou les suppurations à la suite des maladies aiguës ne soient jamais que l'effet des maladies négligées; & que la saignée, les purgatifs, les al-

(1) Voyez le chap. 34. au sujet de l'action des remèdes sur le pouls.

térans & les évacuans puissent toujours prévenir avec succès ces sortes de dépôts.

Les observations bien faites, bien examinées dans toutes leurs circonstances, démontrent trois vérités fort opposées à ces sortes d'affertions vagues & fondées sur une théorie qui en impose tous les jours à ceux qui n'ont point d'expérience.

La première, qu'il est quelquefois impossible, quoi qu'on fasse, d'éviter une suppuration.

La deuxième, qu'il est quelquefois fort-dangereux que l'art entreprenne d'empêcher une suppuration que la nature prépare.

La troisième, qu'il est au contraire très-utile dans de certaines maladies internes, que l'art se réduise à aider la nature pour déterminer une suppuration, ou un dépôt de matière purulente.

Le raisonnement est ici d'accord avec l'expérience; en effet, soit qu'une partie du corps se trouve tellement affectée par elle-même, que la suppuration doive s'y faire néces-

fairement; soit qu'une crise irrégulière se tourne de ce côté-là, il est évident que la disposition de cette partie ne sauroit toujours céder à l'effet des remèdes, qui semblent d'abord les plus appropriés.

Cette disposition est ordinairement une impression fort antérieure à la maladie; elle produit dans cette partie de la faiblesse, ou de l'irritation; elle lui donne une modification propre à ce que l'effort critique de la maladie y soit presque nécessairement déterminé.

Qu'oppose-t-on à ces vérités qu'il suffit de proposer, sans chercher à les appuyer par un détail de preuves initiales? Une excessive confiance dans des règles trop généralisées : *les saignées, dit-on, doivent nécessairement dégager les vaisseaux embarrassés; les évacuans doivent emporter la matière des dépôts; les altérans doivent atténuer, délayer, adoucir les liqueurs, détruire peu à peu les embarras qui se trouvent dans les couloirs, & dans les vaisseaux capillaires.*

Mais ces remèdes font-ils toujours

ce qu'ils *doivent* faire ? Leur action, celle même des plus efficaces ne suppose - t - elle pas, pour le succès, un concours favorable de la part des organes ?

Avec de pareils axiômes, on ne trouveroit plus de maladies incurables par leur nature ; on pourroit toujours se proposer avec confiance de *débarasser*, de *fondre*, d'*évacuer* : voilà les suites nécessaires d'une théorie trop répandue & trop accréditée.

Cette théorie avoit conduit quelques Médecins du dernier siècle à imaginer qu'il étoit possible de prévenir, ou de faire avorter la petite-vérole au moyen des *lavages*, des *évacuans*, & des *altérans* ; ces remèdes *pourvoient*, ils *devoient* même détruire la matière de la petite-vérole, ou la diriger vers les couloirs généraux : la petite-vérole n'est qu'une *inflammation générale*, une maladie *éminemment inflammatoire*, & qui tend à la suppuration : il n'y a qu'à empêcher cette suppuration.

Les Médecins, dont il est question, raisonneient très - conséquemment à

leurs principes ; & supposé qu'il eût été possible d'accoutumer la petite-vérole à leur méthode , ils l'y auroient accoutumée ; (s'il est permis d'employer des expressions figurées , par lesquelles on n'avoit que trop réussi à donner une sorte de vogue à des idées puériles , & à des entreprises téméraires).

Mais il est assez généralement reçu aujourd'hui , qu'il y auroit beaucoup plus de danger d'épuiser par une suite de remèdes , les forces des personnes qui n'ont point eu la petite-vérole , que de vraisemblance de parvenir à empêcher qu'ils ne l'eussent ; il seroit encore plus dangereux de faire avorter la petite-vérole lorsqu'elle est en train de se montrer : on peut aisément établir une comparaison entre la petite - vérole & la plûpart des maladies sujettes à la suppuration.

Telle est , pour le dire en passant , la souplesse de la théorie , ou pour mieux dire , le peu de consistance de ce qu'elle enseigne , que bien des gens regardent aujourd'hui la plûpart des moyens qu'on avoit cru propres

à prévenir la petite-vérole, comme très-utiles & même comme nécessaires, pour rendre la petite-vérole plus facile, plus heureuse, & plus critique.

Quelques-uns des Partisans de l'*inoculation* ne cessent de publier qu'il faut *préparer* les sujets avant de les *inoculer*; ils prétendent qu'un des grands avantages de l'*inoculation* est de pouvoir *préparer les malades*; c'est-à-dire, les *rafraîchir*, *purger les mauvaises humeurs*, *favoriser la transpiration*, *ouvrir tous les couloirs*, *délayer le sang*, *l'adoucir*, & le rendre plus *fluide*.

Il est permis d'avancer, sans prendre parti dans aucune dispute, que la valeur réelle des *préparations* ne paroît pas assez exactement déterminée; on ne peut pas dire bien précisément ce qu'il faut faire en *préparant* & *pour préparer*; il y a, par conséquent, des soupçons bien légitimes à former sur les avantages des *préparations*; bien des gens font, pourtant, sonner très-haut ces avantages prétendus; ils en tirent des argumens

moins solides que séduisans , en faveur de l'inoculation.

Revenons à ce qui concerne plus particulièrement la suppuration à la suite des maladies aiguës ; elle est critique ou symptomatique , ou l'un & l'autre en même-tems : elle est quelquefois nécessaire & même inévitable , vû la disposition particulière du malade ; ou bien il est possible de l'éviter en détournant par des moyens appropriés , la disposition qui peut la produire.

L'état de la partie dans laquelle une suppuration paroît se préparer , mérite une attention particulière ; si c'est un organe qui ait des vaisseaux excrétoires , on peut se flatter jusqu'à un certain point qu'ils donneront passage aux matières de la suppuration : si cette partie n'est point un organe excrétoire , ou que la suppuration se fasse bien avant dans le tissu de l'organe , elle est sans contredit plus dangereuse ; si la partie affectée est extérieure c'est un grand bien ; c'est un grand mal si elle est interne.

Les suppurations au cerveau , celles

du corps, du foie; celles des parties externes, des intestins, sont, comme personne ne l'ignore, beaucoup plus à craindre que les suppurations des glandes de la gorge; celles du poulmon, de la matrice, des reins, des parois internes des intestins: les dépôts qui se forment dans les extrémités sont presque toujours les plus favorables.

- Ainsi fut-on aussi assuré qu'on l'est peu de l'efficacité des moyens propres à prévenir une suppuration; les dépôts qui paroissent devoir se placer heureusement ne devroient pas être traités comme ceux qui menacent des parties essentielles à la vie. La loi qui tendroit à les prévenir tous, & à détruire ceux qui auroient déjà commencé à se former, seroit une loi trop générale.

On fait de quelle ressource sont les dépôts qui s'évacuent par l'expectoration, par la voie des urines, ou par celles des intestins, &c. Ce seroit aller directement contre l'expérience, que de ne pas compter au besoin sur l'action de ces vaisseaux excrétoires;

ainsi loin de vouloir toujours détourner un dépôt critique, qui paroît vouloir se faire dans ces parties, il faut au contraire le favoriser quelquefois.

Quant aux dépôts dans les viscères dénués de vaisseaux excrétoires, le cerveau, par exemple; il est certain qu'il faut employer tous les moyens propres à les éviter, sans pourtant se mettre au risque de détruire les forces du malade.

Or, il est rare que la disposition d'un dépôt au cerveau se manifeste assez évidemment, pour que les indications d'une méthode propre à le détourner, doivent prévaloir sur la nécessité de soutenir les forces. Il n'est pas aisé de constater qu'on a *prévenu un dépôt qui se seroit fait au cerveau*, ou bien que ce dépôt déjà formé *a été emporté par les secours de l'art*: ceux qui ne cessent de répéter ces propositions, seroient souvent bien embarrassés, s'il falloit en prouver la vérité.

Il y a beaucoup de cas dans lesquels les malades sont fort heureux

qu'il se fasse des dépôts dans les parties extérieures; il est beaucoup plus sûr, alors, d'aider une suppuration, que de tenter une résolution, ou un *repompement* de matières, toujours dangereux & incertain.

On fait ordinairement un raisonnement fort spécieux au sujet des dépôts critiques: on dit *qu'il y en a moins aujourd'hui que du tems d'Hippocrate, & qu'ils n'arrivent que dans les malades qui ne veulent pas faire des remèdes*. Mais est-il bien assuré qu'il y ait en effet moins de dépôts purulens, aujourd'hui, que du tems d'Hippocrate, dans les maladies de l'espèce, dont Hippocrate a donné l'histoire? Si un Médecin rassembloit exactement toutes les Observations qui se font dans une contrée pendant plusieurs saisons; si on faisoit, par exemple, l'histoire de tous les dépôts qui arrivent journellement dans les Hôpitaux de Paris, on verroit qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne paroît le croire.

Il n'y a point de Médecin qui ne fit un aveu manifeste d'*inexpérience*,

s'il convenoit qu'il n'a pas vû des dépôts dans presque toutes les parties du corps , & qui sont survenus , à peu de chose près , comme ceux dont Hippocrate parle.

Quand même il seroit vrai qu'il y eut quelquefois des dépôts , qu'il fut possible de prévenir heureusement , il ne sera pas moins certain que ces cas - là sont extrêmement rares ; une loi de pratique , fondée sur des cas si peu communs , ne pourroit qu'avoir de grands & de fréquens inconvéniens.

On voit tous les jours des malades jettés dans le plus grand danger , ou dans les plus difficiles convalescences , par les seules précautions prises contre les dépôts ; au contraire , un dépôt critique , bien ménagé , épargne beaucoup de remèdes , & procure un prompt & sûr rétablissement.

Quoi qu'il en soit , tout concourt à prouver que les maladies internes , sujettes à des suppurations , doivent être mises dans la classe de celles qui sont composées d'une aiguë & d'une

chronique; c'est-à-dire, que le lieu dans lequel le dépôt se forme, est un lieu affecté depuis longtems : *les maladies longues ont coutume d'être jugées par des abcès (1)* : on verra dans la suite qu'il y a des maladies si cruelles, qu'il n'y a pas même à attendre la ressource des dépôts purulens (2).

L'histoire des signes critiques, tirés des divers mouvemens du pouls, ne servira pas peu à fixer les indications qu'il faut prendre dans ces maladies, lorsqu'elles se tournent à des dépôts purulens.

Si le pouls, qui a été pendant les commencemens *convulsif*, & *non-critique*, se développe un peu, avec une roideur considérable de l'artère, & reste pendant quelques jours dans cet état, on doit craindre une suppuration.

Lorsque la suppuration est déjà commencée, le pouls se trouve comme indécis entre le critique & le non-critique. Il est critique, en ce qu'étant

(1) Galien, comment. des Epid.

(2) Voyez le Chap. 30.

développé, il indique que le fonds d'irritation est diminué; il est *non-critique*, en ce qu'il n'indique aucune des voies par lesquelles se font les crises ordinaires.

Si le pouls vient insensiblement à indiquer un mouvement critique du côté de quelque couloir, ou qu'il devienne, par exemple, pectoral, ou intestinal, on doit présumer que le pus s'évacuera par les organes, dont le pouls annonce l'action : il faut observer cet événement avec beaucoup d'attention, pour pouvoir le favoriser à propos.

Il y a des pouls de *suppuration*, compliqués avec le pouls d'irritation, & alors la maladie rentre dans la classe de celles qui ont été décrites au Chapitre XXVI. Ce sont des suppurations en partie *critiques*, & en partie *symptomatiques* : il faut arrêter, s'il se peut, les *symptomatiques* & ménager les *critiques*.

Passons à l'examen des trois propositions énoncées au commencement du Chapitre présent.

1°. Il est quelquefois impossible, quoi qu'on fasse, d'éviter une suppuration.

OBSERVATION CLIII.

Bouffissure générale, point de côté, mais ancien, auquel s'est jointe une fièvre continue, dans un jeune homme adonné à toutes sortes d'excès : les symptômes ne diminuent point par l'usage des remèdes ordinaires commencés au quatrième jour ; le pouls devient constamment plus tendu, plus dur, même plus fort, malgré vingt-huit saignées du bras, faites en vingt jours à-peu-près ; le malade a craché du pus après ce nombre de saignées : il prenoit des apozèmes & souvent de légers purgatifs qui ne produisoient presque point d'évacuation ; il crachoit si abondamment, le pouls étant devenu un peu *peccoral*, qu'il sembloit que toute la matière de la bouffissure passât par la poitrine ; il fut très-foible vers le trentième ; le pouls devint plus *convulsif*,

l'enflure reparut aux jambes & aux poignets ; il mourut vers le quarantième jour crachant sur les fins beaucoup de pus fétide & sanguinolent.

OBSERVATION CLIV.

Autre maladie à-peu-près de la même espèce dans un jeune homme sujet à des rhumes considérables, & qui depuis cinq jours étoit bouffi par tout le corps, avec fièvre, point de côté, toux ; trente-deux saignées, beaucoup d'apozèmes & de kermès, pendant l'espace de trente-un jours, n'ont pas empêché un dépôt purulent au poumon ; le malade crachoit encore du pus, & étoit dans le marasme vers le quarante-unième jour ; le poulx a toujours été *dur, peu développé, convulsif, brusque, non critique*, ce qui paroît devoir être attribué à une mauvaise disposition de la poitrine en partie naturelle, & en partie contractée par les rhumes dont elle étoit fréquemment affectée.

OBSERVATION CLV.

Une fille âgée de vingt-trois ans, d'une forte constitution, devint après avoir eu beaucoup de chagrin, pâle, mal réglée, sujette à des douleurs erratiques, principalement aux jambes & aux cuisses; elle fut attaquée de la fièvre avec un point de côté peu douloureux vers l'hypocondre droit; la fièvre étoit assez vive: la malade fut secourue dès le commencement, saignée jusqu'à neuf fois, purgée trois ou quatre, & elle prit du kermès & des apozèmes de toute espèce, qui entretenoient une liberté continuelle du ventre; les matieres n'étoient point bilieuses, les urines étoient crues, le pouls *non critique*, serré & dur; la maladie parut pourtant céder au quatorzième; comme il restoit un peu de fièvre, & qu'elle augmenta vers le vingt-unième avec un retour du point de côté, on fit une dixième saignée: la malade fut repurgée, elle se crut en convalescence vers le vingt-huitième, elle se leva le vingt-neuvième.

me & le trentième : le trente-unième faisant un tour dans sa chambre, elle sentit tout d'un coup une douleur vive à la cuisse & à la jambe droite; il se fit en moins d'un quart-d'heure un engorgement considérable, depuis l'aîne jusqu'au pied; on appliqua un cataplasme maturatif, & peu de tems après on donna issue à la matiere par l'application de la pierre à cautère: il sortit une grande quantité de pus, & la malade fut guérie au trente-cinquième jour, depuis la formation de ce dépôt.

Il faut remarquer que cette crise survint dans le tems qu'on attendoit les règles (1); elles ne parurent pas non plus que le mois suivant; avec ceci de singulier, qu'au bout de ce dernier mois, à-peu-près, la jambe gauche se gonfla presque aussi promptement que l'avoit fait la droite le mois précédent; mais cette jambe gauche ne suppura point.

(1) Voyez le Chap. 32.

OBSERVATION CLVI.

Une fille très-bien constituée, jeune, & qui avoit une suppression de règles depuis trois ou quatre mois, éprouvoit depuis ce tems-là une douleur constante, mais peu considérable du côté droit, dans l'intérieur des muscles fessiers; on employa inutilement des remèdes intérieurs & extérieurs les plus appropriés: enfin la malade fut baignée dans un bain d'eau minérale chaude; dès le quatrième bain, la douleur augmenta si fort & avec une *tension* du pouls si considérable, qu'on fît en peu de tems onze saignées du bras; la tête se prit, on fit encore cinq saignées du pied avec peu de succès; on ne cessa de faire couler le ventre & d'employer toute sorte de remèdes ordinaires; malgré cela la fesse fut en suppuration vers le vingt-unième jour; on fit plusieurs incisions, & la malade mourut vers le trentième, le pouls ne s'étant jamais *développé* que légèrement.

OBSERVATION CLVII.

Pleurésie dans un homme d'un tempérament fort & sec, âgé de quarante ans, qui s'étoit livré à un travail excessif, & qui avoit eu des peines d'esprit depuis quelque tems; il fut secouru dès le deuxième jour; la fièvre ni la douleur de côté ne céderent point à onze saignées faites en neuf jours; il y eut du pus dans les crachats dès le onzième; la fièvre augmenta vers le quatorzième, ainsi que le point de côté; on fit encore trois saignées du bras, on continua d'employer tous les délayans, béchiques & laxatifs ordinaires: il parut vers le vingt-unième une tumeur dans l'endroit où étoit placé la douleur de côté; ce dépôt s'ouvrit au moyen d'une emplâtre appropriée; il se trouva une côte cariée; le malade demeura en fièvre lente; on parvint néanmoins à cicatriser heureusement cette plaie par un long usage interne & externe de remèdes balsamiques & d'eau de Baréges: le poulx ne fut développé que par intervalles.

OBSERVATION CLVIII.

Un homme âgé de près de cinquante ans, sec, bilieux, sujet à des rhumatismes considérables, avoit une fièvre continue qui paroissoit presque également affecter la tête, la poitrine & le ventre; le pouls quoique *développé* de tems en tems fut presque toujours *non critique*; on fit quinze saignées du bras ou du pied, on usa beaucoup d'apozèmes laxatifs dont la plupart étoient aiguës par de l'émétique; tout cela n'empêcha point que vers le vingtième, il ne se fît à la cuisse droite, qui étoit le siège ordinaire des rhumatismes, un dépôt considérable de matiere purulente; ce dépôt fut ouvert, & ne fut cicatrisé que deux mois après l'ouverture: le malade étoit dans un état d'extrême foiblesse, & il n'étoit point encore exempt de fièvre au quatre-vingt-dixième jour de la maladie.

OBSERVATION CLIX.

Dépôt au cerveau dans un malade qui avoit une espèce d'enchiffrement habituel , & qui fut attaqué d'une fièvre continue considérable. Treize saignées du pied , deux de la gorge n'ont pû prévenir ce dépôt qu'on a trouvé à l'ouverture du cadavre.

Dépôt aux entrailles , & répandu dans la cavité du bas-ventre dans un jeune homme : un an avant sa maladie , il avoit fait un effort considérable qui avoit principalement porté sur le bas-ventre ; cette maladie fut une fièvre continue avec des douleurs aux entrailles ; on fit assez promptement treize saignées , on employa des délayans & laxatifs ordinaires , mais sans succès ; il se fit un dépôt dans les entrailles placé dans le mésentère & les intestins , & le malade mourut au dix-neuvième jour.

On ne finiroit point si on vouloit rapporter toutes les observations que la pratique journaliere fournit au sujet

jet des suppurations dans les maladies graves : ces dépôts sont surtout très-fréquens dans des corps mal constitués ou anciennement affectés ; & ils ne peuvent être évités par les traitemens les plus conformes aux règles de la théorie ordinaire.

Il est donc incontestable que les remèdes n'empêchent pas toujours les abcès dans les maladies aiguës : on est en droit de répliquer à ceux qui prétendent qu'on peut éviter tous les dépôts par l'usage des saignées & des autres secours de l'art , qu'ils confondent des maladies simples ou légères, avec des maladies graves & compliquées , & qu'ils croient avoir prévenu des dépôts , lorsque la maladie n'étoit pas susceptible de cette tournure.

2°. *Il est quelquefois fort dangereux que l'art entreprenne de détruire une suppuration que la nature prépare.*

OBSERVATION CLX.

Point de côté , fièvre continue , dans un soldat qui avoit eu l'année

précédente la fièvre quarte qu'on avoit traitée par un long usage de quinquina : on ne fit point de saignées jusqu'au cinquième jour ; il se présente au sixième une tumeur circonscrite vers les dernières vraies côtes du côté gauche ; cette tumeur est dure , douloureuse ; on craint une suppuration : le pouls est légèrement *pectoral* , mais dans un état marqué d'*irritation* : le malade est saigné trois fois ce jour-là ; la fièvre n'est pas diminuée au septième ; on fait encore trois saignées qui n'empêchent pas le progrès de la tumeur : le pouls devient de plus en plus *irrité* , *convulsif* ; on fait encore trois saignées , & vers le onzième jour , il paroît une tumeur à la partie interne de la cuisse du même côté , l'autre tumeur subsistant sans aucune diminution : le pouls est devenu *irrégulier* ; & il est resté *serré* & *convulsif* : dans la vûe de résoudre cette nouvelle tumeur , on fait encore deux saignées ; le malade s'affoiblit , les deux tumeurs ne font point de progrès : le malade crache du pus au vingt-unième , le pouls s'é-

tant un peu *relevé & développé* : depuis ce tems - là jusqu'au trentième jour, le côté & la cuisse s'ouvrent naturellement ; il en sort beaucoup de pus, il s'en trouve dans les urines ; le dévoyement survient, la poitrine s'engorge, le visage & les pieds se bouffissent, le pouls n'a plus de *consistance*, il est *irrégulier, foible & serré* : le malade meurt vers le quarante-unième jour avec trois ulcères, un à la cuisse, un au côté, & un autre dans le poulmon.

OBSERVATION CLXI.

Deux parotides survenues vers le dix-huitième jour, dans des fièvres malignes, pour lesquelles on ne cessoit de faire des remèdes : une de ces tumeurs étoit sur une femme âgée de quarante ans & qui n'avoit pas encore perdu ses règles ; l'autre sur un homme maigre, sec, & qui paroissoit avoir la poitrine un peu prise par cette dernière maladie.

Le pouls qui avoit été *irrégulier, convulsif*, un peu *développé* pendant

tout le cours des maladies , se *développa*, devint *supérieur* & plus *fiévreux* qu'il ne l'étoit , à l'apparition des parotides ; on tira de cette augmentation de fièvre l'indication pour la saignée du pied ; elle fut faite à tous les deux malades , & on soutint l'effet de cette saignée par des apozèmes purgatifs , & des cataplasmes émolliens & résolutifs jusques vers le vingt-sixième.

La parotide se racornit & diminua sans disparoître dans la femme : le pouls redevint *convulsif* , la tête se prit ; on fit une autre saignée du pied , la tête se dégagea & la parotide grossit de nouveau , non sans quelque révolution du pouls qui sembloit vouloir se *développer* , quoiqu'il demeurât *concentré* & *inégal* : le ventre couloit toujours beaucoup ; la tumeur suppurait ; il fallut l'ouvrir ; mais elle fut plus de deux mois à se cicatrifer ; & la femme resta foible , maigre , abattue : elle avoit la fièvre lente vers le centième jour , & n'avoit pas encore eu ses règles depuis sa maladie.

La parotide disparut dans l'hom-

me, le pouls se *resserra* & se *durcit*, la poitrine s'engorgea; la tête se prit, le ventre devint tendu & très-douloureux, & le malade mourut au trente-unième, le pouls étant toujours fort *petit*, & très-*abattu*, & n'ayant jamais repris le *ressort* qu'il avoit avant la dernière saignée.

OBSERVATION CLXII.

Dépôt qui se présente à la région lombaire droite dès le septième jour d'une fièvre de pourriture, dans un malade bilieux qui avoit souvent eu des fièvres d'accès: le pouls a été constamment *convulsif* & peu *développé*: on a déjà fait six saignées; on en fait une autre, & on les réitère jusqu'à onze, pour éviter la suppuration de cette tumeur extérieure; on n'y sent pas, en effet, de fluctuation vers le quatorzième, & vers le vingtième toute la cuisse de ce côté s'engorge, quoique les évacuations eussent été très-abondantes: le pouls au lieu de se *développer* complètement pendant ce tems-là, n'a cessé de se *resserrer*,

de s'affoiblir , & de devenir *compliqué*. La cuisse s'abcède en plusieurs endroits vers le trentième , il faut faire plusieurs contre-ouvertures ; la tumeur des lombes suppure aussi à la longue , & le malade meurt à la suite d'une abondante suppuration.

OBSERVATION CLXIII.

Fièvre putride dans une suite de couches : les vuidanges sont suspendues ; le pouls perd sa disposition *critique* après un frisson que la malade eut au cinquième jour ; le pied & la jambe droite s'engorgent dès le neuvième ; on a recours à tous les remèdes ordinaires pour résoudre ce dépôt ; on insiste beaucoup sur la saignée à cause de l'augmentation de la fièvre qui n'étoit autre chose que le *développement* du pouls joint , il est vrai , à un état d'*irritation* ; le dépôt a presque disparu vers le vingtième ; & au trentième la malade crache du sang & du pus ; le pouls est dans un *affaïssement* ou dans une *foiblesse* considérable qu'on caractérisoit de dimi-

union de la fièvre : il survient une douleur à la matrice , & il en sort long-tems après des matieres purulentes ; la malade reste plusieurs mois avec la fièvre lente , & n'a jamais pû reprendre ses forces.

Il seroit facile de citer plusieurs Observations pareilles, dans lesquelles une suppuration établie dans une des extrémités auroit vraisemblablement dégagé & mis à l'abri toutes les parties internes : on a vû des femmes dans lesquelles il est arrivé un changement étonnant dans le tempérament à la suite de ces dépôts de lait *avortés* : de vives coliques , des pertes , la fièvre lente , un état de spasme habituel , des mouvemens irréguliers dans les nerfs ; voilà les suites fréquentes de ces résolutions forcées ; un dépôt souvent peu considérable , auroit évité tous ces désastres.

Il n'est donc pas prudent de n'avoir jamais que la résolution en vûe dans les dépôts des maladies aiguës ; il est au contraire important que *dans de certaines maladies internes , l'art se réduise à aider la nature pour détermi-*

ner un dépôt de matiere purulente : c'est la troisieme proposition qui devoit être examinée , & qui est la suite nécessaire des deux premieres.

Au reste la formation d'un dépôt critique de matiere purulente a beaucoup de rapport avec ce que les Anciens nommoient la *coction* de la maladie. Il paroît , en rassemblant tout ce qu'ils ont dit des caracteres de cette *coction* , qu'elle n'étoit souvent qu'une espèce de suppuration ; il n'y a pas loin de l'expectoration critique des matieres cuites ou puriformes à une véritable suppuration ; & on peut porter , à-peu-près , le même jugement des autres excretions critiques qui terminent la plupart des maladies aiguës un peu longues (1).

On va ajouter quelque chose à ce qui a été déjà dit ci-dessus , au sujet du pouls de la suppuration.

Lorsque la suppuration est formée, le pouls change , la fièvre tombe ; » quand il se forme du pus en quel-

(1) Voyez le Traité des Fièvres , de M. Quetsnay.

» que endroit , la douleur & la fièvre
 » sont plus considérables , que lors-
 » qu'il est fait (1) : la formation d'un
 » abcès dissipe les accidens (2).

Il y a donc deux tems principaux à considérer dans la suppuration , celui où elle se forme , & celui où elle est faite : il y a de même deux états particuliers du pouls fort différens l'un de l'autre dans ces deux tems.

On trouve encore un troisième état du pouls des suppurations vraies , ou des dépôts de matiere purulente , qu'il faut distinguer avec soin ; c'est celui qui indique l'effort par lequel le pus est dirigé vers quelque organe excrétoire.

Le pouls d'*irritation* est toujours joint aux commencemens d'une suppuration , & il accompagne dans tous leurs tems les suppurations symptomatiques ; ce pouls est donc de très-mauvaise augure , s'il dure plus de tems qu'il n'en faut pour la révolution , qui

(1) Hipp aphor. 47. sect. 2.

(2) Galien , Comm. du liv. de la manière de vivre.

excite & dispose le mouvement de la suppuration favorable ou critique.

Le pouls *développé*, qui lorsqu'il se trouve *bien décidé* est essentiel à toute bonne crise, est le principal signe d'une suppuration, lorsqu'il se soutient pendant un tems considérable, & à plusieurs reprises, sans être joint à aucune des espèces de pouls qui désignent des excrétions, pourvu qu'il soit assez *fort*, & avec une *tension* notable de l'artere.

Lors donc que dans les maladies graves & compliquées, sur-tout dans des sujets anciennement mal disposés, on trouvera, la maladie étant assez avancée, un renouvellement d'*irritation* dans le pouls, suivi d'un *développement difficile* ou *géné*, & que cet état de *développement* se soutiendra un certain tems (1), sans être joint à aucune espèce de pouls *excréteur*, on doit presque toujours s'attendre à une suppuration; elle sera d'autant moins critique que le *développement* du pouls sera moins complet & plus souvent dominé par le pouls d'*irritation*.

(1) Voyez Chap. 33.

S'il arrive que les matieres des excretions critiques soient jettées sur quelque partie dénuée de conduits excrétoires , il se forme un abcès ; le pouls qui précède la formation de cet abcès , est à-peu-près comme celui qui précède toute coction , c'est le pouls d'*irritation* ; le pouls qui est joint à la formation presque faite de l'abcès , est fort approchant du pouls *développé* , il est même souvent *non févreux*.

Le pouls qui indique qu'un abcès va se vider par quelque excrétoire est celui qui appartient au genre d'excrétion qui se prépare ; ainsi l'expectoration du pus à la fin d'une maladie aiguë , est précédée du pouls *pectoral* plus ou moins *compliqué* ; il en est de même des autres couloirs.

Mais il arrive souvent que le pus se forme , & se vuide , ou se jette dans quelque cavité , ou bien qu'il s'accumule pour faire un abcès en même-tems ; c'est-à-dire , que la formation & l'évacuation du pus se combinent , ou se mêlent l'une à l'autre ; le pouls de la suppuration est alors *compliqué*

avec celui d'irritation & des différentes espèces de pouls *excréteurs*.

CHAPITRE XXX.

De la complication du Pouls dans la fièvre maligne.

IL n'en est pas de la fièvre maligne comme des autres espèces de fièvre : il n'y a point ici de marche constante : tout indique un *desaccord* & une incertitude générale ; cette fièvre se cache quelquefois sous l'apparence d'une simple incommodité : tantôt elle imite ou elle joue , si on peut ainsi parler , la santé la moins suspecte ; tantôt il semble se présenter des crises heureuses , qui sont d'autant plus funestes qu'elles paroissent plus favorables : en un mot , la fièvre maligne est un assemblage informe de presque tous les maux , & de toutes les incommodités possibles ; elle contient le germe de toutes sortes de symptômes les plus fâcheux ; c'est un

dérangement composé de celui de la plus grande partie des organes ; c'est une fièvre très-aiguë , qui est la suite de plusieurs maladies chroniques.

Ce grand nombre de symptômes , souvent opposés , ne sauroit dépendre d'une seule & même cause ; aussi tous les systèmes sur les causes des maladies , peuvent-ils trouver leur application dans la fièvre maligne ; cette maladie fournit des argumens à toutes les sectes , & aucune ne peut en fixer exactement la nature : il faut donc pour s'en former une idée complète , faire un mélange ou une combinaison de toutes les manières particulières de considérer les maladies ordinaires.

Les convulsions , la sécheresse , les spasmes , les douleurs vagues , les vices des sécrétions , & d'une marche fixe , sont des indices certains de la manière dont le genre nerveux est attaqué dans la fièvre maligne ; cette maladie est des plus *nerveuses* , considérée de ce côté-là ; mais il y a autre chose que du spasme & du décon-

certainement dans les oscillations des nerfs.

Ceux qui, dans l'examen des causes des maladies graves, ne s'attachent qu'à considérer l'état du cerveau, trouvent ici de quoi appuyer leur opinion : l'assoupissement, le délire, le saignement de nez, l'engorgement des vaisseaux & le sang extravasé trouvés à l'ouverture des cadavres leur fournissent des argumens qui ne sont pas peu spécieux ; mais un homme qui vient de recevoir un coup à la tête, & dans lequel le cerveau est blessé ou comprimé, non plus qu'un épileptique ou un maniaque, n'ont pas une fièvre maligne ; il y a dans cette fièvre autre chose qu'une affection du cerveau.

La tension du ventre & de la région épigastrique, l'inertie, ou les mouvemens irréguliers, & l'extrême sensibilité des entrailles, les vomissemens, les dévoyemens, symptômes presque inséparables de la fièvre maligne, prouvent sans doute l'affection des premières voyes : il y a pourtant autre chose que cette affection ; un

malade qui a une inflammation du ventre, une colique bilieuse, ou convulsive, un choléra-morbus, n'a pas pour cela la fièvre maligne.

Il faut en dire autant des affections de la poitrine; les maux de gorge, les convulsions du diaphragme, l'irrégularité & la difficulté de la respiration, tout manifeste l'embarras de la poitrine dans la fièvre maligne; mais cette fièvre n'existe pas dans une simple fluxion de poitrine, & dans d'autres maladies des parties contenues dans cette cavité.

Ceux qui regardent les dérangemens de la transpiration & les affections de la peau, comme les causes de presque toutes les maladies, peuvent aussi appuyer leur système de l'histoire de la fièvre maligne; la sécheresse & la chaleur brûlante de la peau, les sueurs irrégulières, les éruptions de toutes les espèces, les dispositions éréthipélateuses & même œdémateuses, qui sont autant de symptômes de cette fièvre, démontrent les embarras de tout l'organe cutané; mais cette partie peut être affectée de plusieurs de

ces accidens , sans que cela suppose une fièvre maligne.

Il est évident que le système des *Humoristes* n'est nulle part aussi spécieusement appliqué que dans l'explication de plusieurs des symptômes de cette fièvre ; la dissolution du sang, sa coagulation , ses vicieux mélanges son une suite nécessaire de la suspension des sécrétions ; la matière de la transpiration , la bile , l'urine retenues dans le sang de ceux qui ont la fièvre maligne , ne peuvent qu'altérer & décomposer les liqueurs , & donner lieu à tous les vices dont elles sont susceptibles ; cependant les maladies qui paroissent le plus dépendre de ces différens vices des liqueurs , telles que la jaunisse , les hydropisies , les reflux de lait , ne sont point des fièvres malignes , non plus que les cachéxies ordinaires.

C'est donc avec raison que la fièvre maligne doit être regardée comme le fonds de plusieurs maladies jointes ensemble : un malade attaqué de cette fièvre bien caractérisée , a tout à la fois le cerveau embarrasé ,

les nerfs pris, les humeurs altérées, mal combinées; il a toutes les espèces d'embarras qui peuvent être les causes de plusieurs maladies du ventre, de la poitrine, de la tête & des autres parties; il est, pour ainsi dire, dans l'état qui pourroit constituer un *scorbut aigu*; tous les couloirs sont étranglés, tous les vaisseaux sont inégalement engorgés (1).

Aussi l'ouverture des cadavres des personnes mortes d'une fièvre vraiment maligne, démontre-t-elle que tous les viscères sont *échimosés*, meurtris, prêts à entrer en putréfaction, semblables aux chairs d'un animal qui a été forcé par la course: aussi la fièvre maligne, bien caractérisée, n'est-elle souvent, si on peut le dire, qu'une agonie allongée; c'est un renversement presque total de l'œconomie animale; une sorte de délire de la nature & le plus dangereux écueil de l'art.

L'inflammation dont on fait souvent l'objet principal du traitement

(1) Voy. Instit. Médicin. pag. 85.

dans la fièvre maligne, ne paroît pas, à beaucoup près, aussi à craindre que d'autres symptômes de cette maladie: il est vrai qu'elle s'y trouve quelquefois jointe; mais une fièvre inflammatoire ou ardente, est bien distincte de la fièvre maligne; peut-être même l'inflammation est-elle une sorte de ressource dans la fièvre maligne, soit qu'il y ait un engorgement *suppuratoire* fixé dans un lieu particulier, soit que l'inflammation soit générale, &c, comme on dit, dans le sang; c'est par son moyen que la nature & l'art viennent quelquefois à bout de cette cruelle maladie, ce qui sera remarqué dans la suite de ce Chapitre.

Il est donc naturel de penser que la fièvre maligne se prépare souvent de fort loin, & qu'elle n'est que le produit de plusieurs incommodités, ou de petites maladies négligées: elles mettent beaucoup de tems à faire leurs progrès; elles éclatent enfin, & se combinent de manière à produire des effets pernicioeux, en attaquant la vie de tous les côtés, & dans tous ses fondemens.

Un état constant de chagrin, d'excessive crainte, ou de contention d'esprit; une longue suite d'exercices pénibles, tout cela donne peu à peu au genre nerveux un certain degré de tension & de *sensibilité*, qui lui fait perdre la souplesse nécessaire pour ses fonctions; delà une infinité d'obstacles à la liberté des sécrétions & des excrétions, &c.

C'est au moyen de pareilles dispositions, que plusieurs causes qui seroient à peine en état de produire des incommodités graves ou des maladies ordinaires, peuvent occasionner une fièvre maligne; il est en effet bien difficile de concevoir qu'un corps bien sain puisse tout d'un coup acquérir le degré de désordre & de dépravation propre à la fièvre maligne: on connoît l'activité de certains poisons & leurs effets funestes; mais il n'est pas démontré qu'ils existent dans toute fièvre maligne; & quand même ils existeroient, ils supposent la plupart, un dérangement particulier, dans les corps sur lesquels ils trouvent le plus à mordre.

La contagion même de la peste a été mise en doute par des hommes forts & par des esprits déterminés, qui ont prétendu que la peur, qui est presque toujours l'effet d'une foiblesse de constitution, est une des causes principales des effets les plus funestes de cette contagion : ils ont remarqué que les gens pauvres, mal nourris depuis longtems, & qui, par leur état de misère, craignent de manquer de tous les secours nécessaires, sont les plus sujets à être attaqués de la peste ; il n'y a point d'épidémie qui ne commence par attaquer les corps cacochimes, & les pauvres gens, qui ont presque toujours l'ame abbatue par leur mauvaise situation : il est enfin peu de maladies malignes qui attaquent des corps bien sains ; elles arrivent presque toujours à ceux qui ont été éprouvés par une suite d'incommodités ou de maladies, & surtout de peines d'esprit.

Enfin, la fièvre maligne est une maladie très-*compliquée*, ou le résultat & la fin de plusieurs maladies chroniques ; ou bien un dernier effort de

l'état de gêne , dans lequel plusieurs incommodités graduées ont mis la plus grande partie des organes.

Cette maladie suppose beaucoup de force & d'activité dans les sujets qui en sont attaqués : ils doivent être constitués de manière à pouvoir long-tems résister aux incommodités qui précèdent la fièvre maligne : les maux de tête, les lassitudes, les indigestions, &c. auroient été des maladies réelles pour des corps foibles ; toutes ces révolutions même réitérées ne sont que des impressions sourdes & passagères dans des corps forts ; ils se soutiennent par leur activité & par la vivacité de leurs mouvemens : s'ils succombent , ce n'est qu'après des coups redoublés, & en conservant toujours un degré de force proportionné à leur état naturel ; ainsi il faut être au fonds d'une constitution robuste pour avoir la fièvre maligne.

Rien ne caractérise autant cette fièvre bien *exquise* que la *zournure* particulière que le suc nourricier, & tout le tissu cellulaire ou muqueux a reçu dans cette fièvre : ce tissu paroît

être le siège des inflammations, & le suc nourricier la matière des suppurations ordinaires (1) : ils sont tellement *dépravés* dans la fièvre maligne , qu'il ne peut s'y former aucune vrai inflammation , ni aucune suppuration parfaite ; il ne s'y forme que des embarras , & des engorgemens gangréneux.

Or , l'histoire des gangrenes externes & internes , apprend que cette dépravation du tissu des parties se travaille & se prépare de loin ; les organes qui ont perdu de leur ressort, par exemple , à l'occasion des grands froids , & qui ne reçoivent point de nourriture à cause de l'étranglement des vaisseaux , sont les sièges ordinaires des gangrenes , qui viennent de cause interne ; c'est ainsi que tous les points gangreneux , si communs dans la fièvre maligne , sont vraisemblablement dûs à des impressions anciennes du tissu muqueux , du parenchyme des parties , ou de leurs derniers vaisseaux.

(1) Voy. Thèse des Eaux d'Aquitaine.

L'examen du sang tiré dans la fièvre maligne, indique souvent que ce sang a perdu la substance muqueuse ou nourricière, qui en lie les parties : cette substance est la matière des *couvernes* & des concrétions qu'on trouve dans les palettes : il s'en trouve dans cette fièvre beaucoup moins que dans plusieurs autres ; c'est-à-dire, qu'il n'y a point de pléote de suc *muqueux* ou nourricier, comme dans les maladies inflammatoires.

Cette privation de suc muqueux paroît être le plus funeste des symptômes dans la fièvre maligne ; c'est pourquoi il n'y a pas ordinairement de suppurations, ni de coctions à attendre dans cette fièvre ; cependant les observations réitérées & approfondies sans préjugé, indiquent que ce n'est guères qu'à la faveur des suppurations & des dépôts inflammatoires, que l'on guérit de la fièvre maligne.

On pourroit avancer que le suc muqueux qui nage dans le sang a quelque rapport au blanc-d'œuf, qui clarifie une liqueur trouble dans laquelle

le on le fait bouillir ; ce suc porté dans tous les vaisseaux par le mouvement de la fièvre , entraîne avec lui toutes les parties d'urine , de bile & d'autres liqueurs excrémentitielles ; il clarifie , pour ainsi dire , le sang , c'est ce qui se passe dans les maladies putrides inflammatoires.

On ne peut pas se flatter qu'il en soit de même de la fièvre maligne , dans laquelle le suc muqueux ne roule pas avec le sang , soit qu'il reste cantonné dans le tissu cellulaire qui a perdu toute son activité ; soit qu'il ait dégénéré lui même , ou qu'il manque presque entièrement dans un corps attaqué de la fièvre maligne , & qui s'est mal nourri depuis longtems : il faudroit donc , suivant cette idée , exciter , s'il étoit possible , une inflammation vraie & une plétore du suc muqueux dans la fièvre maligne : c'est là peut-être ce que produisent les remèdes les plus appropriés dans cette maladie.

Les vésicatoires donnent une secousse générale au genre nerveux , ils excitent une disposition inflammatoire ,

toire , ils fixent les courans des humeurs , & les traînées irrégulières des oscillations ; ils donnent du ressort à tout le parinchime des parties , dans lesquelles séjourne le suc nourricier : il faut en dire autant , à peu près , des remèdes internes les plus forts , des émétiques , des cordiaux , des sudorifiques , du quinquina , des esprits volatils , qui sont , pour ainsi parler , de légers vessicatoires internes.

On fait que les Japonnois & les Chinois ne traitent plusieurs maladies que par le cautère actuel , & par l'*acupuncture* ; c'est-à-dire , en faisant sur toute l'habitude du corps une grande quantité de petites playes , avec des instrumens aigus qu'ils plongent dans les chairs ; ils forment , par-là , plusieurs *noyaux* inflammatoires ; ils réveillent le tissu muqueux ou cellulaire , dont les nerfs sont engourdis ; ils font rentrer , au moyen de cette irritation donnée à la peau , une certaine quantité de suc muqueux dans le sang ; & la nature se sert de ce suc pour la coction , pour les excrétions , & pour former des dépôts qui favo-

risent les mouvemens critiques.

C'est ainsi, à quelques différences près, que » les Hottentots, après s'être graté le creux de l'estomac jusqu'à ce qu'il en sorte du sang, y appliquent une composition dont ils ont avalé une partie, & ils se guérissent, par là, de la blessure d'une flèche empoisonnée (1) «.

» L'usage du Continent de l'Amérique étoit de p'onger, les gens atteints de la fièvre, dans l'eau froide, & de les mettre ensuite devant un grand feu, après quoi, quelques heures de sommeil achevoient de les rétablir (2) «.

Enfin, il y avoit des Sauvages, qui guérissoient les malades en les faisant courir à perte d'haleine au sortir du bain, & en les fouettant très-vigoureusement pendant cette course.

Les ventouses scarifiées, si vantées par les Anciens, faisoient à peu-près les mêmes effets, ainsi que les ligatures aux extrémités, & tous les topi-

(1) Histoires Génér. des Voyages, Liv. XIV, Tom. V. pag. 164.

(3) *Ibid*, Tom. VII. pag. 87.

ques plus ou moins irritans. Ne pourroit-on pas les attendre des bains chauds ou froids ?

Quoi qu'il en soit, il semble que ceux qui, dans la fièvre maligne, ne sont occupés qu'à prévenir les progrès de l'inflammation par beaucoup de saignées, par des boissons abondantes, des purgatifs aigrets ou légèrement *aiguifés*, n'attaquent pas la maladie dans son principe ; ils sont fort éloignés de favoriser l'espèce d'effort critique, que la nature pourroit exciter par elle-même.

Le pouls est très-*compliqué* dans la fièvre maligne : il est *concentré*, *petit*, *déprimé*, quelquefois même plus *lent* que dans l'état naturel, au commencement de la maladie : le *développement* n'est jamais *complet* dans les progrès de la maladie ; le pouls reste toujours *non-critique*, très-*convulsif* au fonds, mais d'ailleurs fort *variable*, plus ou moins *tremblant*, suivant l'expression d'Hippocrate : s'il paroît bien *critique*, ce n'est que pour un tems, qui ne suffit pas pour assûrer la crise.

En un mot, il n'y a rien de fixe ; rien de déterminé dans la marche du pouls de la fièvre maligne ; il est même quelquefois d'autant plus à craindre, qu'il semble plus *naturel* ou plus *critique* ; au reste, tout dépend du degré de malignité ; lorsqu'il arrive que la fièvre maligne prend une bonne tourne, alors le pouls reprend son état & sa marche ordinaire, ou bien critique.

Il seroit inutile de rapporter ici des Observations à cet égard, d'autant mieux que l'application de tout ce qui a été dit jusqu'ici au sujet du pouls *critique*, différemment *compliqué* avec le pouls d'*irritation*, se présente assez naturellement, & paroît suffire jusqu'à ce qu'on ait plus exactement examiné le pouls d'*irritation*, ou *non-critique* (1).

(1) Voyez le dernier Chapitre.



CHAPITRE XXXI.

Des différences qui se trouvent quelque fois dans le Puls des deux côtés & dans celui des différentes parties du corps.

TOUT phénomène singulier mérite d'être observé avec soin, quelque rare qu'il soit & quelque bizarre qu'il semble d'abord; la nature se cache souvent sous l'uniformité d'un ordre accoutumé; elle ne se décèle quelquefois que par des phénomènes extraordinaires.

Il est certain que la marche ordinaire de la circulation du sang, rend les battemens *semblables*, ou *isochrones*, au moins dans les grosses artères d'un même sujet; il est vrai aussi qu'on trouve en pratique des cas dans lesquels les battemens des grosses artères, d'un même sujet, sont plus ou moins *dissemblables* ou *heterochrones*.

Les Modernes ont établi la théorie & l'application de la saignée sur la régularité des battemens des artères ; la plûpart d'entre - eux ne font aucune attention aux deux côtés du corps ou à leurs différences ; la saignée leur paroît toujours égale , au moins dans la pratique , soit qu'elle se fasse du côté droit ou du côté gauche ; les Anciens plus scrupuleux faisoient souvent choix d'un des deux côtés pour la saignée ; il y auroit de l'injustice à rejeter entièrement les idées des Anciens , si ces idées pouvoient trouver quelque fondement dans l'observation.

L'histoire du pouls , qui est l'objet principal de cet ouvrage , exige qu'on en décrive les moindres variations ; les conséquences qu'il y auroit à tirer de ces variations ne doivent ici qu'être pressenties , ou plutôt il faut les attendre des vrais Maîtres de l'Art.

Ce sera à eux à décider s'il seroit indifférent de faire , par exemple , une saignée du bras au côté droit ou au côté gauche , supposé que le pouls

indiquât que le sang remonte d'un côté & qu'il descend de l'autre ; c'est-à-dire que le pouls fût *capital* d'un côté & *ventral* de l'autre.

L'observation paroît démontrer la possibilité de cette supposition , mais cette démonstration ne peut encore entraîner après elle aucune conclusion pour la pratique.

Chaque partie a son *département* particulier dans le corps & dans le tissu *muqueux* , dans lequel elle est comme nichée ; le foie fait souvent ressentir son action sur tout le côté droit , & point sur le gauche ; la rate au contraire change souvent tout le côté gauche , depuis la tête , le visage , le col , l'épaule , jusqu'au pied , sans faire aucune impression sur le côté droit.

Il semble que le corps soit divisé naturellement en deux parties qui se rencontrent ou se joignent dans le milieu ou dans l'axe ; ces deux parties ou ces deux moitiés sont ordinairement disposées de la même manière , ou montées sur le même ton ; mais elles ont vraisemblablement leur

action & leurs indispositions particulières : une partie enflammée peut être regardée quelquefois & en certains tems de l'inflammation , comme une sorte d'organe particulier , qui fait , pour ainsi dire , *corps à part* , & dans laquelle les mouvemens des humeurs ne se font point suivant la marche & les forces générales de la circulation. Ces vérités étoient dans le fonds connues des Anciens (1).

Hippocrate a avancé que » lorsque » l'artère du coude bat , le malade » doit entrer en frénésie , à moins » qu'il ne soit d'un tempérament fort » vif ». Le peuple répète souvent un raisonnement fort approchant de la remarque d'Hippocrate ; *le pouls est , dit on , remonté jusqu'au coude , ainsi le malade est fort mal* ; il ne sera point inutile de consulter l'observation au sujet de cette assertion.

Il est bon , aussi , de consulter la même observation sur les battemens

(1) Voy. Recherches Anatomiques sur la position des Glandes. Voyez aussi Thes. des Eaux Minérales d'Aquitaine. Thes. XXVII, &c.

des artères carotides , & des artères du bas-ventre , ainsi que sur celui des veines jugulaires : il n'est pas démontré que toutes ces questions , & d'autres semblables , soient entièrement inutiles ; elles serviront , peut-être , un jour à établir des vérités importantes.

Au reste , on ne sauroit supposer qu'il y ait personne d'assez peu instruit pour ignorer que la différente position des artères dans les deux poignets d'un même sujet , peut occasionner quelques changemens apparens dans le pouls des deux côtés ; mais il n'est pas possible d'expliquer toutes les différences relatives auxquelles les pouls des deux côtés sont sujets , par la position des artères , ou par quelque autre conformation particulière.

OBSERVATION CLXIV.

Une Dame , qui se disoit incommodée , m'ayant prié de lui tâter le pouls , je lui dis que son pouls droit paroïsoit un peu *embarrassé* ; il tenoit

beaucoup du pouls d'irritation, il étoit avec cela fort disposé à devenir intestinal, les pulsations étoient irrégulières, mais il n'y avoit rien de bien déterminé; je demandai le pouls gauche que je trouvai plus développé, & très-tendant au nasal & au pectoral; d'où je conclus que le sang me paroissoit remonter à la tête & être fort disposé à se frayer des issues par la poitrine & par la gorge; la malade m'avoua que c'étoit-là son état, & qu'elle étoit sujette à des transports d'humeurs vers la tête, &c.

Je demandai de nouveau à tâter le pouls droit, que je dis indiquer quelque embarras vers le foie ou vers le côté droit de la matrice; la Dame m'apprit qu'elle avoit rendu, il y avoit quelque-tems, un dépôt qu'on disoit venir du foie, & qu'elle ressentait constamment quelque douleur vers la région de ce viscère.

Le pouls droit étoit donc, pour ainsi dire, fixé & dérangé par un point d'irritation habituelle vers le foie, & le pouls gauche étoit plus libre & disposé à porter vers les parties

supérieures; le pouls *ventral* & le *capital* se trouvoient dans le même sujet, l'un d'un côté, l'autre de l'autre.

OBSERVATION CLXV.

Passion hystérique avec des symptômes très-bizarres, dans une fille âgée de vingt-deux ans, & qui n'est point réglée depuis longtems; le pouls est continuellement *fréquent*, *petit*, *serré*, *égal*; il se développe du côté droit à la suite d'un long usage de remèdes; il devient assez *plein*, *irrégulier*, *inégal*, *légèrement rebondissant* dans quelques pulsations; les règles qui avoient cessé depuis six mois reparoissent en petite quantité, & lorsqu'elles finissent le pouls droit redevient *convulsif*; le pouls gauche ne change jamais; il a toujours été à l'ordinaire, *petit*, *serré*, *fréquent*, *égal*; la vérification de ce fait a été réitérée très-souvent pendant les sept jours qu'ont duré les règles.

La différence des deux pouls étoit

si considérable, que les personnes qui étoient auprès de la malade l'ont aperçue. Les vésicatoires furent appliqués quelques jours après : ils mordirent très-bien du côté droit, & ne firent rien du côté gauche.

OBSERVATION CLXVI.

Le pouls est *dur, vif, rebondissant à chaque pulsation* ; c'est-à-dire, *nasal* du côté droit ; le malade saigne du nez & seulement de la narine droite ; le pouls du côté gauche est *plein, mol, redoublé avec souplesse* ; c'est-à-dire, *pectoral* ; le malade crache des crachats presque *puriformes* : ce qui fait présumer que les crachats viennent du côté gauche de la poitrine ; comme le sang vient de la narine droite, c'est que le malade ne peut se coucher que très-difficilement sur le côté droit ; il est fort tranquille lorsqu'il est couché sur le côté gauche, sur lequel il dort.

Le pouls est *rebondissant, très-dilaté* & très-décisivement *nasal* du côté gauche ; il est *petit & serré* du côté

droit, il paroît même moins *fréquent* que le pouls gauche dans un malade qui saigne du nez, seulement de la narine gauche : Solano a dit, que
 » lorsque le *rebondissement* de l'artère
 » est plus considérable à un poignet
 » qu'à l'autre, le sang coule ordinairement en plus grande abondance
 » de la narine du même côté où le
 » *rebondissement* est plus sensible «
 M. Nihell est à cet égard de l'avis de Solano.

OBSERVATION CLXVII.

Une femme âgée de quarante-cinq ans a une obstruction qui paroît située dans l'ovaire droit ; elle en souffre quelquefois plusieurs jours de suite, & pendant ces tems de souffrance le pouls de ce côté qui est le droit, est un peu *irrégulier & intermittent*, à peu-près à chaque douzième pulsation ; celui du côté gauche ne l'est jamais ; il reste toujours assez *égal* : ces sortes de paroxismes sont ordinairement précédés de constipation, & suivis d'un léger dévoyement.

OBSERVATION CLXVIII.

Il n'est point rare de trouver une différence marquée entre les pouls des deux côtés dans plusieurs maladies.

Le pouls est quelquefois plus fort dans un bras attaqué d'une douleur rhumatismale & gonflé, que dans l'autre bras; on a même trouvé ce pouls du côté malade très-*naçal*, sans que le pouls de l'autre côté s'en ressentît; il y avoit du saignement de nez; on a de même trouvé le pouls du côté sain bien décidé au dévoyement; c'est-à-dire, *intestinal*, le pouls du côté malade n'étant que *tendu* & dans un état *convulsif*.

Les deux pouls sont très-souvent différens dans les attaques d'apoplexie, qui dégénèrent en paralysie d'un des bras; & le pouls du bras dans lequel la paralysie se forme, n'est pas toujours le plus *petit* & le plus *serré*.

Les personnes paralytiques d'une moitié du corps ont aussi souvent les

deux pouls différens ; celui du côté malade est presque toujours plus *foible*, plus *serré*, plus *petit*.

Les pouls des deux côtés sont quelquefois différens dans les pleurésies & les fluxions de poitrine ; celui du côté malade est plus *convulsif* ordinairement.

On a fait la même observation, & trouvé la même différence des deux pouls dans les maladies du foie & de la rate, dans la migraine, & même dans des maladies par cause externe.

La goutte bien décidée à un pied, rend quelquefois le pouls de ce côté beaucoup plus *serré* & plus *convulsif*, que celui de l'autre. On a fait la même remarque au sujet de la colique néphrétique.

Il se trouve des femmes qui, dans le tems des règles, ont les deux pouls différens, & qui éprouvent en ce tems-là, beaucoup plus d'irritation & de gonflement dans une des deux mamelles que dans l'autre ; c'est ainsi, que des nourrices perdent quelquefois leur lait d'une seule mamelle.

Il y a des personnes sujettes aux hémorroïdes, qui ont aussi les deux pouls fort différens ; il y en a qui n'ont des hémorroïdes que d'un seul côté , comme il y a des saignemens de nez d'une seule narine.

OBSERVATION CLXIX.

On apperçoit quelquefois les artères carotides battre beaucoup plus vivement que dans l'état naturel, sans que cette augmentation de force se fasse sentir dans le pouls des bras.

Il est arrivé de remarquer dans les carotides des *rebondissemens* qui annonçoient le saignement de nez ; le saignement survenoit, avec ceci de singulier, que les *rebondissemens* se faisoient beaucoup plutôt dans les carotides que dans les artères des bras.

On a trouvé quelques malades dans lesquels le sang paroïssoit couler continuellement dans les carotides qui restoient comme immobiles, sans se dilater ni se resserer ; la co-

l'homme de sang sembloit s'y mouvoir par l'action continuelle d'un piston, & les artères du bras avoient leur diastole & leur sístole presque à l'ordinaire.

Enfin, les carotides des deux côtés n'ont pas toujours la même force; il y arrive à cet égard des variations, à peu-près comme dans les artères des bras.

OBSERVATION CLXX.

Il n'est point de Praticien qui n'ait trouvé des malades, sur-tout des femmes, dans lesquels on sentoît des battemens violens des artères situées dans la cavité du bas-ventre, entre le nombril & le cartilage xiphoïde: ces battemens sont quelquefois beaucoup plus violens, que la force des artères du bras ne paroît l'indiquer: on les a quelquefois trouvés avec des espèces de *redoublemens* ou de *rebondissemens*, qui ne se faisoient pas sentir aux artères du bras.

Il arrive souvent que ces grosses artères du bas-ventre suivent exacte-

ment les mouvemens des carotides ; mais on sent aussi quelquefois ces battemens très-violens sans que les artères carotides battent extraordinairement ; celles-ci battent quelquefois très-vigoureusement sans que celles du bas-ventre se fassent sentir plus qu'à l'ordinaire.

On a trouvé un sujet qui avoit un saignement de nez abondant ; les artères carotides battoient très-violemment ; les artères du bas-ventre étant venues à se faire sentir & ayant battu avec beaucoup de force pendant deux jours , le cours des humeurs changea ; le saignement de nez s'arrêta , & il survint un dévoiement annoncé par les révolutions ordinaires du pouls.

OBSERVATION CLXXI.

Le pouls est quelquefois presque *insensible* au poignet de certains mourans ; il est très-*sensible* vers le coude , & plus *fort* dans ces momens-là , qu'il ne l'étoit dans le même endroit , pendant la meilleure santé du malade.

On trouve des malades , & sur-tout

des mourans dans lesquels le mouvement de l'artère est évidemment *successif*, c'est-à-dire, qu'on le sent d'abord vers le coude, & qu'il s'étend ensuite jusqu'au poignet par une sorte de mouvement progressif ou péristaltique.

Il y a des malades dans lesquels la toux fait un effet singulier sur les artères du bras ; on sent évidemment que la toux est comme le coup de piston qui pousse la colonne du sang qui semble disparaître, ou qui diminue sensiblement dès que la toux cesse.

Un de ces malades avoit, lorsqu'il ne toussoit point, l'artère *tendue*, & presque *vide*, & à chaque fois qu'il toussoit, on sentoit une colonne de sang qui étoit poussée avec force jusques au milieu de l'avant-bras ; il sembloit qu'elle n'allât pas plus loin du côté de la main, & on auroit dit qu'elle refluoit de l'avant-bras vers le coude dans les mouvemens d'inspiration ; on trouve sans beaucoup de peine, l'occasion d'observer de semblables variations dans les pouls des carotides.

OBSERVATION CLXXII.

Il y a des malades dans lesquels les veines jugulaires paroissent avoir quelques battemens ; mais en y faisant attention, on reconnoît souvent, que ces battemens ne sont que ceux des carotides qui font mouvoir les jugulaires.

On trouve aussi quelquefois des sujets dans lesquels, indépendamment de ces secousses qui viennent de l'action des carotides, les parois des veines jugulaires tremblent & se meuvent d'un mouvement propre.

On a essayé d'arrêter avec le doigt le cours du sang dans les jugulaires de quelques malades qui avoient la tête prise ; il y en avoit dans lesquels le sang se précipitoir tout de suite dans le cœur ; la veine restoit & paroissoit vuide & affaissée entre le doigt & le cœur, ou du moins l'entrée de la veine dans la cavité de la poitrine ; il y en a eu quelques uns dans lesquels le sang n'a pas disparu tout d'un coup, il a même reparu, & on l'a

évidemment apperçu aller & venir dans le tronc de la veine pendant les différens mouvemens du cœur.

On a vû un sujet qui avoit été saigné de la jugulaire & dans lequel le sang remontoit du côté du cœur vers l'ouverture ; il en sortoit tandis qu'on contenoit la veine au-dessus de l'ouverture faite par la saignée.

Tout cela prouve que le sang peut être porté du tronc des veines jugulaires vers leurs ramifications , & y prendre des directions contraires aux mouvemens ou aux loix ordinaires de la circulation , & répand , ainsi que l'histoire des varices, un nouveau jour sur tout ce qui a été remarqué au Chapitre XXI.

OBSERVATION CLXXIII.

On a essayé dans les sales des Hôpitaux, où il se trouve des soldats & d'autres hommes de bonne volonté ; de comparer le pouls des extrémités inférieures avec celui des extrémités supérieures ; mais le pouls est fort difficile à tâter exactement sous le pli

du genouil ; celui des oreilles n'est pas sensible en beaucoup de sujets. On a pourtant observé que dans les gens dans lesquels le sang monte à la tête , les artères des jambes sont beaucoup plus *resserrées* que dans l'état naturel , & que leurs battemens ne sont pas toujours exactement *semblables* à ceux des artères supérieures sur-tout les carotides.

Quant aux veines , il y a beaucoup de malades dans lesquels les veines inférieures sont très-gonflées dans le tems que les supérieures le sont moins que dans l'état naturel , & réciproquement ; il paroît même que dans la plûpart des maladies aiguës, sur-tout celles dans lesquelles le pouls est *supérieur* , les veines supérieures sont constamment plus apparentes à proportion que les inférieures. Dans beaucoup de maladies chroniques les veines inférieures sont singulièrement engorgées.

Les femmes fournissent des exemples frappans de cette inégalité de grosseur dans les veines. On voit des filles à la veille d'avoir leurs regles ,

d'autres qui sont au point de les perdre, & des femmes grosses dans lesquelles le genre veineux extérieur se gonfle & s'élargit singulièrement, quelquefois en très-peu de tems.

La peine qu'on prendra en examinant le pouls des extrémités inférieures dans ces hommes de courage qui se prêtent à toute sorte d'examens, ne sera peut-être pas entièrement infructueuse ; on découvrira bien des choses au sujet du rapport de la chaleur ou du froid de ces extrémités avec les différens états de la maladie ; il y a des Médecins qui croient en certains cas devoir tâter les pieds de leurs malades ; on en a vû qui jugeoient les maladies des enfans presque par le seul tact des pieds.

L'objet de ce Chapitre étoit seulement de prouver que les deux pouls ne sont pas toujours égaux, & qu'ils sont même plus souvent inégaux qu'on ne pourroit le croire, en s'en tenant rigoureusement aux loix de la circulation : les causes de ces variations, ce qu'elles indiquent, l'usage qu'on en peut faire dans la pra-

tique ; tout cela n'est pas de ce lieu ; on ne se propose que de réveiller l'attention des Médecins sur des matieres qui semblent avoir été trop négligées, sur-tout par les Modernes (1).

(1) Institutiones medicæ ex novo medicis conspectu.

Fin du premier Volume.